

III. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

Cần áp dụng luân canh với cây khác họ, bón phân cân đối, nên bón đủ lượng phân chuồng hoai mục (hoặc phân giun).

+ Sâu hại chủ yếu: sâu xanh, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, dùng thuốc: Tri Gard, Regent.

Rệp mềm đen, bọ trĩ dùng thuốc: Confidor, Actara.

+ Bệnh hại: bệnh sương mai dùng thuốc: Ridomil GOLD, Daconin.

Bệnh chết ẻo dùng thuốc: Rovral, Validacin, Ridomil GOLD.

* Chú ý:

Khi dùng thuốc BVTV đảm bảo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc - đúng liều lượng - đúng lúc - đúng cách, sử dụng đúng theo hướng dẫn trên bao bì và thời gian cách ly.

IV. THU HOẠCH:

- Tiến hành thu hoạch khi trái đủ tuổi và trái có màu xanh mượt còn lớp phấn trắng, suông đẹp và đầu trái còn cánh hoa chưa rụng, không nên hái non, quá sẽ giảm năng suất, nhưng hái già quá sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất.

- Khi thu trái dùng dao bén hoặc kéo để cắt cuống, trái được xếp đúng vào thùng hoặc giỏ.



In tại Công ty In Bình Định

SỞ NÔNG NGHIỆP - PTNT BÌNH ĐỊNH TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

HƯỚNG DẪN

KỸ THUẬT TRỒNG DƯA LEO AN TOÀN



Năm 2004

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH ĐỊNH

Dưa leo thuộc nhóm cây ăn trái, có thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn, năng suất cao, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.

I. GIỐNG:

Hiện nay các giống mới có năng suất cao và có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt như giống: giống lai F₁ của Công ty cây trồng miền Nam. Giống F₁: HAPPY 14, HAPPY 16, thời gian gieo đến cho trái từ 35 - 40 ngày.

Giống F₁ Công ty Chia Tai 331, 361, thời gian gieo đến cho trái từ 35 - 40 ngày.

Lượng hạt giống từ 0,5 - 0,7 gr/sào.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC:

1. Thời vụ:

Dưa leo có thể gieo quanh năm, thích hợp trong vụ Đông xuân. Tuy nhiên nếu chủ động nước tưới, năng suất trong vụ Hè vẫn đạt năng suất cao.

- Vụ Đông xuân gieo trồng từ tháng 11, 12 (DL).

- Vụ Hè thu gieo trồng từ tháng 3, 4 (DL).

2. Làm đất:

- Cày bừa kỹ làm sạch cỏ dại.

- Dưa leo thích hợp trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất vẫn là đất thịt nhẹ, nhiều mùn, bằng phẳng, đất dễ thoát nước, đất được cày, phơi ải từ 5 - 7 ngày trước khi lên luống mới.

- Làm đất kỹ, lên luống rộng 1 - 1,2m, chiều cao luống từ 20 - 25cm (tuỳ theo mùa), rãnh luống rộng 30cm, chiều dài luống tuỳ theo kích thước thửa ruộng. Bón phân lót, xới và trộn đều phân và phủ bạt plastic.

3. Mật độ và khoảng cách:

Trên luống trồng 2 hàng.

Hàng x hàng: 70cm - 80cm

Cây x cây : 25cm

4. Xử lý hạt giống và cách trồng:

- Xử lý hạt giống trước khi trồng bằng Ridomil hoặc Carbendazym, Rovral.

- Mỗi gốc 1 hạt, gieo xong rải một lớp đất mỏng lên trên (ướm trong bầu 3 - 5% để trồng dặm kịp thời).

- Làm chái: làm chái bằng lưới theo hình tam giác, chiều cao chái từ 1,2 - 1,8m.

5. Bón phân:

+ Bón lót:

Phân chuồng hoai mục: 1.000kg - 1.200kg/sào hoặc phân giun: 1.000 - 1.200kg/sào.

Phân Bi Fa: 25 - 30kg/sào; phân lân: 20 - 25kg; kali: 5- 7kg/sào; vôi 20 - 25 kg/sào (bón 7 - 10 ngày trước khi trồng).

+ Bón thúc:

Dùng NPK

- Lần 1: tưới phân loãng (sau khi cây có 2 - 4 lá thật): 3 - 5kg/sào.

- Lần 2: sau khi trồng 20 ngày khi cây phun tua cuốn, bón 10 - 12kg/sào.

- Lần 3: sau khi trồng 30 ngày khi cây bắt đầu có hoa cái, bón 10 - 12kg/sào.

6. Chăm sóc:

- Trồng dặm, thường xuyên chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước đủ ẩm cho cây, không nên thừa nước và thiếu nước cho cây, đặc biệt ở giai đoạn ra hoa đậu trái.

- Có thể phun thêm các chế phẩm phân hữu cơ xen giữa các lần bón thúc và sau mỗi đợt thu trái cần bổ sung thêm NPK và bánh dầu hoặc chế phẩm EM.