

# KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BƯỚI PHÚC TRẠCH

-----

**1/ Làm đất:** Phải tiến hành khai hoang trước khi trồng 3 - 4 tháng, làm sạch vườn, cơ cấu vườn cây theo đường đồng mức. Thiết kế vườn, cây, bờ kỹ, xử lý đất bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật, có hệ thống tiêu, thoát nước, hệ thống cây che bóng, chắn gió.

## **2/ Đào hố:**

- Mật độ: 330 - 350 cây/ha, tương đương với khoảng cách 5m x 6m; 5m x 5m/cây.
- Kích thước hố: 0,7m x 0,6m x 0,6 m

## **3/ Bón phân, lấp hố:**

Lượng phân cho 1 hố: 50 kg phân chuồng + 1 kg Supe lân + 1 kg vôi bột. Việc bón phân lấp hố phải được tiến hành trước khi trồng 20 - 25 ngày.

## **4/ Trồng cây:**

- \* Thời vụ trồng: - Vụ xuân từ tháng 1 đến tháng 3
- Vụ thu đông: Từ tháng 9 đến tháng 10.

\* Trồng cây: Đào giữa hố đã bón phân 1 lỗ lớn hơn bầu, bón vào đó 0,5 kg phân chuồng tinh hoại mục, 0,05 kg phân supe lân rồi đổ nước đánh nhuyễn để hố rỗng bớt vò bầu, cho cây xuống, lấp đất và tưới nước.

- Trồng xong cắm cọc cố định cây, dùng cỏ khô túm gốc giữ ẩm.
- Khi trồng mặt bầu luôn luôn cao hơn mặt đất 1,5 - 2 cm.

## **5/ Chăm sóc:**

- Luôn xới xáo làm sạch cỏ vườn cây, riêng mùa hè và mùa khô nên làm cỏ theo bồn.
- Chú ý tưới nước cho cây vào các thời kỳ: Tái tạo mầm hoa, ra hoa, kết quả và sinh trưởng quả.
- Tiến hành tạo hình cây ở những năm đầu kiến thiết cơ bản để tạo tán cân đối, có hình dáng đẹp, phát triển tốt.
- Thường xuyên tỉa bỏ những cành sâu, cành bệnh, cành khô.

## **6/ Lượng phân bón hàng năm và cách bón:**

Bưởi Phúc Trạch cần được bón đủ phân, cân đối cả đa và vi lượng. Muốn vậy phải căn cứ vào tính chất đất đai, tuổi cây và sản lượng hàng năm để bón và thông thường mức bón như sau:

**\* Liều lượng phân bón hàng năm:**

ĐVT: kg

| TT | Tuổi cây | Phân chuồng | Đạm urê   | Lân super | Kali       | Vôi bột   |
|----|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1  | 1 - 3    | 20 - 40     | 0,2 - 0,5 | 0,6 - 1   | 0,2 - 0,35 | 0,1 - 0,2 |
| 2  | 4 - 6    | 50 - 55     | 0,7 - 0,8 | 1,0 - 1,2 | 0,4 - 0,5  | 0,6 - 0,8 |
| 3  | 7 - 9    | 60 - 65     | 0,9 - 1,0 | 1,3 - 1,5 | 0,6 - 0,7  | 0,9 - 1,0 |
| 4  | 9 - 11   | 70 - 75     | 1,0 - 1,2 | 1,6 - 1,8 | 0,8 - 1,0  | 1,2 - 1,3 |
| 5  | Trên 11  | 50 trở lên  | 1,3 - 1,5 | 1,9 - 2,2 | 1,1 - 1,2  | 1,5 - 1,7 |

\* Thời kỳ bón: Bón lót cơ bản hoặc sau khi thu hoạch quả: Toàn bộ phân chuồng + vôi + lân + 20% Kali. Bón thúc lần 1: Vào tháng 1 - 2 (Bón đón hoa tăng tỷ lệ đậu quả): 30% đạm + 25% kali. Bón thúc lần 2: Vào tháng 4 (thúc cành xuân, chống rụng quả): 25% đạm + 25% kali. Bón thúc lần 3: Vào tháng 6 (Thúc cành thu tăng trọng lượng quả): Toàn bộ lượng phân còn lại.

\* Cách bón: Bón lót: Đào sâu 30 cm, rộng 30 cm theo vòng tán rồi bón phân, lấp đất, tưới nước. Bón phân vô cơ: Có thể rải phân trên mặt tán cây, dùng cào lấp phân, tưới nước hay hoà phân vào nước để tưới.

Ngoài ra còn có thể dùng các chế phẩm phân vi lượng phun lên lá như: Humic, 3 lá xanh, Cs9 900, Agronomic... khi cây sinh trưởng kém, nhất là vào thời kỳ sau khi đậu quả.

**7/ Một số sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ:**

\* Sâu vẽ bùa: Phá hoại lá, ngọn non của cây quanh năm nhất là các đợt lộc từ tháng 4 đến tháng 10. Có thể dùng Padan 95SP 10 g trong bình 10 lít nước phun vào chiều tối, phun kỹ ướt đầm 2 mặt lá.

\* Sâu nhện: Phá lá non, ngọn non vào tháng 1 - 4, tháng 7 - 8. Dùng Padan 95 SP phun trước khi hoa rở, cần theo dõi các đợt lộc và thấy chớm xuất hiện là phun ngay.

\* Bướm chích quả: Thường gây hại lúc quả gần chín, vào ban đêm. Có thể soi đèn vùng vệt bắt hay dùng bẫy bã chua ngọt.

\* Nhện đỏ: Thường gây hại lá và quả non 1 - 2 tháng tuổi, dùng Rengents 0,1% hay Ortur 0,1% để phun vào thời kỳ quả còn nhỏ

\* Bệnh thối gốc chảy mủ: Gây hại thân, rễ làm cho vườn cây xơ xác, nhất là vườn cây thoát nước kém, ít dầu tưới. Cần chăm sóc tốt, cơ cấu vườn thông thoáng, thoát nước, định kỳ sau mỗi lần làm cỏ dùng Ridomin MZ72 WP hoà nước tưới quanh gốc và phun lên cây.

\* Bệnh chảy gôm: Thường xuất hiện trên thân, cành và quả gần mặt đất, cần làm cho vườn cây cao ráo, thông thoáng, thoát nước, chọn gốc ghép kháng bệnh, ghép cao 20 - 25 cm, khi trồng nên trồng nông, dùng đất thấp đắp ụ và tránh gây nên vết thương cơ giới. Sau mỗi đợt làm cỏ dùng Boocdo 1%, Aliette 0,4 - 0,8% phun phòng./.

**Sản xuất tại: Trại giống cây ăn quả**

**Trung tâm Khoa học & Khuyến nông - Khuyến lâm Hà Tĩnh**

**Điện thoại: 039.856739 ; 039.857151**

**Di động: 0913042552**