

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I

PGS.TS. NGUYỄN HẢI THANH

TOÁN ỨNG DỤNG

(Giáo trình Sau đại học)

NHÊ XU T B ư N ỹ I H ̣ C Sh PH ỹ M

Mở đầu	4
CHƯƠNG I. MỘT SỐ MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU	6
1. Mô hình quy hoạch tuyến tính	6
1.1. Các bước cơ bản khi lập đề bài và phương pháp đơn hình	6
1.2. Mô hình quy hoạch tuyến tính	6
1.3. Phương pháp Lân cận	10
1.4. Giải mô hình quy hoạch tuyến tính bằng các phần mềm tính toán	13
1.5. Một số ứng dụng của phương pháp Lân cận	14
2. Bổ sung thêm về phương pháp đơn hình	16
2.1. Thuật toán BTQHTT và Quy hoạch nhị phân	16
2.2. Phương pháp Lân cận mở rộng	18
3. Mô hình quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu	20
3.1. Các khái niệm cơ bản	20
3.2. Một số phương pháp giải BTQHTT đa mục tiêu	22
3.3. Phương pháp tham số để tìm tập giá trị BTQHTT đa mục tiêu	23
4. Mô hình tối ưu phi tuyến đơn và đa mục tiêu	28
4.1. Một số khái niệm cơ bản	28
4.2. Một số phương pháp vận dụng hàm giá trị bất biến để tìm tập giá trị phi tuyến đa mục tiêu	30
4.3. Một số phương pháp giải bất biến để tìm tập giá trị phi tuyến đa mục tiêu	35
CHƯƠNG II. CÁC MÔ HÌNH MẠNG	39
1. Mô hình mạng vận tải	39
1.1. Phân bố bất biến và đơn vị	39
1.2. Thuật toán tìm đơn vị xuất phát	40
1.3. Phương pháp phân phối giá trị bất biến và đơn vị	44
1.4. Phương pháp phân phối cực biên giá trị bất biến và đơn vị	48
2. Mô hình mạng PERT	49
2.1. Các khái niệm cơ bản và PERT	49
2.2. Sơ đồ PERT và số liệu ngẫu nhiên	53
2.3. Nguyên nhân delay khi không có thời gian chờ đợi	55
2.4. Tính thời gian rút ngắn tối ưu bằng phương pháp Lân cận	57
2.5. Cập nhật mạng PERT trong phân tích chi phí và quản lý tiến độ	57
3. Một số mô hình mạng khác	60
3.1. Bất biến cực biên và thời gian	60
3.2. Bất biến cực biên và độ dài ngắn nhất quy hoạch Lân cận	62
3.3. Cập nhật quy hoạch Lân cận cho một số bất biến ngắn nhất và độ dài ngắn nhất	65

CHƯƠNG III. GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT MÔ PHÒNG VÀ MÔ HÌNH HÀNG CHỜ	71
1. Mục đích và các công cụ của mô phỏng	71
1.1. Khái niệm mô phỏng và các loại mô phỏng	71
1.2. Các bước cơ bản của mô phỏng	71
1.3. Mô phỏng và các phương pháp mô phỏng	72
2. Áp dụng mô phỏng ngẫu nhiên	76
2.1. Vai trò của mô phỏng trong nghiên cứu	76
2.2. Các bước cơ bản của mô phỏng ngẫu nhiên	76
2.3. Mô phỏng và các phương pháp mô phỏng	77
3. Một số vấn đề về mô hình hàng chờ	86
3.1. Mô phỏng và các phương pháp mô phỏng	86
3.2. Các bước cơ bản của mô phỏng	90
3.3. Tính toán các chỉ số	90
3.4. Các mô phỏng và các phương pháp mô phỏng	92
CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH MARKOV VÀ ỨNG DỤNG	103
1. Các khái niệm cơ bản về xích Markov	103
1.1. Mô phỏng và các phương pháp mô phỏng	103
1.2. Ma trận xác suất chuyển trạng thái và các phương pháp tính toán	104
1.3. Các tính chất của xích Markov	108
2. Một số ứng dụng của phân tích Markov	109
2.1. Tính toán các chỉ số	109
2.2. Chuyển đổi trạng thái và các phương pháp tính toán	110
2.3. Phân tích Markov trong các hệ thống	111
2.4. Tính toán các chỉ số và các phương pháp tính toán	114
2.5. Mô phỏng và các phương pháp mô phỏng	118
3. Mô phỏng xích Markov	120
3.1. Mô phỏng xích Markov và các phương pháp tính toán	120
3.2. Mô phỏng xích Markov và các phương pháp tính toán	122
Phần bài tập	124
Phần phụ lục	135
Tài liệu tham khảo	143

Mở đầu

Trong một vài năm gần đây, các môn học Toán – Tin ứng dụng đã được đưa vào chương trình đào tạo Sau đại học cho một số chuyên ngành kinh tế – kỹ thuật như Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Công nghệ thông tin, Sinh học ... tại một số trường đại học trong nước. Các môn học này, tuy số đơn vị học trình chưa nhiều nhưng đã giúp cho học viên cao học cũng như các nghiên cứu sinh có những kiến thức cơ sở và nâng cao về Toán học và Tin học, đặc biệt về các phương pháp tính toán khoa học (Scientific Computing Methods), là các vấn đề hết sức cần thiết cho các đề tài nghiên cứu khoa học của họ. Điều này cũng phù hợp với xu thế chung trong đào tạo Sau đại học tại các trường đại học nước ngoài, với các môn học về Toán – Tin nâng cao cho học viên cao học, thường chiếm thời lượng khá lớn tới khoảng 200 đến 250 tiết bao gồm nhiều nội dung phong phú và cấp thiết.

Xuất phát từ những lý do trên và dựa trên các kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình dạy một số môn học cho chương trình Cao học Quản lý đất đai và Cao học Điện (Trường Đại học Nông nghiệp I), Cao học Toán – Tin ứng dụng (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), Cao học Quản trị kinh doanh (tại một số trường đại học khác), chúng tôi biên soạn giáo trình này với mong muốn việc ứng dụng các phương pháp toán học, các phương pháp vận trù học được triển khai rộng rãi hơn và mang lại các hiệu quả thiết thực hơn. Giáo trình với thời lượng từ 45 tới 60 tiết, ước hết, dành cho học viên cao học ngành Điện, với các nội dung đã được Khoa Cơ điện và Khoa Sau đại học, Trường Đại học Nông nghiệp I, thông qua. Các chủ đề trong giáo trình bao gồm: một số mô hình và phương pháp tối ưu, các bài toán về mạng, giới thiệu về quy hoạch động, một số ứng dụng của lý thuyết hàng chờ (Waiting Line Theory) và mô phỏng ngẫu nhiên (Stochastic Simulation), các khái niệm cơ bản và ứng dụng của quá trình ngẫu nhiên Markov. Đây là các chủ đề chính về Toán ứng dụng và Vận trù học mà học viên cao học của nhiều chuyên ngành kinh tế – kỹ thuật tại các trường đại học nước ngoài bắt buộc phải học. Các chủ đề này có thể giúp ích không chỉ cho vấn đề quản lý – sử dụng điện mà còn cho vấn đề thiết kế và xây dựng các hệ thống kỹ thuật điện. Giáo trình cũng có thể được lấy làm tài liệu tham khảo về các phương pháp toán ứng dụng hay mô hình hoá cho chương trình Cao học các chuyên ngành như: Quản lý đất đai, Kinh tế nông nghiệp và một số chuyên ngành kinh tế – kỹ thuật khác.

Khi biên soạn giáo trình, chúng tôi luôn chú ý nhấn mạnh khía cạnh ứng dụng các phương pháp toán học và khía cạnh tính toán khoa học với các ví dụ minh họa chọn lọc, nhằm giúp cho học viên hiểu rõ nên áp dụng các phương pháp đó vào các vấn đề nghiên cứu nào và áp dụng chúng như thế nào cho một số trường hợp cụ thể. Do thời lượng của môn học, giáo trình không đi sâu vào vấn đề chứng minh toán học của các phương pháp này cũng như các ứng dụng tổng quát của chúng trong các hệ thống lớn.

Hวัง vọng rằng, những học viên cao học quan tâm tới các phương pháp toán học được

trình bày trong giáo trình có thể tự mình tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu hơn sau này. Chẳng hạn, với kiến thức về quy hoạch động và các phương pháp tối ưu phi tuyến mà giáo trình cung cấp, người đọc có thể tiếp tục nghiên cứu về các phương pháp quy hoạch động nhằm áp dụng vào các hệ điều khiển tối ưu trong tự động hoá. Còn với một số chủ đề về xích Markov và ứng dụng cũng như mô phỏng xích Markov, người đọc có thể tiếp tục nghiên cứu về các mô hình ngẫu nhiên như quá trình sinh-tử hay quá trình hồi phục có nhiều ứng dụng rộng rãi trong ngành Điện, Điện tử và Viễn thông hay Công nghệ thông tin.

Đây là một trong số không nhiều các giáo trình về Toán ứng dụng dành cho chương trình Sau đại học các chuyên ngành kinh tế – kỹ thuật tại các trường đại học trong nước, nên mặc dù chúng tôi hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng chắc chắn giáo trình không tránh khỏi còn tồn tại những điểm hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo, các học viên cao học, tiến sĩ để giáo trình được hoàn chỉnh, chính xác và sinh động hơn.

Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn Khoa Sau đại học và Khoa Cơ điện, Trường Đại học Nông nghiệp I về những giúp đỡ quý báu trong quá trình biên soạn; cảm ơn Bộ môn Toán, giảng viên Đặng Xuân Hà và Bộ môn Tin học, các học viên cao học chuyên ngành Điện khoá 10 và 11, Trường Đại học Nông nghiệp I; kỹ sư Phan Văn Tiến và các học viên cao học chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng, khoá 1 và 2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã dành ý kiến đóng góp và tham gia hoàn chỉnh một số nội dung của giáo trình này. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các ý kiến phản biện quý báu của các ông Trưởng bộ môn Toán, Trường Đại học Nông nghiệp I và Trưởng khoa Toán – Tin ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2005
PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

Chương I

MỘT SỐ MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU

1. Mô hình quy hoạch tuyến tính

1.1. Các bước cần thiết khi áp dụng phương pháp mô hình hoá

- Tr-ợc h-ĩ ph-ĩ kh-ĩ s-ĩ, ph-ĩt h-ĩ n v-ĩ L-ĩc-ĩ gi-ĩ quy-ĩ.
- Ph-ĩt bi-ĩ c-ĩc L-ĩc-ĩ k-ĩ n r-ĩng bu-ĩ, c, m, c ti-ũ c, a b-ĩ i to-ĩn d-ĩ d-ĩng L-ĩnh t-ĩnh. Sau L-ĩ l-ĩ a ch-ĩ n c-ĩc bi-ĩn quy-ĩ L-ĩnh / c-ĩc X-ĩ s-ĩ v-ĩ x-ĩ d, ng m-ĩ h-ĩnh L-ĩnh l-ĩc-ĩng (c, n g-ĩ i l-ĩ m-ĩ h-ĩnh to-ĩn h-ĩ c).
- Thu th-ĩp s-ĩ l-ĩ u, x-ĩc L-ĩnh ph-ĩng ph-ĩp gi-ĩ quy-ĩ.
- ậ-ĩnh ra quy tr-ĩnh gi-ĩ / thu-ĩt gi-ĩ. C-ĩ th-ĩWgi-ĩ m-ĩ h-ĩnh b-ĩng c-ĩch t-ĩnh to-ĩn th-ĩ ng th-ĩng. ậ-ĩ v-ĩ i c-ĩc m-ĩ h-ĩnh l-ĩ n, g-ĩ m nhi-ĩu bi-ĩn v-ĩ nhi-ĩu L-ĩc-ĩ k-ĩ n r-ĩng bu-ĩ c-ĩc l-ĩp tr-ĩnh v-ĩ gi-ĩ m-ĩ h-ĩnh tr-ĩn m-ĩy t-ĩnh.
- ậ-ĩnh gi-ĩ k-ĩ qu-ĩ. Trong tr-ĩng h-ĩ p-ĩ ph-ĩt h-ĩ n th-ĩ c-ĩ k-ĩ qu-ĩ b-ĩ th-ĩng ho-ĩ k-ĩ qu-ĩ kh-ĩ ng ph-ĩ h-ĩ p-ĩ i th-ĩ c-ĩt-ĩ c-ĩn ki-ĩn tra v-ĩ ch-ĩnh s-ĩ a l-ĩ quy tr-ĩnh gi-ĩ ho-ĩ m-ĩ h-ĩnh.
- Tr-ĩ kh-ĩ c-ĩc ph-ĩng s-ĩn t-ĩm L-ĩc-ĩ c-ĩ tr-ĩn th-ĩ c-ĩt-ĩ
- C-ĩc thu-ĩt ng-ĩ sau th-ĩng h-ĩp khi s-ĩp d, ng ph-ĩng ph-ĩp m-ĩ h-ĩnh ho-ĩ:
- ng d, ng to-ĩn/To-ĩn ng-ĩ ng (*Mathematical Applications hay Applied Mathematic*).
- V-ĩn tr-ĩ h-ĩ c (*Operations Research* vi-ĩ t-ĩ l-ĩ *OR*).
- Khoa h-ĩ c qu-ĩn l-ĩ (*Management Science* vi-ĩ t-ĩ l-ĩ *MS*)

1.2. Mô hình quy hoạch tuyến tính

Phát biểu mô hình

V-ĩ i m, c L-ĩch t-ĩm hi-ĩ b-ĩ c L-ĩu, x-ĩ m-ĩ h-ĩnh to-ĩn h-ĩ c sau L-ĩc-ĩ, c, n g-ĩ i l-ĩ m-ĩ h-ĩnh quy ho-ĩch tuy-ĩn t-ĩnh hay b-ĩ i to-ĩn quy ho-ĩch tuy-ĩn t-ĩnh (BTQH TT), m-ĩ trong L-ĩ ch-ĩng ta m-ĩ n t-ĩ i c-ĩ ho-ĩ (c, c L-ĩ ho-ĩ hay c, c ti-ũ ho-ĩ) h-ĩ m m, c ti-ũ:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \text{Max (Min)}$$

v-ĩ các điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$$

$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$ (điều kiện không âm)

Ví dụ: $z = 8x_1 + 6x_2 \rightarrow \text{Max}$

với các ràng buộc:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 48 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Cần tìm các giá trị của các biến quyết định x_1, x_2 để các ràng buộc được thỏa mãn và hàm mục tiêu đạt giá trị lớn nhất.


Bối toán này có ý nghĩa kinh tế như sau: Giả sử một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm I cần 4 đơn vị nguyên liệu loại A và 2 đơn vị nguyên liệu loại B, các chi tiêu để cho một đơn vị sản phẩm loại I là 2 và 4. Để nguyên liệu để tạo ra loại A và B hiện có là 60 và 48 (đơn vị). Hãy xác định phương án sản xuất để lợi nhuận lớn nhất, biết lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm bán ra là 8 và 6 (đơn vị tiền tệ) cho các sản phẩm loại I và II.

Phương pháp đồ thị

Phương pháp đồ thị có ý nghĩa minh họa giúp hiểu biết chính xác về LQ.

Bước 1: Vẽ miền ràng buộc / miền các phương án khả thi, lập tập hợp các phương án khả thi (các phương án, nghiệm mà tất cả các ràng buộc được thỏa mãn đồng thời). Miền phương án được thể hiện qua biểu thức (x_1, x_2) của nó và tập hợp các nghiệm, thỏa mãn tất cả các ràng buộc là L (xem hình 1.1).

– Tập hợp nghiệm của hệ L thì $4x_1 + 2x_2 = 60$ bằng cách xác định hai điểm trên L thì: $(x_1 = 0, x_2 = 30)$ và $(x_2 = 0, x_1 = 15)$.



Hình 1.1. Phương pháp đồ thị giải bài toán quy hoạch tuyến tính

Điểm thứ ba của miền \$M\$ là điểm thuộc trục hoành chia đôi đoạn thẳng nối hai điểm của miền \$M\$ thuộc trục tung. Điểm này thuộc trục hoành khi và chỉ khi \$x_1 = 0\$ và \$x_2 = 12\$. Điểm này thuộc trục tung khi và chỉ khi \$x_1 = 12\$ và \$x_2 = 0\$. Ta thấy điểm này thuộc trục tung khi và chỉ khi \$x_1 = 12\$ và \$x_2 = 0\$.

Tính giá trị của hàm mục tiêu tại các điểm cực biên của miền \$M\$. Ta thấy giá trị của hàm mục tiêu tại điểm \$(0, 12)\$ là \$z = 8 \cdot 0 + 6 \cdot 12 = 72\$. Giá trị của hàm mục tiêu tại điểm \$(12, 0)\$ là \$z = 8 \cdot 12 + 6 \cdot 0 = 96\$. Ta thấy giá trị của hàm mục tiêu tại điểm \$(0, 12)\$ là \$z = 72\$ và tại điểm \$(12, 0)\$ là \$z = 96\$. Do đó, giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu là \$z = 96\$ tại điểm \$(12, 0)\$.

Lưu ý, giao của hai miền \$M\$ là miền \$M\$ thuộc trục hoành chia đôi đoạn thẳng nối hai điểm của miền \$M\$ thuộc trục tung. Điểm này thuộc trục hoành khi và chỉ khi \$x_1 = 0\$ và \$x_2 = 12\$. Điểm này thuộc trục tung khi và chỉ khi \$x_1 = 12\$ và \$x_2 = 0\$. Ta thấy điểm này thuộc trục tung khi và chỉ khi \$x_1 = 12\$ và \$x_2 = 0\$.

Bước 2: Trong miền \$M\$ (OABC) ta tìm điểm \$(x_1, x_2)\$ sao cho

$$z = 8x_1 + 6x_2 \text{ đạt giá trị lớn nhất}$$

Cách 1: Dùng đường đồng mức. Ta vẽ các đường đồng mức của hàm mục tiêu \$z = 8x_1 + 6x_2\$ và tìm giá trị lớn nhất của \$z\$ tại các điểm cực biên của miền \$M\$.

Vẽ các đường đồng mức của hàm mục tiêu \$z = 8x_1 + 6x_2\$. Ta thấy các đường đồng mức của hàm mục tiêu \$z = 8x_1 + 6x_2\$ là các đường thẳng song song với nhau. Ta vẽ các đường đồng mức của hàm mục tiêu \$z = 8x_1 + 6x_2\$ và tìm giá trị lớn nhất của \$z\$ tại các điểm cực biên của miền \$M\$.

Tính giá trị của hàm mục tiêu tại các điểm cực biên của miền \$M\$. Ta thấy giá trị của hàm mục tiêu tại điểm \$(0, 12)\$ là \$z = 72\$ và tại điểm \$(12, 0)\$ là \$z = 96\$. Do đó, giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu là \$z = 96\$ tại điểm \$(12, 0)\$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu là \$z = 96\$ tại điểm \$(12, 0)\$.

Kết luận: Trong các phương án khả thi, phương án tối ưu là \$(x_1 = 12, x_2 = 0)\$. Giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu là \$z = 96\$.

Nhận xét: Phương án tối ưu của bài toán (hay các BTQHTT khác, nếu có) của một BTQHTT và các phương án khả thi của bài toán là các điểm cực biên của miền \$M\$. Các điểm cực biên của miền \$M\$ là các điểm thuộc trục hoành chia đôi đoạn thẳng nối hai điểm của miền \$M\$ thuộc trục tung. Điểm này thuộc trục hoành khi và chỉ khi \$x_1 = 0\$ và \$x_2 = 12\$. Điểm này thuộc trục tung khi và chỉ khi \$x_1 = 12\$ và \$x_2 = 0\$. Ta thấy điểm này thuộc trục tung khi và chỉ khi \$x_1 = 12\$ và \$x_2 = 0\$.

Cách 2: Ta nhận xét rằng, các phương án khả thi của bài toán là các điểm thuộc trục hoành chia đôi đoạn thẳng nối hai điểm của miền \$M\$ thuộc trục tung. Điểm này thuộc trục hoành khi và chỉ khi \$x_1 = 0\$ và \$x_2 = 12\$. Điểm này thuộc trục tung khi và chỉ khi \$x_1 = 12\$ và \$x_2 = 0\$. Ta thấy điểm này thuộc trục tung khi và chỉ khi \$x_1 = 12\$ và \$x_2 = 0\$.

$$\text{Ta thấy giá trị của hàm mục tiêu tại điểm } O(0, 0): z(0, 0) = 0; \text{ tại } A(0, 12): z(0, 12) = 72; \text{ tại } C(15, 0): z(15, 0) =$$

120; t_đ B(12, 6): z(12, 6) = 132 = Max{z(O), z(A), z(B), z(C)}. Vậy z_{max} = 132.

Nhận xét: Muốn tìm ph^ương s^ố t^{ối} i^{ểu} của BTQH^{TT} ta xử^{lý} ph^ươ t^ố m^à t^{ìm} Li^{ên} c^ố bi^{ến} n^{ào} L^à, t^{ìm} c^{ách} c^hỉ th^ể n^h m^u c^ó tⁱu b^ỏng c^{ách} Li^{ên} c^ố bi^{ến} k^hoⁿ. Ti^{ếp} t^o c^ó nh^ư v^{ậy} cho t^o i^{ểu} khi t^{ìm} L^à c^ó ph^ương s^ố t^{ối} i^{ểu} của. Trong tr^ờng h^ệ p^h BTQH^{TT} c^ó ph^ương s^ố t^{ối} i^{ểu} của th^ì quy tr^{ình} gi^{ải} n^{ày} bao g^{ồm} h^àu h^{ết} b^ộ c^ó (do s^ố Li^{ên} c^ố bi^{ến} l^à h^àu h^{ết}).

ở iⁿ v^ị iⁿ BTQH^{TT} là ng^hà x^ã, quy tr^{ình} gi^{ải} L^à c^ó minh h^oà^{nh} v^{ậy}:

O(0, 0) → A(0,12) → B(12,6) đ^{ang}


z = 0 → z = 72 → z = 132

ho^àh:

O(0, 0) → C(15, 0) → B(12, 6) đ^{ang}

z = 0 → z = 120 → z = 132

Sơ đồ khối



Hình 1.2. Sơ đồ khối giải BTQH^{TT}

Quy trình giải BTQHTT thường qua các bước như sau: bước 1: phân tích đề bài, xác định yêu cầu của bài toán. Trong bước này, cần xác định rõ ràng các dữ kiện đã cho, các biến cần tìm, và mục tiêu cần đạt được. Bước 2: lập mô hình toán học. Bước 3: giải bài toán. Bước 4: kiểm tra và đánh giá kết quả.

1.3. Phương pháp đơn hình

Để giải bài toán tối ưu bằng phương pháp đơn hình, ta cần phải đưa bài toán về dạng chuẩn. Các bước thực hiện như sau:

$$z = 8x_1 + 6x_2 + 0x_3 + 0x_4 \rightarrow \text{Max}$$

với các ràng buộc:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 60 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_4 = 48 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Cách lập và biến đổi các bảng đơn hình

Để giải bài toán tối ưu bằng phương pháp đơn hình, ta cần phải đưa bài toán về dạng chuẩn. Các bước thực hiện như sau:

- Chọn biến cơ sở ban đầu. Thông thường, ta chọn các biến có hệ số bằng 0 trong hàm mục tiêu. Trong bài toán này, ta chọn x_3 và x_4 làm biến cơ sở ban đầu. Bước tiếp theo là tính toán các giá trị trong bảng đơn hình. Bảng đơn hình ban đầu có dạng như sau:

- Chọn biến vào bảng. Ta chọn biến có giá trị nhỏ nhất trong hàng cuối của bảng đơn hình để đưa vào bảng.

- Chọn biến ra bảng. Ta chọn biến có giá trị lớn nhất trong cột của biến vào bảng để đưa ra bảng.

- Tính toán các giá trị trong bảng đơn hình mới. Sau khi đã chọn được biến vào và biến ra bảng, ta cần tính toán các giá trị trong bảng đơn hình mới.

Bảng I.1. Các bảng đơn hình giải BTQHTT

H' s' h' m m, c ti' u c _j	Bi' l' h' ch s'	Ph' o'ng s' n	c ₁ = 8	c ₂ = 6	c ₃ = 0	c ₄ = 0
			x ₁	x ₂	x ₃	x ₄
0	x ₃	60	4	2	1	0
0	x ₄	48	2	4	0	1
H' ng z		z ₀ = 0	z ₁ = 0	z ₂ = 0	z ₃ = 0	z ₄ = 0
H' ng Δ _j = c _j - z _j			Δ ₁ = 8	Δ ₂ = 6	Δ ₃ = 0	Δ ₄ = 0
8	x ₁	15	1	1/2	1/4	0
0	x ₄	18	0	3	-1/2	1
H' ng z		z ₀ = 120	z ₁ = 8	z ₂ = 4	z ₃ = 2	z ₄ = 0
H' ng Δ _j = c _j - z _j			Δ ₁ = 0	Δ ₂ = 2	Δ ₃ = -2	Δ ₄ = 0
8	x ₁	12	1	0	1/3	-1/6
6	x ₂	6	0	1	-1/6	1/3
H' ng z		z ₀ = 132	8	6	5/3	2/3
H' ng Δ _j = c _j - z _j			0	0	-5/3	-2/3

Phân tích bảng đơn hình bước 1

- H' s' h' m ng v' i bi' l' h' x₁ tr' o'ng th' nh' l' a₁₁ = 4 c' ngh' l' t' l' thay th' r' i' o'ng gi' a m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n lo' i I v' m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n lo' i III l' 4 (gi' i' th' ch: x₁ ph' o'ng tr' o'ng / r' o'ng bu' c th' nh' l' 4x₁ + 2x₂ + x₃ = 60, x₁ t' o'ng m' t L' h' v' th' x₃ ph' i' gi' i' m b' n L' h' v' n' l' u' gi' nguy' o'ng x₂). T' o'ng t' ta c' th' W' gi' i' th' ch L' o' c l' ngh' a c' a c' s' c h' s' a_{ij} kh' s' c cho tr' o'ng h' ng 1 v' h' ng 2 trong b' l' ng L' h' h' nh b' c 1.

- Ch' o'ng ta x' o' h' ng z c' a b' l' ng L' h' h' nh. n' W' nh z₁, c' f' n s' p' d' ng c' l' ng th' c z₁ = (c' t h' s' c' a h' m m, c ti' u) × (c' t h' s' c' a bi' l' h' x₁) = 0 × 4 + 0 × 2 = (gi' s' m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n lo' i III) × (t' l' thay th' r' i' o'ng lo' i I / lo' i III) + (gi' s' m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n lo' i IV) × (t' l' thay th' r' i' o'ng lo' i I / lo' i IV) = t' ng chi ph' ph' i' b' ra khi L' o' th' o' m m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n lo' i I v' o' ph' o'ng s' n s' l' h' xu' i' m' i = 0. C' s' c gi' s' tr' z_j, v' i j = 1, 2, 3, 4, L' o' c t' o'ng t' v' ch' nh l' c' s' c chi ph' khi L' o' m' t th' o' m m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n lo' i x_j v' o' ph' o'ng s' n s' l' h' xu' i' m' i. C' n z₀ l' gi' s' tr' c' a h' m m, c ti' u L' o' c t' o'ng s' n L' o'ng x' o' z₀ = (c' t h' s' c' a h' m m, c ti' u) × (c' t ph' o'ng s' n) = 0 × 60 + 0 × 48 = 0.

- Tr' o'ng h' ng Δ_j c' f' n ghi c' s' c gi' s' tr' Δ_j, j = 1, 2, 3, 4, t' o'ng theo c' l' ng th' c Δ_j = c_j - z_j = l' i nhu' o' tr' o'ng m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n i' chi ph' tr' o'ng m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n. V' d' y Δ₃ l' "l' o' bi' o'ng" / m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n khi L' o' th' o' m m' t L' h' v' s' l' h' ph' x' n lo' i j v' o' ph' o'ng s' n s' l' h' xu' i' m' i. N' l' u' Δ_j > 0 th' h' m m, c ti' u c' n t' o'ng L' o' c khi ta L' o' th' o' m c' s' c L' h' v' s' l' h' ph' x' n lo' i j v' o' ph' o'ng s' n s' l' h' xu' i' m' i. C' th' W' ch' ng minh L' o' c Δ_j ch' nh l' L' o' h' m r' i' o'ng ∂z/∂x_j c' a h' m m, c ti' u z theo bi' l' h' x_j. Nh' o' v' d' y, x₁ t' o'ng l' o' n 1 th' z t' o'ng l' o' n 8 c' n x₂ t' o'ng l' o' n 1 th' z t' o'ng l' o' n 6.

Do Δ₁ v' Δ₂ L' o' d' o'ng n' o'ng v' x' n c' n kh' l' n' o'ng c' l' th' i' n h' m m, c ti' u khi chuy' n' sang

b³ng c⁵sch l⁵v ph⁵ng tr³nh (a) chia cho 4 (ph⁵nh t⁵ xoay) L^Wc⁵ (a^o), r⁵ i l⁵v (b) tr⁵ b⁵ t⁵

$2 \times (a)/4$ LWC (bđ). n Ơy ch²nh l' n i dung c, a b-Đ c 4 v' b-Đ c 5. C, n b-Đ c 3 sĐ Lm bđo r²ng giĐ tr' c, a cĐc biĐh c h s' m i kh¹ ng ²n ($x_1 = 15, x_4 = 18$).

Cp d, ng th, t, c xoay cho cĐc phĐh t' n²m tr²n h²ng 1 v' 2 c, a bĐng Lhn h²nh b-Đ c 1, sau L' t²nh cĐc giĐ tr' tr²n h²ng z_j v' Δ_j t²ng t, nh²khi l²p bĐng Lhn h²nh b-Đ c 1, ch¹ng ta sĐ nh²n L'Đ c bĐng Lhn h²nh b-Đ c 2.

Phân tích bảng đơn hình bước 2

BĐng b-Đ c 2 c' thWĐĐ c ph²n t²ch t²ng t, nh²bĐng b-Đ c 1. CĐh ch¹Đ r²ng l'² n²y ta Lang' v' tr² c, a L'Đ C(15, 0) v³ $x_1 = 15, x_2 = 0$; giĐ tr' c, a h²m m, c ti²u l' $z_0 = 120$ L' L'Đ c cĐi th² n h²n so v, i b-Đ c 1. Ta thĐy $\Delta_2 = 2 > 0$ n²n c, n c' thWĐĐ th² n h²m m, c ti²u b²ng cĐch ch² n biĐh x_2 l²m biĐh ch s' m i. Th, c h² n cĐc b-Đ c xoay sang ph²ng Đn c, c bi²n kQĐ t h²n, ch¹ng ta sĐ c' bĐng Lhn h²nh b-Đ c 3.

Phân tích bảng đơn hình bước 3

TĐ bĐng Lhn h²nh b-Đ c 3 ta thĐy LiQ ki² n t' i ² L' L'Đ c thoĐ m²n ($\Delta_j \leq 0 \forall j=1, 2, 3, 4$) n²n kh¹ ng c, n kh²nĐng cĐi th² n ph²ng Đn. Ph²ng Đn t' i ² L' L'Đ c tĐ $x_1 = 12, x_2 = 6, x_3 = 0, x_4 = 0$, t, c l' tĐ LiW c, c bi²n B(12, 6) v, i giĐ tr' $z_{\max} = 132$.

Một số chú ý

– n iQ ki² n t' i ² cho cĐc BTQHTT dĐng Max l' $\Delta_j \leq 0 \forall j$.

– n' i v, i cĐc BTQHTT cĐh c, c tiW hoĐ h²m m, c ti²u th³ LiQ ki² n t' i ² (hay ti²u chuĐn d, ng) l' $\Delta_j \geq 0 \forall j$ (nĐi t² n tĐ j m' $\Delta_j \leq 0$ th³ cĐh tiĐp t, c cĐi th² n h²m m, c ti²u b²ng cĐch ch² n c, t j l²m c, t xoay...).

– Trong th, c t² n giĐ cĐc BTQHTT dĐng t² ng quĐt c' thWĐy ra trĐ ng h² p kh¹ ng t²m L'Đ c ph²ng Đn xuĐi phĐt (t, c l' kh¹ ng c' ph²ng Đn khĐ thi, xem th²m m, c 1.2). L'² n²y c' thWĐj l²n m¹ h²nh L'² thiĐ l²p c' cĐc LiQ ki² n r²ng bu, c quĐ chĐ chĐ, cĐh xem x² n, i l² ng cĐc LiQ ki² n n²y.

– Trong trĐ ng h² p ta t²m L'Đ c c, t xoay m' kh¹ ng t²m L'Đ c h²ng xoay th³ kĐ l²n h²m m, c ti²u kh¹ ng b' chĐ tr²n (L' i v, i cĐc BTQHTT dĐng Max) hoĐ kh¹ ng b' chĐ đ-Đ i (L' i v, i cĐc BTQHTT dĐng Min). Khi L' đ, ng quĐ tr²nh giĐ v' kĐ l²n m¹ h²nh quy hoĐh tuyĐh t²nh L'² thiĐ l²p kh¹ ng ph¹Đ p v, i th, c tĐ

1.4. Giải mô hình quy hoạch tuyến tính bằng các phần mềm tính toán

H² n nay c' nhiQ phĐh mQn t²nh toĐn giĐ B TQHTT khĐ hi² u quĐ nh²Excel, Lingo. Nh² ng phĐh mQn n²y rĐi th²n th² n v, i ngĐ i đ²ng. Tuy nhi²n cĐh nhĐi mĐh r²ng, v' c phĐt biW L'Đ c m¹ h²nh b²i toĐn v' ph²n t²ch, L²nh giĐ L'Đ c kĐ quĐ m, i ch²nh l' nh² ng kh²u quan tr² ng nhĐi trong ph²ng phĐp m¹ h²nh hoĐ. Sau L'², ch¹ng ta đ²ng phĐh mQn Lingo L'ĐgiĐ v² d, L'² x² tr²n.

$$z = 8x_1 + 6x_2 \rightarrow \text{Max}$$

v, i cĐc r²ng bu, c:

ɲ Wgiɪl b̄i toʂn n̄ y, ch⁴ng ta c⁴n c̄i L̄h Lingo v̄o trong m̄sy t̄nh. Nh̄m v̄o biW
 t̄ng Lingo tr̄o m̄ n̄ h̄nh LWv̄o c̄ a s̄ Lingo. Sau L̄: th̄ c̄ hī n̄ c̄sc l̄ nh̄ Lingo:
Menu > New > <Untitle> v̄ ḡ» v̄o c̄sc d̄ lī ū c̄ a b̄i toʂn nh̄ Ch̄nh I.4.



The screenshot shows the LINGO Reports Window with the following content:

```

Rows=      3  Vars=      2  No. integer vars=      0 ( all are linear)
Nonzeros=   8  Constraint nonz=   4(      0 are +- 1) Density=0.889
Smallest and largest elements in absolute value=   2.00000      60.0000
No. < :   2  No. =:   0  No. > :   0, Obj=MAX, GUBs <=   1
Single cols=      0

Optimal solution found at step:      0
Objective value:      132.0000

      Variable      Value      Reduced Cost
      X1      12.00000      0.0000000E+00
      X2      6.000000      0.0000000E+00

      Row      Slack or Surplus      Dual Price
      1      132.0000      1.000000
      2      0.0000000E+00      1.666667
      3      0.0000000E+00      0.6666667
  
```

KJ̣ qụḷ chi tịJ̣ cho ta bịJ̣ gịṣ tṛ c̣ c̣ Ḷᵛ c̣ a ḥṃ ṃ c̣ tịọ ụḷ 132 ṿ, i pḥᵛng̣ ṣṇ ṭ ị
 ᵛᵛ ḷ: $x_1 = 12$, $x_2 = 6$. C̣ṣc̣ gịṣ tṛ ṭ ị ᵛᵛ c̣, a c̣ṣc̣ bịJ̣ Ḷ ị ng̣ ᵛᵛ ḷ $y_1 = 5/3$ ṿ $y_2 = 2/3$ (c̣, ṇ
 g̣ ị ḷ c̣ṣc̣ gịṣ ᵛᵛ c̣ Ḷ nḥ hay gịṣ ḅ ng̣ *Shadow Prices*).

1.5. Một số ứng dụng của phương pháp đơn hình

(Giữ cố bản gốc quy hoạch xây dựng trong lĩnh vực công nghệ và Môi trường)

Bài toán phân phối điện năng

Có ba hệ phân tải của lưới điện cùng cấp điện năng cho hai nguồn điện năng có cách xa nhau. Giả sử nhu cầu điện năng tại mỗi vùng là cố định và không thay đổi. Khi đó cần cung cấp điện năng cho các nguồn này sao cho tổng chi phí vận chuyển điện năng là nhỏ nhất. Như vậy cần tìm cách phân phối điện năng cho hai nguồn điện năng sao cho tổng chi phí vận chuyển điện năng là nhỏ nhất. Gọi x_{ij} là lượng điện năng được vận chuyển từ nguồn i đến vùng j . Cần phải xác định các x_{ij} sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất. Như vậy ta có BTQHTT sau:

$$z = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 c_{ij} x_{ij} \rightarrow \text{Min}$$

với các điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq A_1, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq A_2, \\ x_{11} + x_{21} = B_1, \\ x_{12} + x_{22} = B_2, \\ x_{13} + x_{23} = B_3, \\ x_{ij} \geq 0, \quad \forall i = 1, 2 \text{ và } \forall j = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Comment [nht1]:

Comment [nht2]:

Bài toán trên có thể được giải bằng phương pháp đơn hình hoặc bằng phương pháp phân phối. Bài toán này có thể được giải bằng phương pháp đơn hình hoặc bằng phương pháp phân phối.

Bài toán phân tải cho máy

Một xưởng có hai loại máy M_1 và M_2 . Các loại máy này có thể vận hành được ba loại sản phẩm P_1, P_2 và P_3 với các năng suất là a_{ij} , trong đó M_1 sản xuất sản phẩm P_1 với năng suất a_{11} , M_1 sản xuất sản phẩm P_2 với năng suất a_{12} , M_1 sản xuất sản phẩm P_3 với năng suất a_{13} và M_2 sản xuất sản phẩm P_1 với năng suất a_{21} , M_2 sản xuất sản phẩm P_2 với năng suất a_{22} , M_2 sản xuất sản phẩm P_3 với năng suất a_{23} . Gọi x_j là tổng số sản phẩm P_j được sản xuất. Cần tìm cách phân phối công suất cho các máy sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất. Như vậy ta có BTQHTT sau:

Dựa trên bài toán này ta có BTQHTT sau:

$$z = \sum_{j=1}^3 c_j \sum_{i=1}^2 a_{ij} x_j \rightarrow \text{Max}$$

với các điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} a_{11}x_{11} + a_{21}x_{21} \geq b_1, \\ a_{12}x_{12} + a_{22}x_{22} \geq b_2, \\ a_{13}x_{13} + a_{23}x_{23} \geq b_3, \\ a_{11}x_{11} + a_{21}x_{21} \leq d_1, \\ a_{12}x_{12} + a_{22}x_{22} \leq d_2, \\ a_{13}x_{13} + a_{23}x_{23} \leq d_3, \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq m_1, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq m_2, \\ x_{ij} \geq 0, i = 1, 2 \text{ và } j = 1, 2, 3. \end{cases}$$

(trong đó m_1 và m_2 là tổng khối lượng máy M_1 và M_2).

Bài toán trên có thể phát biểu một cách tổng quát hơn và xin gọi là bài toán phân phối liên phân. Hơn nữa, trong lĩnh vực quy hoạch sản xuất hay quản lý kinh doanh, nó cũng có mặt trong ngành chế biến thực phẩm, công nghiệp dệt, ngành khai thác và mang lại hiệu quả kinh tế.

2. Bổ sung thêm về phương pháp đơn hình

2.1. Đưa BTQHTT về dạng chính tắc

Ví dụ 1: (Tìm giá trị cực đại của LQ có dạng $\leq$)

$$z = 8x_1 + 6x_2 \rightarrow \text{Max}$$

với các ràng buộc:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 48 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Để đưa BTQHTT về dạng chuẩn ta thêm biến bù (slack variables) x_3 và x_4 . Ta có BTQHTT dạng chuẩn là:

$$z = 8x_1 + 6x_2 + 0x_3 + 0x_4 \rightarrow \text{Max}$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 60 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_4 = 48 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Lưu ý, trong hai biến ràng buộc có hai biến không âm lập thành một cặp biến đơn vị, nên ta có thể phân phối lại các biến đơn vị để được bài toán đơn hình chuẩn. Một cách tổng quát, *BTQHTT dạng chính tắc là bài toán với các biến*

không âm, các ràng buộc với dấu "=", hệ số về phải của các ràng buộc không âm. Ngoài ra, mỗi phương trình bất buộc phải có một biến đứng độc lập với hệ số +1.

Ví dụ 2: (Trình hình p.c. LiQ ki n r ng bu, c v, i d b l $\geq$)

$$z = 8x_1 + 6x_2 \rightarrow \text{Max}$$

v, i c s c r ng bu, c:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 48 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ta th m c s c bi Jh b l x_3 (slack variable) mang d b l ã ò, x_4 (surplus variable) mang d b l ã ò L W c h LiQ ki n r ng bu, c sau:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 60 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 = 48 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Ph i th m bi Jh gi l x_5 (x_5 g i l l c ng vi ph m c, a ph c ng tr nh th hai) L W c c h LiQ ki n r ng bu, c

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 60 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 = 48 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

L c n y, L c c l hai bi Jh L ng L c l p trong t ng ph c ng tr nh v, i h s +1, n n L c c th W t m L c c ph c ng s n c c bi n xu l ph t L W b d L F u qu s tr nh gi l b i to s n b ng ph c ng ph s p L h n h n h v, i h m m, c ti u l z = $8x_1 + 6x_2 + 0x_3 + 0x_4 - Mx_5 \rightarrow \text{Max}$, trong L: $M \approx +\infty$ v bi W th c $-Mx_5$ g i l l c ng ph t (L s n h thu J). B i to s n L c L c L c v Q d t ng ch n h t d c. L c ng vi ph m x_5 c ng l, n th h m m, c ti u c ng gi l m, gi s tr c, a h m m, c ti u ch c th W t m Max khi $x_5 = 0$.

Ví dụ 3: (Trình hình p.c. bi Jh kh i ng d c ng)

$$z = 8x_1 - 6x_2 \rightarrow \text{Max}$$

v, i c s c r ng bu, c:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 60 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 = 48 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

L c n y m u n gi l b i to s n b ng ph c ng ph s p L h n h n h ta ph i l i bi Jh $x'_2 = -x_2$. Ta c BTQHTT v, i c s c bi Jh L Q kh i ng m.

$$z = 8x_1 + 6x_2 \rightarrow \text{Max}$$

vì các ràng buộc:

$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 60 \\ 2x_1 - 4x_2 - x_4 = 48 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Ví dụ 4: (Trên hệ phương trình biến ngẫu nhiên)

$$z = 8x_1 + 6x_2 \rightarrow \text{Max}$$

vì các ràng buộc:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 48 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad \text{điều kiện}$$

Lưu ý rằng biến ngẫu nhiên x_2 được định nghĩa là $x_2 = x'_2 - x''_2$ vì

$$\begin{cases} x'_2 = \max[0, x_2] \\ x''_2 = \max[0, -x_2] \end{cases} \quad \text{thì luôn có} \quad \begin{cases} x'_2 \geq 0 \\ x''_2 \geq 0 \end{cases}$$

Các ràng buộc sẽ là

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x'_2 - 2x''_2 + x_3 = 60 \\ 2x_1 + 4x'_2 - 4x''_2 + x_4 = 48 \\ x_1, x'_2, x''_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Biên độ của hàm mục tiêu là: $z = 8x_1 + 6x'_2 - 6x''_2 + 0x_3 + 0x_4$ và các biến ngẫu nhiên biến ngẫu nhiên BTQHTT được chuyển đổi.

Kết luận: Bao gồm cả hệ phương trình BTQHTT bất kỳ (các biến ngẫu nhiên, các ràng buộc $\leq, \geq, =$) và được chuyển đổi.

2.2. Phương pháp đơn hình mở rộng

Phương pháp đơn hình mở rộng là một phần của phương pháp đơn hình để giải các bài toán BTQHTT có biến ngẫu nhiên.

Ví dụ:

$$z = 8x_1 + 6x_2 \rightarrow \text{Max}$$

vì các ràng buộc:

$$(a) \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 48 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

hay: $z = 8x_1 + 6x_2 + 0x_3 + 0x_4 \rightarrow \text{Max}$ v. i c s c r n g bu, c

$$(b) \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 60 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 = 48 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Ta c th W i b i t o s n v Q d ũ n g ch n h t a c sau g i l i b i t o s n M:

$\text{Max } z = 8x_1 + 6x_2 + 0x_3 + 0x_4 - Mx_5$ (trong L: $M \approx +\infty$) v. i c s c r n g bu, c

$$(c) \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 60 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 = 48 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

Cách 1: C th W i b i t o s n v Q d ũ n g ch n h t a c sau g i l i b i t o s n M: (a) b ũ n g ph ũ n g ph ũ p L i t h i L ũ h n h B i c k i q u i: ph ũ n g s n t i i L i ($x_1 = 0, x_2 = 30$) v i z max = 180.

Cách 2: Gi i B T Q H T T v. i c s c L i Q i k i n r n g bu, c (c) b ũ n g c s c h l p b ũ n g L ũ n h n h n h t h i n g n h ũ n g ch i l i h i s M $\approx +\infty$ (xem b ũ n g I.2).

Bảng I.2. Các bảng đơn hình giải bài toán M

H' s h m m c t i o u	Bi l p c h s	Ph ũ n g s n	8	6	0	0	-M
			x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅
0	x ₃	60	4	2	1	0	0
-M	x ₅	48	2	4	0	-1	+1
H n g z		z ₀ = -48M	z ₁ = -2M	z ₂ = -4M	z ₃ = 0	z ₄ = M	z ₅ = -M
H n g Δ _j			Δ ₁ = 8+2M	Δ ₂ = 6+4M	Δ ₃ = 0	Δ ₄ = -M	Δ ₅ = 0
0	x ₃	36	3	0	1	1/2	-1/2
6	x ₂	12	1/2	1	0	-1/4	1/4
H n g z		72	3	6	0	-3/2	3/2
H n g Δ _j			5	0	0	3/2	-M - 3/2
0	x ₄	72	6	0	2	1	-1
6	x ₂	30	2	1	1/2	0	0
H n g z		180	12	6	3	0	0
H n g Δ _j			-4	0	-3	0	-M

T i b ũ n g L ũ n h n h c u i c ũ n g, ta th i y Δ_j ≤ 0 ∀ j n o n ph ũ n g s n t i i L i L i B i c v. i

$$x_2 = 30, x_4 = 72, \text{ c\acute{s}c } x_j \text{ kh\acute{s}c } = 0 \text{ v\text{''} } z_{\text{Max}} = 180.$$

Lưu ý

– Khi m\textsubscript{t} bi\textsubscript{J}h gi\textsubscript{I} L\textsubscript{«} L\textsubscript{«} c L\textsubscript{«} ra kh\textsubscript{i} c h\textsubscript{s\text{''}} th\textsubscript{3} kh\textsubscript{1} ng bao gi\textsubscript{''} quay l\textsubscript{«} n\textsubscript{a}. Do L\textsubscript{«} ta c\textsubscript{«} th\textsubscript{W}o\textsubscript{s} c\textsubscript{«} t bi\textsubscript{J}h gi\textsubscript{I} L\textsubscript{«} kh\textsubscript{i} b\textsubscript{I}ng L\textsubscript{h}n h\textsubscript{3}nh.

– N\textsubscript{J}u d\textsubscript{«}i h\textsubscript{i} u d\textsubscript{«} ng xu\textsubscript{«}i h\textsubscript{i} n ($\Delta_j \leq 0 \forall j$) nh\textsubscript{«}ng v\textsubscript{X}i c, n bi\textsubscript{J}h gi\textsubscript{I} v\textsubscript{i} gi\textsubscript{s} tr\textsubscript{«} d\textsubscript{«}ng trong s\textsubscript{''} c\textsubscript{s}c bi\textsubscript{J}h c h\textsubscript{s\text{''}} th\textsubscript{3} Li\textsubscript{Q}i n\textsubscript{''}y ch\textsubscript{i} ng t\textsubscript{«} b\textsubscript{''}i to\textsubscript{s}n ban L\textsubscript{F}u kh\textsubscript{1} ng th\textsubscript{W}c\textsubscript{«} ph\textsubscript{«}ng \textsubscript{s}n kh\textsubscript{I} thi (c\textsubscript{«} th\textsubscript{W}ch\textsubscript{i} ng minh b\textsubscript{3}ng ph\textsubscript{I}n ch\textsubscript{i} ng).

– V\textsubscript{i} i v\textsubscript{2} d\textsubscript{«} tr\textsubscript{o}n (xem b\textsubscript{I}ng I.2) ta th\textsubscript{«}y qu\textsubscript{s} tr\textsubscript{3}nh gi\textsubscript{I} chia l\textsubscript{''}m hai pha: pha 1 nh\textsubscript{3}m gi\textsubscript{I} b\textsubscript{''}i to\textsubscript{s}n M cho t\textsubscript{i} i khi bi\textsubscript{J}h gi\textsubscript{I} (x_5) L\textsubscript{«} c L\textsubscript{«} ra kh\textsubscript{i} s\textsubscript{''} bi\textsubscript{J}h c h\textsubscript{s\text{''}} (l\textsubscript{«} c n\textsubscript{''}y c\textsubscript{«} ph\textsubscript{«}ng \textsubscript{s}n c, c bi\textsubscript{o}n xu\textsubscript{«}i ph\textsubscript{s}t cho b\textsubscript{''}i to\textsubscript{s}n (b)) v\textsubscript{''} pha 2 nh\textsubscript{3}m t\textsubscript{3}m ph\textsubscript{«}ng \textsubscript{s}n t\textsubscript{''} i \textsubscript{«} cho b\textsubscript{''}i to\textsubscript{s}n (b).

– Ph\textsubscript{I}n m\textsubscript{Q}n t\textsubscript{3}nh to\textsubscript{s}n Lingo c\textsubscript{«} th\textsubscript{W}gi\textsubscript{I} L\textsubscript{«} c t\textsubscript{«}i c\textsubscript{s}c BTQH\textsubscript{TT} kh\textsubscript{1} ng L\textsubscript{i} h\textsubscript{i} i ng\textsubscript{«}i d\textsubscript{3}ng ph\textsubscript{I} L\textsubscript{«} ch\textsubscript{1}ng v\textsubscript{Q}d\textsubscript{«}ng ch\textsubscript{2}nh t\textsubscript{«}.

3. Mô hình quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu

3.1. Các khái niệm cơ bản

Phát biểu mô hình

Trong c\textsubscript{s}c b\textsubscript{''}i to\textsubscript{s}n k\textsubscript{«}thuat, c\textsubscript{1} ng ngh\textsubscript{i\text{''}}, qu\textsubscript{I}n l\textsubscript{2}, kinh\textsubscript{«} t\textsubscript{J}n\textsubscript{1} ng ngh\textsubscript{i\text{''}} p v.v... n\textsubscript{I}y sinh t\textsubscript{«} th\textsubscript{«} c\textsubscript{I}J ch\textsubscript{1}ng ta th\textsubscript{«} ng ph\textsubscript{I} xem x\textsubscript{«} L\textsubscript{W} i\textsubscript{«} ho\textsubscript{s} L\textsubscript{''} ng th\textsubscript{i} i m\textsubscript{«} t\textsubscript{I}c\textsubscript{«} nhi\textsubscript{Q}i m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u. C\textsubscript{s}c m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u n\textsubscript{''}y th\textsubscript{«} ng l\textsubscript{''} kh\textsubscript{s}c v\textsubscript{Q}th\textsubscript{«} nguy\textsubscript{o}n, t\textsubscript{«} c l\textsubscript{''} ch\textsubscript{1}ng L\textsubscript{«} c Lo b\textsubscript{''} i c\textsubscript{s}c L\textsubscript{h}n v\textsubscript{''} kh\textsubscript{s}c nhau. Nh\textsubscript{«} ng t\textsubscript{3}nh h\textsubscript{u\text{''}} ng nh\textsubscript{«}v\textsubscript{«}y t\textsubscript{«} ra c\textsubscript{s}c b\textsubscript{''}i to\textsubscript{s}n t\textsubscript{''} i \textsubscript{«} La m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u. Nh\textsubscript{«}v\textsubscript{«}y, ch\textsubscript{1}ng ta c\textsubscript{F}h ph\textsubscript{I} t\textsubscript{''} i \textsubscript{«} ho\textsubscript{s} (c\textsubscript{«} c L\textsubscript{I} ho\textsubscript{s} ho\textsubscript{H} c\textsubscript{«} c t\textsubscript{I}W ho\textsubscript{s} tu\textsubscript{8} theo t\textsubscript{3}nh h\textsubscript{u\text{''}} ng th\textsubscript{«} c\textsubscript{I}J kh\textsubscript{1} ng ph\textsubscript{I} l\textsubscript{''} ch\textsubscript{''} m\textsubscript{«} t m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u n\textsubscript{o} L\textsubscript{''}, m\textsubscript{''} l\textsubscript{''} L\textsubscript{''} ng th\textsubscript{i} i t\textsubscript{«}i c\textsubscript{s}c m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u L\textsubscript{«} L\textsubscript{H}ra.

B\textsubscript{''}i to\textsubscript{s}n t\textsubscript{''} i \textsubscript{«} La m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u m\textsubscript{''} trong L\textsubscript{«} mi\textsubscript{Q}i r\textsubscript{''}ng bu\textsubscript{«} c D l\textsubscript{''} t\textsubscript{«}p l\textsubscript{''} i La d\textsubscript{i} n v\textsubscript{''} c\textsubscript{s}c m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u $z_i = f_i(X)$, v\textsubscript{i} i i = 1, 2, \acute{e}, p, l\textsubscript{''} c\textsubscript{s}c h\textsubscript{''}m tuy\textsubscript{J}h t\textsubscript{3}nh x\textsubscript{s}c L\textsubscript{''} nh tr\textsubscript{o}n D, L\textsubscript{«} c g\textsubscript{«} i l\textsubscript{''} b\textsubscript{''}i to\textsubscript{s}n quy ho\textsubscript{«}ch tuy\textsubscript{J}h t\textsubscript{3}nh La m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u. Khi L\textsubscript{«}, ta c\textsubscript{«} m\textsubscript{1} h\textsubscript{3}nh to\textsubscript{s}n h\textsubscript{«} c sau L\textsubscript{«} L\textsubscript{«} c g\textsubscript{«} i l\textsubscript{''} m\textsubscript{1} h\textsubscript{3}nh quy ho\textsubscript{«}ch tuy\textsubscript{J}h t\textsubscript{3}nh La m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u :

Max CX với ràng buộc $X \in D$, trong đó:

C là ma trận cấp $p \times n$

$$D = \{ X \in R^n : AX \leq B \}$$

với A là ma trận cấp $m \times n$ và $B \in R^m$.

Ví dụ: BTQH\textsubscript{TT} v\textsubscript{i} hai m\textsubscript{«} c ti\textsubscript{o}u

$$f_1(X) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \text{Min hay } z_1 = f_1(X) = -x_1 - 2x_2 \rightarrow \text{Max}$$

$$z_2 = f_2(X) = 2x_2, \rightarrow \text{Max}$$

v\textsubscript{i} i c\textsubscript{s}c r\textsubscript{''}ng bu\textsubscript{«} c



11/11/2016

11/11/2016

CH_2

CH_2

CH_2

CH_2

CH_2

CH_2

CH_2

CH_2

CH_2

CH_2


CH_2

$$f_1(X) = x_1 + 2x_2 \rightarrow \text{Min}$$

$$f_2(X) = 2x_2 \rightarrow \text{Max}$$

Với các ràng buộc

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



Hình 1.6. Minh họa đồ thị BTQHTT hai mục tiêu

Miền các phƣơng ƣn khĩ thi D (miền giĩ hĩn bĩ i Loĩn AB vĩ cĩc tia Ad, Bx) lĩ cĩc biĩ thĩ trĩn hĩn 1.6. $\vec{n}_1(-1, -2)$ lĩ hĩc ng giĩm cĩc a mĩc tiĩu 1, cĩn $\vec{n}_2(0, 2)$ lĩ hĩc ng tĩng cĩc a mĩc tiĩu 2.

Lĩc nĩy A(0, 3) cĩng nhĩ B(3, 0) lĩ hai phĩc ƣng ƣn tĩ i cĩc Pareto cĩc a bĩ i toĩn trĩn. Dũ thĩy tĩp hĩ p P tĩĩ cĩc phĩc ƣng ƣn tĩ i cĩc Pareto bao gĩĩ m cĩc Liĩn nĩn trĩn Loĩn AB vĩ Ad.

3.2. Một số phương pháp giải BTQHTT đa mục tiêu

Định nghĩa 1

Giĩĩ bĩ i toĩn tĩ i cĩc toĩn cĩc lĩc a mĩc tiĩu lĩ chĩn ra tĩ tĩp hĩ p P cĩc phĩc ƣng ƣn tĩ i cĩc Pareto cĩc a bĩ i toĩn mĩ t (hoĩĩ mĩ t sĩ) phĩc ƣng ƣn tĩ t nhĩĩ (thoĩĩ mĩn nhĩĩ) theo mĩ t nghĩĩ nĩĩ o Lĩ dĩ a trĩn chĩĩ cĩc tiĩn cĩc a ngĩĩ i ra quyĩĩ Lĩ nh.

Trong vĩ dũ trĩn, tuĩ theo chĩĩ cĩc tiĩn cĩc a ngĩĩ i ra quyĩĩ Lĩ nh, chĩĩng ta cĩ thĩy chĩn ra mĩ t hoĩĩ mĩ t sĩ Liĩn tĩ i cĩc Pareto nĩn trĩn AB hoĩĩ tia Ad lĩ m phĩc ƣng ƣn tĩ i cĩc cĩc a bĩ i toĩn.

Cách 1: B₃ung m₁ t ph₁Chng ph₁sp t₁ i₁ Ch to₁sn h₁ c th₁ch h₁ p t₁m ra t₁p h₁ p P t₁h₁c₁f₁c₁sc ph₁Chng sn t₁ i₁ Ch Pareto. Ng₁Ch i₁ ra quy₁J₁ L₁nh s₁E L₁Qra ch₁ ch₁Ch₁ Ch ti₁o₁n₁ c₁ a m₁nh L₁ i₁ v₁ i₁ t₁p P nh₁um t₁m ra ph₁Chng sn t₁ i₁ Ch Pareto tho₁Γm₁«n nh₁Ch₁ cho b₁i₁ to₁sn L₁a m₁ c₁ ti₁o₁ ban L₁Fu.

Cách 2: Vì c t³m t³p h³p P trong tr³ng h³p c³ch b³i to³sn nhi³Q bi³J³ l³ kh³ kh³ v³ m³l³ nhi³Q th³ i gian. V³ v³dy, so v³ i c³sch 1, c³sch 2 s³ ti³J³ h³nh theo tr³nh t³ ng³c³ l³Q. Tr³c³ h³J³ ng³c³ i ra quy³J³ L³nh s³ L³Qra ch³c³h³ c³ti³o n³c³ a m³nh. D³ a v³o ch³c³h³ c³ti³o n³L³; c³ch m³c³ti³o u s³ L³c³t³ h³p v³o m³t m³c³ti³o u duy nh³l³ti³o u bi³W cho h³m t³ ng³t³ n³ch c³ a b³i to³sn. B³i to³sn t³ i c³ti³o v³ i h³m m³c³ti³o u t³ h³p n³y s³ L³c³ gi³l³ b³ng m³t ph³ch³ng ph³sp t³ i c³ti³o to³sn h³c³ th³ch h³p, L³W³m ra m³t (ho³h³ m³t s³) ph³ch³ng sn t³ i c³ti³o Pareto. L³c³ n³y, ng³c³ i ra quy³J³ L³nh s³ ch³ n ra trong s³ c³ch ph³ch³ng sn t³ i c³ti³o Pareto L³ m³t ph³ch³ng sn t³ i nh³l³.

Ch'ing ta sE tiP t, c ph@ t2ch cSch th. 2. R » r'ng, ngE i ra quyJ. L'nh kh' ng thWlQ ra ch cB. @ ti^n c, a m3nh m, t cSch ch2nh xSc ngay t. Lfu. Trong quS tr3nh giT b' i toSn, trong m, i b-E c lHp, sau khi xem x@ l' ch cB. @ ti^n L« LQra, c'ng nh Eph-Chng Sn trung gian v, a t3m L'E c, ngE i ra quyJ. L'nh c. thWd, a v'o cSch th'ng tin L. L'Wthay L' i l' ch cB. @ ti^n c, a m3nh. Sau L', quS tr3nh giT l' L'E c tiP t, c, cho t i khi m, t ph-Chng Sn t' i @ cu' i c'ng L'E c L@ ra.

Định nghĩa 2

Ph-~~Chng~~ ph~~sp~~ gi~~l~~ b' i to~~sn~~ t' i - ~~Ch~~ La m, c ti^ou d a tr^on s, tr' gi¹/₄ c, a h' m~~sy~~ t²nh, nh³m gi¹/₄ ng⁰ i ra quy¹/₂. L' nh t' ng b-~~Ch~~ thay L' i c~~sch~~ quy¹/₂. L' nh trung gian m, t c~~sch~~ th²ch h' p L^WLi t i m, t ph-~~Chng~~ ~~sn~~ t' i - ~~Ch~~ Pareto tho¹/₂ m~~«n~~ nh¹/₂. L' c g' i l' ph-~~Chng~~ ph~~sp~~ t-~~Chng~~ t~~sch~~ ng⁰ i - m~~sy~~ t²nh.

Phong phṣp t'ong ṭṣc ng'ē i - m̄sy t'nh gi'p b' i to'sn t' i - L'a m̄ c ti'ou c' c̄ṣc y'Ji
t' c̄h' th'nh sau:

– Chchĩĩ Ɔti°n c, a ngẽĩ ra quyJĩ L'nh v" h"m t' h° p t Ɔng ng.

– KiW t^hong t^hoc ng^h i – m^hsy t^hnh: cho biJ c^hoc th^h ng tin n^h o m^hsy t^hnh ph^h L^h ra l^h trong c^hoc b^h c l^h trung gian, v^h c^hsch thay L^h i c^hoc th^h ng s^h c^h a ch c^h t^h ti^ho n^h t^h ph^h2a ng^h i ra quyJ L^h nh.

– KQ thu được từ phân tích LCA cho thấy rằng việc sử dụng năng lượng tái tạo có thể giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon và giảm thiểu tác động môi trường. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ này vẫn còn cao, cần có chính sách hỗ trợ để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi.

Cho t i th i Li Vi hi n nay, h ng ch c ph-~~Chng~~ phsp gi l BTQHTT La m c ti u L< L'c c EQ d t i trong csc t p ch² chuy n ng nh, m La s' ch¹/ng LQ c nh ng ng d ng r b th nh c¹ ng trong nhi Q lnh v c, nh e ph-~~Chng~~ phsp tham s', ph-~~Chng~~ phsp n n phsp tuy Jh, ph-~~Chng~~ phsp v c th c c L¹, ph-~~Chng~~ phsp tr ng s' t-~~Chng~~ tsc c, a Chebysev, ph-~~Chng~~ phsp tho l d ng m t-~~Chng~~ tsc c, a Nguy n H l Thanh.

3.3. Phương pháp thỏa dung mờ tương tác giải BTQHTT đa mục tiêu

Thuật giải

a. Bước khởi tạo

– Nháp số liệu cho các hàm mục tiêu tùy thuộc biến $z_i (i = 1, 2, \dots, p)$ và mức độ liên quan giữa các biến.

– Giải BTQHTT cho từng hàm mục tiêu $z_i (i = 1, 2, \dots, p)$ và tìm ra vùng khả dụng chung của các phương trình $X^1, X^2, \dots, X^p$ (nếu có) và tìm ra hàm mục tiêu tối ưu của bài toán khi cho phương trình i là trục hoành xem xét cách tính các mức độ liên quan giữa các biến.

– Tìm giá trị hàm mục tiêu tối ưu của phương trình $X^1, X^2, \dots, X^p$.

Lập bảng pay-off. Xác định giá trị cận trên z_i^B và giá trị cận dưới z_i^W của hàm mục tiêu $z_i (i=1, 2, \dots, p)$.

– Xác định các hàm thỏa mãn $\mu_1(z_1), \mu_2(z_2), \dots, \mu_p(z_p)$ cho từng hàm mục tiêu đã cho và tìm ra giá trị pay-off theo cách tính:

$$\mu_i(z_i) = \frac{z_i - z_i^W}{z_i^B - z_i^W}, \quad i=1, 2, \dots, p.$$

– $\eta_k = 1$.

b. Các bước lặp (xây dựng hàm mục tiêu)

Bước 1: Xây dựng hàm mục tiêu tổng hợp từ các hàm thỏa mãn trên:

$$w_1\mu_1(z_1) + w_2\mu_2(z_2) + \dots + w_p\mu_p(z_p) \rightarrow \text{Max}$$

Trong đó: $w_1, w_2, \dots, w_p$ là các trọng số phản ánh tầm quan trọng của từng hàm thỏa mãn trong tổng hợp hàm tổng hợp, và

$$w_1 + w_2 + \dots + w_p = 1 \quad \text{và} \quad 0 \leq w_1, w_2, \dots, w_p \leq 1.$$

Bước 2:

– Giải BTQHTT và tìm ra hàm mục tiêu tổng hợp và mức độ liên quan giữa các biến. Các phương trình i của bài toán lập trình $X^{(k)}$ và giá trị của các hàm mục tiêu z_i cần tính nháp các hàm thỏa mãn $\mu_i(z_i)$ ($i = 1, 2, \dots, p$).

– Nếu ngừng lại quy trình tìm kiếm hàm mục tiêu và các giá trị của các hàm mục tiêu cần tính nháp các hàm thỏa mãn $\mu_i(z_i)$ ($i = 1, 2, \dots, p$) thu được $X^{(k)}$ của phương trình i của hàm mục tiêu nháp $\eta_k = k + 1$, quay lại bước 1.

– Nếu ngừng lại quy trình tìm kiếm hàm mục tiêu và các giá trị của các hàm mục tiêu cần tính nháp $X^{(k)}$. Chuyển sang bước 3.

Bước 3: Kết thúc.

Ví dụ: Giải BTQHTT hai hàm mục tiêu.

$$z_1 = 8x_1 + 6x_2 \rightarrow \text{Max}$$

$$z_2 = x_1 + 3x_2 \rightarrow \text{Max}$$

vì i c̣c ṛng bu, c:

$$(D) \begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 60 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 48 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

a. Bước khởi tạo

– Giải BTQHTT cho ṭng ṃc ṭfu trong ṿt đ̣ tṛn ta c̣ hai ḅi tọn: $\text{Max } z_1 = 8x_1 + 6x_2$
 $\rightarrow \text{Max } v_1$ i LiQ̣ kịn ṛng bu, c (D) cho pḥng̣ ṣn ṭ i $X^1(12, 6)$ ṿ $\text{Max } z_1 = 132$;
 $z_2 = x_1 + 3x_2 \rightarrow \text{Max}$ cho pḥng̣ ṣn ṭ i $X^2(0, 12)$ ṿ $\text{Max } z_2 = 36$.

Nḥṿ ḍy miQ̣ pḥng̣ ṣn ṭ i X^1 Pareto cḥnh ḷ ṃ i pḥng̣ ṣn thu, c AB (xem ḥnh I.1), ṿ i A(0, 12) ṿ B(12, 6). $\bar{n}_1(8, 6)$ ḷ ḥng ṭng c̣, a ṃc tịu 1, c̣n $\bar{n}_2(1, 3)$ ḷ ḥng ṭng c̣, a ṃc tịu 2. Do ḷ, khi cḥn pḥng̣ ṣn ṭ i X^1 Pareto đ̣ch đ̣n ṭ B ṿQA tḥ z_1 gịm, z_2 ṭng. C̣ḥn ṭm pḥng̣ ṣn ṭ i X^2 Pareto "thọ ṃn nḥt" thu, c AB ḅng c̣cḥ ṇḥng ḷc̣ng g̣i a z_1 ṿ z_2 .

– Ḷp ḅng pay-off cho c̣c ṃc tịu

Pḥng̣ ṣn X_i	z_1	z_2
$X^1(12, 6)$	132	30
$X^2(0, 12)$	72	36

Đ̣, a tṛn tḥng tin c̣, a ḅng pay-off, ta c̣ $z_1^W = 72$, $z_1^B = 132$; c̣n $z_2^W = 30$, $z_2^B = 36$. Do ḷ, ḷọn bịṇ thịn c̣ḥ x̣ cho z_1 ḷ $[72, 132]$ ṿ cho z_2 ḷ $[30, 36]$. Ṭ ḷ cḥng ta c̣ tḥWhiJ̣ ḷp c̣c ḥṃ thọ đ̣ng ṃ̣ ng ṿ i hai ṃc tịu Ḷ cho nḥsau:

$$\mu_1(z_1) = \frac{z_1 - z_1^W}{z_1^B - z_1^W} = \frac{z_1 - 72}{132 - 72} = \frac{z_1}{60} - \frac{72}{60} = \frac{z_1}{60} - 1,2$$

Ḥṃ thọ đ̣ng ṃ̣ tṛn ḷc̣ pḥ thu, c ṿo z_1 , ṇn pḥ thu, c ṿo (x_1, x_2) . Khi c̣ ṃ, ṭ pḥng̣ ṣn kḥḷ thị (x_1, x_2) ta ṭnh ḷc̣ c̣ ḷ thọ đ̣ng $\mu_1(z_1)$ ḷ i ṿ i ṃc tịu z_1 . Ṭng ṭ ḷ i ṿ i z_2 ta c̣ ḥṃ thọ đ̣ng ṃ̣ :

$$\mu_2(z_2) = \frac{z_2 - z_2^W}{z_2^B - z_2^W} = \frac{z_2 - 30}{36 - 30} = \frac{z_2}{6} - 5.$$

Ḷp ḥṃ thọ đ̣ng ṭ ḥ p̣ u = $w_1\mu_1(z_1) + w_2\mu_2(z_2)$, trong ḷ w_1, w_2 ḷ c̣c tṛng ṣ thọ ṃn $0 \leq w_1, w_2 \leq 1$ ṿ $w_1 + w_2 = 1$.

b. Các bước lặp

$$\text{X̣ } w_1 = 0,5 \text{ ṿ } w_2 = 0,5, \text{ tḥ c̣ } u = 0,5 \left(\frac{z_1}{60} - 1,2 \right) + 0,5 \left(\frac{z_2}{6} - 5 \right) = \left(\frac{z_1}{120} + \frac{z_2}{12} \right) + 1,9. \text{ ṇ W}$$

c, c là hàm thoả mãn điều kiện, ta chọn hàm $\text{Max } \left\{ \frac{z_1}{120} + \frac{z_2}{12} \right\}$. Vậy chúng ta cần giải

bài toán: $\text{Max } u = \frac{z_1}{120} + \frac{z_2}{12}$ với các ràng buộc (D), hay bài toán tương đương:

$z = 120u/18 = x_1 + 2x_2 \rightarrow \text{Max } v_i$ các ràng buộc (D). Giải BTQH TT này ta sẽ có kết quả (0, 12). Nếu thay lại giá trị của bài ràng buộc (w_1, w_2) thì sẽ thu được các phương trình Pareto khác nhau, như là Q nằm trên trục hoành AB.

Chú ý: Chúng ta biết rằng, với bài ràng buộc (w_1, w_2) ta tìm được một phương trình Pareto (x_1, x_2) bằng cách làm cho c là hàm thoả mãn điều kiện và u là thì lập được. Các thì chọn các bài ràng buộc w_1, w_2 khác nhau ta có các phương trình Pareto khác nhau. Các phương trình Pareto, chúng ta chọn được các phương trình Pareto tốt nhất.

Phần mềm MULTIOPT phiên bản 1.0 là công cụ để đánh giá trên phương pháp thoả mãn điều kiện mà chúng ta sẽ nhận giải BTQH TT là một câu. Chương trình là công cụ để đánh giá bằng ngôn ngữ Visual Basic, có giao diện thân thiện và dễ dùng. Các chức năng chính của phần mềm bao gồm:

- Chức năng nhập dữ liệu cho BTQH TT là một câu mà các cách trình bày: nhập dữ liệu qua bảng phím hoặc nhập dữ liệu từ tệp.
 - Xử lý bài toán là được nhập ra tệp.
 - Giải bài toán: theo dạng bài pay-off và giải theo phương pháp ràng buộc.
 - Xử lý kết quả ra tệp: xử lý kết quả trung gian ra tệp / xử lý kết quả cuối cùng ra tệp.
- Sau khi là các lệnh chương trình, một liên kết để chương trình sẽ là các tệp từ menu *Start > Programs* của Windows. Nếu không có lệnh chương trình, kích hoạt menu *Start > Programs > Tối ưu đa mục tiêu*.

Sau đó, cần phải chọn bài toán bằng cách vào menu *Chương trình*, và chọn *Bài toán tuyến tính*.

Ngay khi nhập dữ liệu cho thì nhập dữ liệu theo một trong hai cách sau:

Nhập dữ liệu từ bàn phím

Chọn menu *Xử lý bài toán > Nhập dữ liệu > Nhập từ bàn phím*.

Các số liệu nhập vào của chương trình bao gồm:

- n - số biến;
- m - số các ràng buộc;
- m1 - số các ràng buộc $\leq$;
- m2 - số các ràng buộc $\geq$;
- p - số câu tối ưu;
- ep - số dòng để nhập;
- gz - số dòng để nhập.

Nhập dữ liệu từ tệp

Thì c hỉ n l' nh *Xử lí bài toán>Nhập dữ liệu>Nhập từ tệp*, sau L' ch' n t' p d' lí u.

Ví dụ:

Giả b' i t' o' s' n quy ho' c' h t' u' y' h' t' 2' nh ba m' c t' i' o' u.

$$z_1 = x_1 - 2x_2 + 3x_4 \rightarrow \text{Max}$$

$$z_2 = -3x_1 + 6x_2 - 9x_4 \rightarrow \text{Max}$$

$$z_3 = 5x_1 + x_2 + 2x_3 \rightarrow \text{Max}$$

v' i c' s' c r' 'ng bu' c:

$$\begin{cases} -2x_1 + x_3 \leq 6; \\ x_1 + x_2 + 5x_3 \leq 6; \\ 6x_1 + 5x_2 - 3x_3 \leq 6; \\ -x_3 + 4x_4 \leq 8; \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Nh' e' v' d' y', ' L' o' y ch' /ng ta mu' n c' c L' i' ho' s' L' 'ng th' i ba h' m m' c t' i' o' u tr' o' n m' i' Q' D c' s' c ph' o' ng s' n kh' i' thi tho' m' m' c' n L' 'ng th' i b' n r' 'ng bu' c v' ' L' i' Q' ki' n kh' i' ng m' c' a c' s' c b' i' h'.


Hình 1.7. Nhập dữ liệu từ bàn phím

Trong b' o' c kh' i t' i' b, ta nh' p d' lí u t' b' n ph' m nh' e' tr' o' n h' 3' nh 1.7.

– Sau khi L' c' nh' p d' lí u, thì c hỉ n t' 2' nh c' s' c b' o' c trung gian (t' 2' nh c' s' c gi' s' tr' trong b' i' ng pay-off, t' 2' nh c' s' c gi' s' tr' cho c' s' c h' m tho' i' d' ng) b' o' ng c' s' c h' n *Xử lí bài toán>Tính toán>Tính trung gian*.

– Thì c hỉ n *Xử lí bài toán>Tính toán>Phương pháp trọng số*. Tr' o' n m' n h' 3' nh xu' h' i' h' i' n form nh' p c' s' c gi' s' tr' t' r' 'ng s' (xem h' 3' nh 1.7: c' s' c gi' s' tr' c' a t' r' 'ng s' L' e' c' nh' p sao cho

c. t'ng l' 1). Sau khi nh'p c'sc gi's tr' tr'ng s' nh'p v' o n'á *Giải bài toán* (Wgi' b'i to'sn (xem h'nh I.8).



Hình I.8. Nhập các giá trị trọng số và giải bài toán

Kết qu' tr' n h'nh I.8 l' $x_1 = 1,45$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0,91$, $x_4 = 0$, $\mu_1(z_1) = 0,42$, $\mu_2(z_2) = 0,58$, $\mu_3(z_3) = 1$; $z_1 = 1,45$, $z_2 = -4,36$ v' $z_3 = 9,09$. ng v' i b, tr'ng s' $w_1 = 0,2$, $w_2 = 0,3$ v' $w_3 = 0,5$.

4. Mô hình tối ưu phi tuyến đơn và đa mục tiêu

4.1. Một số khái niệm cơ bản

Mô hình tối ưu tổng quát

M' h'nh t' i t'ng qu'st, hay b'i to'sn t' i t'ng qu'st, c' d'ng:

$$F(X) \rightarrow \text{Min (Max)} \text{ với } X \in D \subset R^n.$$

L' $F(X)$ c' th'w' m' t' h'm v' h'ng hay h'm v' th, tuy'j' t'nh hay phi tuy'j'. Trong tr'ng h' p $F(X)$ l' h'm v' h'ng th' ta c' m' h'nh t' i t'ng qu'st m, c' ti'ou, c, n'j' F l' h'm v' th th' c' m' h'nh t' i t'ng qu'st m, c' ti'ou. D' l' c' g' i' m'Q' r'ng bu, c' hay m'Q' ph'ng s'n kh' thi, th'ng l' c' bi'w' d' n' b' i c'sc l'ng th' c' v' /ho' h' c'sc b' l'ng th' c'.

Mô hình tối ưu phi tuyến đơn mục tiêu

D'ng ch'nh t' c, a b'i to'sn t' i t'ng qu'st m, t' m, c' ti'ou l' c' bi'w' d' n' nh' c'sau:

$$f(X) \rightarrow \text{Min (Max)}, \quad X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n,$$

với:

$$(i) \quad g_j(X) \leq 0, \quad j = 1, 2, \dots, k,$$

$$(ii) \quad g_j(X) = 0, \quad j = k+1, k+2, \dots, m,$$

Trong các bài toán thực tế có thể bổ sung các ràng buộc

$$(iii) \quad a_i \leq x_i \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Trong trường hợp hàm mục tiêu $f(X)$ hoặc một trong các hàm ràng buộc $g_j(X)$, $j = 1, 2, \dots, m$, là hàm phi tuyến, chúng ta có bài toán tối ưu phi tuyến. Khi tất cả các biến x_i đều thuộc miền các giá trị nguyên, $i = 1, 2, \dots, n$, thì ta có bài toán tối ưu nguyên. Cần chú ý rằng bài toán tối ưu (nhưng không phải tất cả các biến đều thuộc miền giá trị nguyên) thì ta có bài toán tối ưu hỗn hợp nguyên.

Khi sử dụng các phương pháp (minimizing) cho bài các ràng buộc (i), (ii) và/hoặc (iii) thì bài toán tối ưu trở nên phức tạp hơn như sau:

$$f(X) \rightarrow \text{Min (Max)} \text{ với } X \in D.$$

Lúc này, để tìm bài toán cực tiểu hoặc $X^* \in D$ để có giá trị nhỏ nhất của hàm $f(X)$ với $X \in D$ ta cần chú ý: $f(X^*) \leq f(X)$. Trong trường hợp $f(X^*) \leq f(X)$ chỉ đúng với $\forall X \in D$ trong miền xác định của X^* thì X^* là cực tiểu địa phương. Một cách tổng quát, ta có thể nhận xét rằng bài toán tối ưu địa phương hoặc là phi tuyến cho bài toán cực tiểu hoặc. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm phương pháp tối ưu cục bộ thì ta có bài toán tối ưu toàn cục.

Trong các bài toán tối ưu phi tuyến, ứng dụng của chúng, trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, là cần thiết, phương pháp tối ưu toàn cục của một lĩnh vực quan trọng. Chúng ta thấy rằng, sau khi dùng phương pháp phân tích để quy hoạch chi phí, ta thường thu được hàm mục tiêu $f(X)$ có dạng phi tuyến. Bài toán Linear phải tìm kiếm phương pháp tối ưu cục bộ.

Cần hiểu rằng phương pháp giải các bài toán tối ưu phi tuyến, nhưng chúng ta phải phân biệt rõ ràng, ra họ và họ cho mỗi bài toán tối ưu phi tuyến, để biết rằng các bài toán tối ưu nguyên và hỗn hợp nguyên.

Mô hình tối ưu phi tuyến đa mục tiêu

Mô hình tối ưu đa mục tiêu có dạng:

$$z_j = f_j(X) \rightarrow \text{Min (Max)}, \quad X = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad j = 1, 2, \dots, p \quad (p \geq 2)$$

với:

$$(i) \quad g_j(X) \leq 0, \quad j = 1, 2, \dots, k,$$

$$(ii) \quad g_j(X) = 0, \quad j = k+1, k+2, \dots, m,$$

Trong các bài toán thực tế có thể bổ sung các ràng buộc

$$(iii) \quad a_i \leq x_i \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Trong m¹ h³nh n²y, ta c¹ p m_c c ti^ou c¹h t¹ i ¹ ¹ ho¹s, c¹s c h¹ s¹ c_a a c¹s c h¹m m_c c ti^ou v¹ r¹ng bu, c n¹i chung L¹c c gi¹s¹ l¹ c¹s c gi¹s tr¹ th¹ c x¹s c L¹nh. Trong tr¹c¹ng h¹ p c¹ 2¹ nh¹ b¹i m_t t trong c¹s c h¹m m_c c ti^ou hay c¹s c h¹m r¹ng bu, c l¹ h¹m phi tuy¹J¹h, ch¹ng ta c¹ b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ phi tuy¹J¹h L¹a m_c c ti^ou.

n¹ i v_i i b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ phi tuy¹J¹h L¹a m_c c ti^ou ch¹ng ta c¹ng c¹ kh¹s i n¹i m ph¹ ¹ng s¹n t¹ i ¹ ¹ Pareto nh¹ ¹l¹« t¹nh b¹y trong m_c c 3.1 v¹ 3.2 L¹ i v_i i BTQHTT L¹a m_c c ti^ou.

C¹ng nh¹ ¹l¹ i v_i i c¹s c BTQHTT L¹a m_c c ti^ou, ph¹ ¹ng ph¹s p gi¹i b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ phi tuy¹J¹h L¹a m_c c ti^ou d¹ a tr¹o n s_i tr¹ gi¹p c_a h¹ m¹s y t¹nh, nh¹ ¹m gi¹p ng¹ ¹ i ra quy¹J¹ L¹nh t¹ ng b¹ c thay L¹ i c¹s c quy¹J¹ L¹nh trung gian m_t c¹s c th¹ch h¹ p L¹W¹i t¹ i m_t t ph¹ ¹ng s¹n t¹ i ¹ ¹ Pareto tho¹ ¹m¹n nh¹ b¹i, L¹c c g¹ i l¹ ph¹ ¹ng ph¹s p t¹ ¹ng t¹s c ng¹ ¹ i-m¹s y t¹nh.

4.2. Một số phương pháp và phần mềm giải bài toán tối ưu phi tuyến đơn mục tiêu

Các phương pháp giải bài toán tối ưu toàn cục

C¹s c ph¹ ¹ng ph¹s p gi¹i b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ to¹n c_a c phi tuy¹J¹h L¹h m_c c ti^ou L¹c c ph¹ ¹ ra th¹nh hai l¹ p: ph¹ ¹ng ph¹s p t¹ b¹i L¹nh (*deterministic methods*) v¹ ph¹ ¹ng ph¹s p ng¹ ¹ nh¹o n (*stochastic methods*).

Ph¹ ¹ng ph¹s p t¹ b¹i L¹nh s¹ d¹ ng c¹s c t¹nh ch¹ b¹i gi¹i t¹ch c_a h¹ m m_c c ti^ou v¹ c¹s c h¹m r¹ng bu, c. M¹ t¹ s¹ d¹ng b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ to¹n c_a c v_i i nh¹ ng t¹nh ch¹ b¹i gi¹i t¹ch nh¹ b¹i L¹nh c_a h¹ m m_c c ti^ou v¹ c¹s c h¹m r¹ng bu, c c¹ th¹W gi¹i L¹c c b¹ng c¹s c ph¹ ¹ng ph¹s p t¹ b¹i L¹nh th¹ch h¹ p, ch¹ng h¹ nh¹ ¹ph¹ ¹ng ph¹s p quy ho¹ch to¹n ph¹ ¹ng, quy ho¹ch t¹s c, quy ho¹ch l¹ i, quy ho¹ch d¹cé. Trong c¹s c tr¹c¹ng h¹ p L¹: ph¹ ¹ng s¹n t¹ i ¹ ¹ to¹n c_a c c¹ th¹W¹m L¹c c sau m_t t s¹ h¹ u h¹ b¹ c t¹nh to¹sn v_i i L¹ ch¹nh x¹s c ch¹ n tr¹ c. Tuy nh¹o n, L¹ i v_i i nh¹ ¹ l¹ p b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ to¹n c_a c ph¹ ¹ng ph¹s p t¹ b¹i L¹nh t¹ ra kh¹ ng c¹ h¹ u qu¹.

Trong khi L¹, c¹s c ph¹ ¹ng ph¹s p ng¹ ¹ nh¹o n nh¹ ¹ ph¹ ¹ng ph¹s p L¹a kh¹ i t¹ b¹ (*multistart*), m¹ ph¹ ng t¹ i (*simulated annealing*), thu¹ d¹ gi¹i di truy¹Q¹ (*genetic algorithm*), ¹ c¹ th¹W s¹ d¹ ng L¹W gi¹i c¹s c b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ to¹n c_a c d¹ng b¹i k³, kh¹ ng L¹ i h¹ i c¹s c t¹nh ch¹ b¹i L¹h b¹i t¹ c_a h¹ m m_c c ti^ou hay c¹s c h¹m r¹ng bu, c. C¹s c ph¹ ¹ng ph¹s p ng¹ ¹ nh¹o n L¹h b¹i t¹ t¹ ra c¹ h¹ u qu¹ L¹ i v_i i c¹s c b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ phi tuy¹J¹h nguy¹o n v¹ h_n h¹ p nguy¹o n. Tuy nh¹o n, c¹s c ph¹ ¹ng ph¹s p n²y th¹ ¹ng ch¹ cho ph¹ ¹ng s¹n ¹ng ¹h¹o t¹ i ¹ ¹ kh¹ s¹ t¹ t sau m_t t s¹ h¹ u h¹ b¹ c m¹ kh¹ ng ki¹ ¹h so¹st L¹c c L¹ ch¹nh x¹s c c_a ph¹ ¹ng s¹n t¹ m L¹c c.

Phần mềm Lingo giải bài toán quy hoạch toàn phương


Ví dụ: Gi¹i b¹i to¹sn t¹ i ¹ ¹ phi tuy¹J¹h d¹ng to¹n ph¹ ¹ng

$$z = 8x_1^2 + 6x_2^2 \rightarrow \text{Max},$$

v_i i c¹s c r¹ng bu, c:

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 48 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

phần mềm Lingo, chúng ta nhập vào bài toán trong Lingo như sau: Menu > New > <Untitled> và gõ vào các dòng lệnh sau (tương tự như khi gõ lệnh trong phần mềm Lingo, xem Hình 1.4, hình 1.4).



Hình 1.9. Kết quả bài toán quy hoạch toàn phương trong Lingo.

Tiếp theo, cần nhập dữ liệu vào phần mềm LINGO và gõ lệnh để chạy chương trình. Kết quả chạy cho ta bài giải với giá trị của biến quyết định là 180 và phương án tối ưu là: $x_1 = 15$, $x_2 = 0$. Các giá trị của biến đối ngẫu là $y_1 = 5/3$ và $y_2 = y_3 = y_4 = 0$.

Giải bài toán tối ưu phi tuyến bằng phần mềm RST2ANU

Phần mềm RST2ANU 1.0 là một phần mềm giải các bài toán tối ưu phi tuyến bằng phương pháp nhân tử Lagrange. Phần mềm này được viết bằng ngôn ngữ C++ và chạy trên hệ điều hành Windows. Phần mềm này có thể giải các bài toán tối ưu phi tuyến có ràng buộc bất đẳng thức và đẳng thức. Phần mềm này có thể giải các bài toán tối ưu phi tuyến có ràng buộc bất đẳng thức và đẳng thức. Phần mềm này có thể giải các bài toán tối ưu phi tuyến có ràng buộc bất đẳng thức và đẳng thức.

Thuật giải

Thuật giải của phần mềm RST2AN (hay RST2ANU), là của Lê Văn Thanh và Nguyễn Thị Thanh. Thuật giải này là thuật giải tìm kiếm ngẫu nhiên có hướng dẫn. Thuật giải RST2AN là thuật giải lặp, bao gồm hai pha: pha khởi tạo và pha tối ưu. Sau khi kết thúc thuật giải RST2AN là kết quả của quá trình tối ưu.

Trong pha toàn cực, m, t s' l' cng th' ch h' p l' l' n csc ph' cng sn kh' thi l' c l' c ph' st sinh ra m, t csc ng' x' nhi' o' n' v' l' c tr' trong m' ng' c' t' o' n' A. n' snh d' li' hai l' m' c' gi' s' tr' h' m' m' c' ti' u' l' n' nh' l' v' nh' nh' l' cng' ng' l' M' v' L.

Trong pha cục bộ, các ph- Φ ng s-n L- $\bar{c}$ x- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ nh- $\bar{c}$ thu L- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ gi- $\bar{c}$ tr- $\bar{c}$ t- $\bar{c}$ h- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ h- $\bar{c}$ m- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ ti- $\bar{c}$ u- $\bar{c}$. Trong pha n- $\bar{c}$ y- $\bar{c}$, thu- $\bar{c}$ đ- $\bar{c}$ gi- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ x- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ L- $\bar{c}$ nh- $\bar{c}$ X- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ L- $\bar{c}$ nh- $\bar{c}$ L- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ suy- $\bar{c}$ b- $\bar{c}$ đ- $\bar{c}$ hai- $\bar{c}$ d- $\bar{c}$ a- $\bar{c}$ tr- $\bar{c}$ o- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ ph- Φ ng s-n L- $\bar{c}$ v- $\bar{c}$ hai ph- Φ ng s-n kh- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ L- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ ch- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ ng- $\bar{c}$ x- $\bar{c}$ nh- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ trong m- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ ng- $\bar{c}$ A- $\bar{c}$. N- $\bar{c}$ J- $\bar{c}$ nh- $\bar{c}$ e- $\bar{c}$ X- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ ph- Φ ng s-n kh- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ thi- $\bar{c}$ t- $\bar{c}$ h- $\bar{c}$ v- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ f(X)- $\bar{c}$ Ò- $\bar{c}$ f(M)- $\bar{c}$, M- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ L- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ thay- $\bar{c}$ th- $\bar{c}$ J- $\bar{c}$ b- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ X- $\bar{c}$ trong m- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ ng- $\bar{c}$ A- $\bar{c}$; c- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ v- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ f(X)- $\bar{c}$ > f(M)- $\bar{c}$, M- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ L- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ thay- $\bar{c}$ th- $\bar{c}$ J- $\bar{c}$ b- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ X- $\bar{c}$ v- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ x- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ u- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ p- $\bar{c}$ = exp(-b(f(X)-f(M))/(f(X)-f(L))), trong L- $\bar{c}$ b- $\bar{c}$ > 0 l- $\bar{c}$ tham- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ L- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ a- $\bar{c}$ ch- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ th- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ h- $\bar{c}$ p- $\bar{c}$. N- $\bar{c}$ J- $\bar{c}$ X- $\bar{c}$ kh- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ ng- $\bar{c}$ ph- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ ph- Φ ng s-n kh- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ thi- $\bar{c}$, b- $\bar{c}$ qua X- $\bar{c}$ v- $\bar{c}$ ch- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ hai ph- Φ ng s-n kh- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ trong A- $\bar{c}$ m- $\bar{c}$, t- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ ch- $\bar{c}$ ng- $\bar{c}$ x- $\bar{c}$ nh- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ r- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ ng- $\bar{c}$ v- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ L- $\bar{c}$ ti- $\bar{c}$ p- $\bar{c}$ t- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ sinh- $\bar{c}$ ra ph- Φ ng s-n m- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$. Qu- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ tr- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ th- $\bar{c}$ J- $\bar{c}$ ti- $\bar{c}$ p- $\bar{c}$ đ- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ nh- $\bar{c}$ e- $\bar{c}$ v- $\bar{c}$ d- $\bar{c}$ y- $\bar{c}$ cho- $\bar{c}$ t- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ khi- $\bar{c}$ t- $\bar{c}$ p- $\bar{c}$ h- $\bar{c}$ p- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ ph- Φ ng s-n trong A- $\bar{c}$ s- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ xu- $\bar{c}$ h- $\bar{c}$ e- $\bar{c}$ ng- $\bar{c}$ co- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ m- $\bar{c}$ l- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ x- $\bar{c}$ u- $\bar{c}$ ng- $\bar{c}$ quanh m- $\bar{c}$ t- $\bar{c}$ ph- Φ ng s-n t- $\bar{c}$ i- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$ t- $\bar{c}$ o- $\bar{c}$ t- $\bar{c}$ o- $\bar{c}$ n- $\bar{c}$ c- $\bar{c}$.

Ví dụ: Giĩ b̄i toŋn t' i ~~Ch~~ phi tuyŋh, n h̄ p nguy°n.

$$z = x_1^{0,6} + x_2^{0,6} + x_3^{0,4} + 2x_4 + 5x_5 - 4x_3 \ddot{x}_6' \rightarrow \text{Min}$$

v_s is a constant but, c:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_2 - 3x_1 - 3x_4 = 0; \\ x_3 - 2x_2 - 2x_5 = 0; \\ 4x_4 + x_6 = 0; \\ x_1 + 2x_4 \leq 4; \\ x_2 + x_5 \leq 4; \\ x_3 + x_6 \leq 6; \\ x_1 \leq 3; \ x_2 \leq 4; \ x_3 \leq 4; \\ x_4 \leq 1; \ x_5 \leq 2; \ x_6 \leq 6; \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0; \end{array} \right.$$


Hướng dẫn sử dụng

Chợng tr³nh L'êc g·i g̃n trong m̃ t file chũy duy nhữ mang t'ⁿ rst2anu1.0.exe. Khi bđ Lfũ kh' i L'ng ch-ợng tr³nh, ng-êi d'ⁿg sê L'êc h' i m« L'ng k² s' đ, ng ch-ợng tr³nh. M̃ i ng-êi d'ⁿg sê L'êc chũp m̃ t m« L'ng k² v' phl c· m« L'ng k² m̃ i s' đ, ng L'êc ch-ợng tr³nh, do L' ch-ợng tr³nh kh¹ ng th Wb' sao ch®.

Sau khi nhđp m« LŁng k², ng^Đ i d^hng c· thWnhđp b[·]i toĐn m, t cĐch d_đ d^hng (xem h³nh I.10) v_i i:

– NX l' s' biJh c_q a b"i toξn.

– XINT x§c L' nh biJh nguy°n v' biJh kh¹ ng nguy°n. Nh©trong h³nh tr°n, XINT = 0,0,0,1,1,1 cho biJh ba biJh L'Fu l' biJh li°n t' c, ba biJh sau l' biJh nguy°n.



Hình 1.10. Màn hình giao diện sau khi nhập xong dữ liệu

- FX l' x@ x\$ L'nh h'm r'ng bu,c, L'c nhđ theo c/4 ph\$ c a EvaluateExpression. C\$ biJh L'c viJ b\$ng k'hi' u'ñXò c' k'm theo ch' s' . V'đ, X1 l' biJh th' nhđ, X5 l' biJh th' 5.

–NJub'i tosn t' i Ch' b'i tosn t' m c, c ti With³ l, a ch' n¹ MIN v' ng² c l i ch' n¹
MAX v, i b'i tosn t' m c, c L⁴.

– Feas $x @ \text{cho bi } J \text{ c\`s c h" m r" ng bu, } E \text{ c nh\`ap c\`s ch nhau b' i d\`m ch\`m ph\`y ho\`t}$
 xu" ng d, ng. C\`s c  $x @ \text{n" y c\`ng tu\`n theo c\`ph\`p c, a EvaluateExpression.}$

– Rules 1" c\$ç x@i ch" ra c\$ç luđt. L@y, m, t luđt c" thWcoi nh -@l" m, t l' nh g\$ñ gi\$ tr' ç, a m, t biJh b' i gi\$ tr' ç, a m, t biW th" c c\$ç biJh kh\$ç.

– MINX l' mŋg xšc L'nh cđn d-ŋ i cho cšc biJh, cšc giš tr' viJh cšch nhau b' i dđm phxy ().

– MAXX I" mIhg xšc L'nh cđn tr°n cho cšc biIj, cšc giš tr' viIj cšch nhau b' i dđi phIy (,).

– NA l' k2ch thē c c, a mġng A (c thWhē n tu8Ī, t' i thiW l' 2(n + 1) v, i n l' s' biJh c, a b'i tošn).

– MAX RANDOM l' s l'fn c' gđng t' i La L'Wt'm m, t ph-ŋng šn ch'p' nhđn L'c' b'ng ph-ŋng ph'p ng X' nhi'°n.

– ITERLAST, ISLAST, IFLAST l' c̣c̣c̣ gi i ḥḥn vQs' v, ng lHb, s' ḷf̣n tḥḅḅḅ trong vi' c c̣ḷ thi' n gịṣ tr' ḥṃ ṃi c ti' u, s' ḷf̣n tḥḅḅḅ trong vi' c n, i suy pḥng ṣn ṃ i cḥp nḥn Ḷc̣ c.

- Epsilon1, epsilon2 l' c̣̣̣̣ s' ḍ̣̣̣ g L̄ nh nḥm x̣̣̣̣ L' nh ti°u chuXn co c̣̣ m c̣̣ a ṃ̣̣̣ A theo thuđ gị̣.

– Beta l' h³ng s' s' d⁴ng trong c¹ng th²c t²nh x⁵c xu⁶đi thay th⁷đm, t⁸ph⁹ng s¹⁰n t' t

hình trong màn hình A b' i m, t ph-~~Ch~~ng s' n t' i h' n.

– Prob file v' Res file l' c' s' c t' p l' f' u v' o v' t' p k' l' q' u' l'. C' th' W' s' o' c' h' s' l' h' t' p b' i' t' o' s' n l' f' u v' o' r' i' n' t' i' p b' i' t' o' s' n. C' i' n' g c' th' W' l' a' m, t b' i' t' o' s' n l' « nh' d' p' r' a' t' p.

Chạy chương trình

Sau khi nh' d' p b' i' t' o' s' n hay n' t' i' p b' i' t' o' s' n t' t' p, c' th' W' c' h' c' y' ch' -~~Ch~~ng tr' n' h b' i' n' g c' s' c' h k' 2' c' h' c' h' u, t v' o' n' 1/4 RUN. Trong khi ch' c' y' ch' -~~Ch~~ng tr' n' h, 1 tr' c' i' n' g th' s' i' ' p' h' 2' a tr' o' n n' 1/4 RUN s' e' x' u' h' i' n' d' , n' g' c' h' SEARCHING. Khi thu' d' t' g' i' l' i' ch' c' y' x' o' n' g th' 3 1 tr' c' i' n' g th' s' i' s' e' t' r' v' Q' R' E' A' D' Y cho b' i' l' i' l' « s' l' h' s' o' n' g cho c' s' c' b' i' t' o' s' n t' i' l' p' theo. M' i' t' h' i' n' g t' i' n v' Q' p' h' f' h' m' Q' n v' c' s' c' h s' i' d' , n' g' s' e' l' e' c' b' i' l' i' n' j' u' k' 2' c' h' c' h' u, t v' o' n' 1/4 ABOUT.

Sau khi ch' c' y' x' o' n' g ch' -~~Ch~~ng tr' n' h, k' l' q' u' l' ch' c' y' s' e' l' e' c' x' e' m t' r' c' t' i' l' p' khi k' 2' c' h' c' h' u, t v' o' n' 1/4 RESULTS v' c' th' W' l' a' r' a' file v' i' n' b' i' n' , b' a' o' g' o' m ph-~~Ch~~ng s' n t' i' i' a, g' i' s' t' r' i' h' m' m' c' t' i' o' u, m' l' n' g' A, e' c' c' b' i' l' i' t' r' i' c' n' h' t' r' o' n' h' 3' n' h I.11.

```
*****RESULTS*****
fx=(X1**0.6)+(X2**0.6)+(X3**0.4)+2*X4+5*X5-4*X3-X6
ITER = 158/1000; ISMAX = 76/200; IFMAX = 1001/1000
X*      = 0.666667 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
f(X*)   = -11.959130

=====ARRAY A=====
0.666667 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -11.959130
0.666667 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -11.959130
0.666667 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -11.959130
0.666667 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -11.959130
0.666667 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -11.959130
0.666667 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -11.959130
0.666321 1.998962 3.997925 0.000000 0.000000 0.000000 -11.951906
0.663472 1.990417 3.980834 0.000000 0.000000 0.000000 -11.892427
0.662414 1.987243 3.974467 0.000000 0.000000 0.000000 -11.870339
0.659851 1.979553 3.959105 0.000000 0.000000 0.000000 -11.816829
0.640848 1.922544 3.845088 0.000000 0.000000 0.000000 -11.420634
0.640116 1.920347 3.840693 0.000000 0.000000 0.000000 -11.405380
```

Hình I.11. Cấu trúc file kết quả

Nh' e' v' d' y, b' i' t' o' s' n l' « l' e' c' g' i' l' i' x' o' n' g, v' i' k' l' q' u' l': $x_1 = 2/3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$, $x_4 = 0$, $x_5 = 0$, $x_6 = 0$, v' g' i' s' t' r' i' i' a' h' m' m' c' t' i' o' u l' -11,95913.

Bài toán tối ưu thông số sàng phân loại

Ch' i' n' g' t' a' c' th' W' s' i' d' , n' g' p' h' f' h' m' Q' n RST2ANU l' W' t' m' n' g' h' i' m' c' a' h' ph-~~Ch~~ng tr' n' h p' h' i' t' u' y' l' i' s' a' u p' h' s' t' s' i' n' h t' r' o' n' g v' i' c' t' i' n' h t' o' s' n m' t' s' t' h' i' n' g s' i' h' n' h' h' i' c' v' l' i' n' g' h' i' c' c' a' c' h' c' b' i' l' i' s' o' n' g p' h' o' n' l' o' i' d' a' o l' i' n' g (c' f' n' c' h' i' l' i' r' i' n' g n' h' i' Q' i' p' h' -~~Ch~~ng p' h' s' p' t' i' n' h t' o' s' n t' h' i' n' g d' , n' g' k' h' s' c' c' a' g' i' l' i' t' i' c' h' s' i' l' « t' r' a' k' h' i' n' g' h' i' u' q' u' l' i'):

$$\begin{cases} r \cos \varphi_1 + l \cos \varphi_2 + l''_3 \cos \varphi_3 + l_4 \cos \varphi_4 - x_{CI} = 0; \\ r \sin \varphi_1 + l \sin \varphi_2 + l''_3 \sin \varphi_3 + l_4 \sin \varphi_4 - y_{CI} = 0; \\ r \cos \varphi_1 + l \cos \varphi_2 + l'_3 \cos (\varphi_3 - \alpha) + l_5 \cos \varphi_5 - x_{DI} = 0; \end{cases}$$

$$r \sin \varphi_1 + l \sin \varphi_2 + l_3 \sin(\varphi_3 - \alpha) + l_5 \sin \varphi_5 - y_{D1} = 0;$$

Trong h' phi tuy' h tr' o'n c' s' th' ng s' L'« bi' J' l'': $r = 0,05\text{m}$; $l = 0,30\text{m}$; $l_3^{\text{m}} = 0,15\text{m}$; $l_3^{\text{b}} = 1,075\text{m}$; $l_3 = 1,025\text{m}$; $l_4 = 0,50\text{m}$; $l_5 = 0,40\text{m}$; $x_{C1} = 0,365\text{m}$; $y_{C1} = 0,635\text{m}$; $x_{D1} = 1,365\text{m}$; $y_{D1} = 0,635\text{m}$; $\alpha = \pi/8$.

n' W' s' d' ng ph' h' m' Q'n RST2ANU gi' l' h' ph' h' ng tr' nh phi tuy' h cho $\varphi_1 = k\pi/8$ ($k = 0, \text{é}, 9$), tr' c' h' h' ch' ng ta c' f' h' thi' J' l' d' p' h' m' m' c' ti' u' au:

$$z = (r \cos \varphi_1 + l \cos \varphi_2 + l_3^{\text{m}} \cos \varphi_3 + l_4 \cos \varphi_4 - x_{C1})^2 + (r \sin \varphi_1 + l \sin \varphi_2 + l_3^{\text{m}} \sin \varphi_3 + l_4 \sin \varphi_4 - y_{C1})^2 + (r \cos \varphi_1 + l \cos \varphi_2 + l_3^{\text{b}} \cos(\varphi_3 - \alpha) + l_5 \cos \varphi_5 - x_{D1})^2 + (r \sin \varphi_1 + l \sin \varphi_2 + l_3^{\text{b}} \sin(\varphi_3 - \alpha) + l_5 \sin \varphi_5 - y_{D1})^2 \rightarrow \text{Min}.$$

K' J' qu' l' L' c' cho trong b' ng I.3 v' i $z_{\min} = 0$.

Bảng I.3. Kết quả tính toán giá trị các thông số của sàng phân loại

$\varphi_1 \in [0, 2\pi]$	$\varphi_2 \in [0, \pi]$	$\varphi_3 \in [0, \pi]$	$\varphi_4 \in [0, \pi]$	$\varphi_5 \in [0, \pi]$
0	0,226128	0,551311	1,783873	1,666775
$\pi/18$	0,199269	0,550518	1,784628	1,670250
$2\pi/18$	0,170835	0,550590	1,782751	1,668853
$3\pi/18$	0,143343	0,550490	1,778826	1,663697
$4\pi/18$	0,112669	0,552073	1,770032	1,652171
$5\pi/18$	0,090986	0,551991	1,759350	1,639575
$6\pi/18$	0,066036	0,553576	1,745374	1,622823
$7\pi/18$	0,051284	0,554296	1,730174	1,602970
$8\pi/18$	0,039053	0,555262	1,713242	1,581813
$9\pi/18$	0,033773	0,556277	1,695605	1,560720

4.3. Một số phương pháp giải bài toán tối ưu phi tuyến đa mục tiêu

Phương pháp tương tác người-máy tính

Ph' h' ng ph' h' p' PRELIME (*PREference Level Interactive Method*) hay c, n' g' i' l' ph' h' ng ph' h' p' t' h' ng t' s' c' đ' a tr' o'n m' c' c' ti' o'n do C. Mohan v' Nguy' n H' i' Thanh L' Q' xu' h' i' C, n' ph' h' ng ph' h' p' tr' ng s' quy chu' x' i' l' do Andrejz Osyczka L' Q' xu' h' i' C' s' c' ph' h' ng ph' h' p' n' y' L' Q' thu' c' l' p' ph' h' ng ph' h' p' t' h' ng t' s' c' ng' c' i- m' s' y' t' nh gi' l' b' i' t' o' s' n' t' i' c' i' La m' c' ti' u' v' i' c' s' c' y' J' u' t' c' b' i' th' nh sau:

- Ch' c' b' i' c' ti' o'n c, a ng' c' i' ra quy' J' L' nh v' h' m' t' h' p' t' h' ng ng.

- K' i' W' t' h' ng t' s' c' ng' c' i- m' s' y' t' nh: c' s' c' th' ng tin' n' o' m' s' y' t' nh ph' i' L' c' a ra trong c' s' c' b' c' l' h' p' trung gian, v' c' s' h' thay' l' i' c' s' c' th' ng s' c' a c' h' c' b' i' c' ti' o'n t' ph' a ng' c' i' ra quy' J' L' nh.

- K' o' thu' đ' t' i' c' i' t' o' s' n' h' c' L' c' x' o' y' đ' ng đ' a tr' o'n l' t' h' u' y' J' t' i' c' i' ho' s' nh' m' t' m' ra


yêu cầu cần đạt thứ hai, trong các bậc học trung gian, người ra quy định nên thay

L' i l' f' h' l'   t' c'   c'   h' p' t' r'   n' g' s' (   ,    ) v' i' c'   c' g' i' s' t' r' i' (0,2; 0,8), (0,8; 0,2), (0,6; 0,4) v' (0,4; 0,6). C'   h' p' t' r'   n' g' s' c' u' i' c'   n' g' c' h' o' p' h'   n' g' s' n' t' i'   P' a' r' e' t' o' t' h' o'   m'   n' n' h'   l'   x   = 237,1 v' x   = 68,2, v' i' f  (X) = 3,529   10  ; f  (X) = 0,437   10  .

C , n' y' j' u' t' c'   h' t' h'   n' h' t' h'   b' a, t'   c' g' i'   A' n' d' r' e' z' j' O' s' y' c' z' k' a' L'   s'   d'   n' g' t' h' u' d' t' t' o' s' n' t' i'     d'   t'   m' n' g'   n' h' i'   n'.

Phương pháp tương tác dựa trên mức ưu tiên PRELIME


Tr'   c' h' j'   y' j' u' t' c'   h' t' h'   n' h' t' h'   n' h'   h' a' i' m'   c' t' i'   u' f  (X) v' f  (X) L'   c' c' h' u' y' v' i' t' h'   n' h' h' a' i' h'   m' (l' i'   n) t' h' u' c' m'   p' h'   n' s' n' h' L'   t' h' o'   m'   n' c , a' n' g'   i' r' a' q' u' y' j' L'   n' h' s'   c'   v' i' t'   n' g' m'   c' t' i'   u' . C'   c' h'   m' t' h' u' c' m'   n'   y' l'   c'   c' h'   m' t' u' y' j' h' t'   n' h' t'   n' g' k' h'   c' , L'   c' v' i' j' d'   i' d'   n' g' g' i'   n' l'   c' n' h'   s' a' u' c' h' o' m'   t' s'   L' i' v' i' n' h' n'   s' u' y' :



n' t' h'   c , a' c'   c' h'   m' t' h' u' c' m'   c' h' o'   c'   c' h'   n' h' v'   t' r'   n' . P' h'   n' t'   c' h' h'   m' t' h' u' c' m'      , t' a' t' h'   i' : n' g'   i' r' a' q' u' y' j' L'   n' h' s'   c'   L'   t' h' o'   m'   n' 0' L' i' v' i' m'   i' p' h'   n' g' s' n' l'   m' c' h' o' f     6,594   10  ; L'   t' h' o'   m'   n' 1' n/  f     2,944   10  ; v'   L'   t' h' o'   m'   n' 0,5' n/  f   = 4   10  .   , t' h' o'   m'   n' 0,5' L'   c' c' o' i' l'   L'   t' h' o'   m'   n' t' i' i' t' h' i' v' i' m'   c' f   = 4   10   = b   L'   c' g'   i' l'   m'   c'   t' i'   n' t'   n' g'   n' g' L' i' v' i' m'   c' t' i'   u' f  . T'   n' g' t'   c' h'   n' g' t' a' c'   t' h' v' p' h'   n' t'   c' h' v' Q' h'   m' t' h' u' c' m'   v'   m'   c'   t' i'   n' b  . S' a' u' L'  , h'   m' t' h' o'   d'   n' g' t'   h'   p' d'   n' g' M' a' x - M' i' n' L'   c' t' h' i' j' l'   p' c' h' o' h' a' i' h'   m' m'   c' t' i'   u' r' i'   n' g' r'   t' r'   n' d'   i' d'   n' g' : M' a' x{M' i' n[   ,    ]} n' h'   n' t'   m' r' a' p' h'   n' g' s' n' t' h' o'   d'   n' g' (x  , x  ) t' r' o' n' g' m' i' Q' r'   n' g' b' u' c'  , a' b'   i' t' o' s' n'.

n' i' v' i' y' j' u' t' c'   h' t' h'   n' h' t' h'   h' a' i, n' g'   i' r' a' q' u' y' j' L'   n' h' s'   c'   n' c  v'   o' t' h'   n' g' t' i' n' d' o' m'   s' y' t'   n' h' L'   a' r' a' L' W' i' Q' c' h'   n' h' c'   c' m'   c'   t' i'   n' b   v' b  . T' h' a' y' L'   i' c'   c' c'   p' m'   c'   t' i'   n' (b  , b  ) t' (4   10  ; 0,45   10  ) s' a' n' g' (3,6   10  ; 0,435   10  ), s'   n' h'   n' L'   c' p' h'   n' g' s' n' s' a' u' (x  , x  ) = (235,67; 67,67) v' i' (f  , f  ) = (3,58   10  ; 0,433   10  ).

Trong yJt t' cB th "nh th_ ba, csc tsc giT L« dng thu đt tosn t3m kiJn ngXu nhi °n c·
LiQ khiW RST2ANU kJ h p v, i thu đt tosn m1 ph ng t1 i (SA) LW3m ra csc phCng sn
t' i C Pareto cho csc b"i tosn trung gian th1 ng qua v' c giT b"i tosn t' i C phi tuyJh Lhn
m, c ti°u dng $\text{Max}\{\text{Min}[\mu_1, \mu_2]\}$.



Chương II

CÁC MÔ HÌNH MẠNG

1. Mô hình mạng vận tải

1.1. Phát biểu bài toán vận tải

Bài toán vận tải là bài toán tìm kiếm cách phân phối hàng hóa từ các địa điểm cung cấp (nhà máy, kho) đến các địa điểm tiêu thụ (nhà máy, kho) sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất. Bài toán vận tải thường được mô hình hóa bằng một bảng vận tải. Trong bảng vận tải, các hàng và cột đại diện cho các địa điểm cung cấp và tiêu thụ. Các ô trong bảng đại diện cho chi phí vận chuyển từ địa điểm cung cấp đến địa điểm tiêu thụ. Bài toán vận tải thường được giải bằng các phương pháp tối ưu hóa, chẳng hạn như phương pháp đơn hình.

Ví dụ: Ta có 3 nhà máy cung cấp hàng A, B, C và 4 nhà máy tiêu thụ hàng S, T, U, V. Chi phí vận chuyển từ nhà máy cung cấp đến nhà máy tiêu thụ được cho trong bảng II.1.

Bảng II.1. Các dữ liệu của bài toán vận tải

Nhà máy cung	Chi phí hàng
A	5000
B	6000
C	2500
Tổng	13500

Nhà máy tiêu	Chi phí hàng
S	6000
T	4000
U	2000
V	1500
Tổng	13500

Nhà máy	Chi phí vận chuyển / Đơn vị hàng (USD) / Ngày			
	S	T	U	V
A	3	2	7	6
B	7	5	2	3
C	2	5	4	5

Tổng nhà máy i ngày nhà máy tiêu j ta có chi phí vận chuyển / đơn vị hàng là c_{ij} (USD / Ngày). Chi phí vận chuyển từ nhà máy i đến nhà máy tiêu j là x_{ij} (Đơn vị hàng / Ngày). Bài toán vận tải có thể được mô hình hóa bằng một bài toán tối ưu hóa tuyến tính. Bài toán vận tải thường được giải bằng các phương pháp tối ưu hóa, chẳng hạn như phương pháp đơn hình.

1.2. Tạo phương án vận tải xuất phát

Khái niệm bảng vận tải

Bình vắn tí c. m h'ng, n c t g^{oo} m m $\times$ n¹, m l' s' LiWh cung, n l' s' LiWh cFu v. i c $\ominus$ c ph² c_{ij} L ^{$\ominus$} c ghi trong ¹ (i, j) cho cung L ^{$\ominus$} ng (i, j). Khi m = 3, n = 4 nh $\ominus$ trong v² d_n trⁿ, ta c. bình vắn tí II.2.

Bảng II.2. Bảng vận tải

3	2	7	6	Cung 1: 5000
7	5	2	3	Cung 2: 6000
2	5	4	5	Cung 3: 2500
CFu1: 6000	CFu 2: 4000	CFu 3: 2000	CFu 4: 1500	T ^r ng: 13500

Ta c₁fn t₃m ph₁chng sn ph₁h₁ng v₁o c₁sc¹ (i, j) sao cho t₁ng theo h₁ng hay c₁t L₁Q₁ kh₁ p₁v₁i c₁sc₁l₁ēng cung, c₁fu v₁ t₁ng chi ph₁2v₁đn t₁l₁l₁ nh₁ nh₁h₁l₁M₁i¹ (i, j) bi₁W₁đi n₁m₁t₁ cung L₁ēng v₁đn chuy₁W₁h₁ng t₁ Li₁W₁h₁cung i v₁Q₁Li₁W₁h₁c₁fu j.

Các phương pháp tạo phương án xuất phát

C. m, t s' ph-Chng phsp t' b ph-Chng sn xu b' ph st. Ta nghi n c_ u hai ph-Chng phsp sau

a. Phương pháp "góc tây bắc"

Phong phap nay Le c phat biW nh Esau:

- Phon phst h'ng t' i La v' o g' c t' y b' d' c' a b' l' ng v' d' n t' i.

- Sau khi (h'ng) cung hoHb (c t) c'f'u L' tho' m' n th³ ta thu g' n b'ng v' n t' l' b' ng c' s' ch b' b' t h' ng cung hoHb c t c'f'u L' Li (ch' b' m' t trong hai th' hoHb h' ng hoHb c t, 'L' c' l' to' n t' hoHb lo' t' tr' , *OR exclusive*).

- Ti²⁺ p₁ t₁ c₁ h₁ p₁ i₁ hai b₁ e₁ c₁ tr⁰n l⁰o⁰y cho t₁ i khi h⁰ng l⁰e⁰ c₁ ph⁰ ph⁰ i h⁰ v⁰o c₁ s₁ c₁ (c₁ s₁ c₁ l⁰e⁰ c₁ ph⁰ h⁰ng l⁰e⁰ c₁ g⁰ i l⁰ s⁰ d⁰ ng).

Bảng phân phối ngẫu nhiên của biến ngẫu nhiên X trong bảng II.3 và i sô 1 s d ng (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 3) và (3, 4).

Bảng II.3. Phương án xuất phát với phương pháp “góc tây bắc”

3		2		7		6	
	5000						
7		5		2		3	
	1000		4000		1000		
2		5		4		5	
					1000		1500

T'ng chi ph² vdn t'fi:

$$\text{SCPVT} = (3 \times 5 + 7 \times 1 + 5 \times 4 + 2 \times 1 + 4 \times 1 + 5 \times 1,5) \times 1000 = 55500.$$

b. Phương pháp cước phí tối thiểu

Phương pháp này là để phân bổ chi phí vận chuyển, phương pháp "góc tây bắc" nhằm tìm phân phối hàng vào các ô có cước phí nhỏ nhất (nếu có thì ưu tiên hàng đầu tiên nhất trong số đó). Lần này ta có phương pháp xuất phát từ phương pháp B cho trong bảng II.4.

Bảng II.4. Phương án xuất phát với phương pháp cước phí tối thiểu

3		2		7		6
	1000		4000			
7		5		2		3
	2500			2000		1500
2		5		4		5
	2500					

Tổng chi phí vận tải:

$$\text{SCPVT} = (3 \times 1 + 2 \times 4 + 7 \times 2,5 + 2 \times 2 + 3 \times 1,5 + 2 \times 2,5) \times 1000 = 42000$$

Nhận xét

– Phương pháp có các bước tối thiểu nhằm cho phương pháp xuất phát tốt hơn phương pháp góc tây bắc.

– Bảng vận tải có số lượng hàng là $3 + 4 - 1 = 7$ và $1 = 6$. Một cách tổng quát bảng vận tải hàng, n có các số lượng hàng là m và n là 1.

– Bài toán vận tải cần là BTQH. Trong vận tải, hàng x, n, k, h, u, x_{ij} là hàng vận chuyển từ nguồn cung cấp (i, j) thì chúng ta BTQH sau:

$$Z = C_{11}x_{11} + C_{12}x_{12} + \dots + C_{34}x_{34} \rightarrow \text{Min}$$

Với các ràng buộc:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 5000 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 6000 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 2500 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 6000 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 4000 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 2000 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 1500 \\ x_{ij} \geq 0 \quad \forall i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

Hệ các ràng buộc có 12 biến và 7 phương trình. Nếu lấy tổng 3 phương trình lại thì tổng 3 phương trình tương đương theo tổng các phương trình cuối. Có thể bỏ biến nghỉ mà không sợ phương trình bị lặp tùy thuộc vào hệ là 7 và 1 = 6.

– ư ớnh đầi c ng tr xen kE tầi cởc L'nh tr'n L'ề ng Li m' trong L' 1 ch' s' d, ng L'ề c L'ớnh đầi ã+đ. Gi' s' ta c'Fn lu@ chuy' m, t L'hn v' h'ng theo L'ề ng Li L' xởc L'nh m' v' thol' m' L'ề c cung c'Fu (t c l' cởc 1 mang đầi ã+đ: 1 (1, 2) v' 1 (2, 1) c' th' m m, t L'hn v' h'ng, cởc 1 mang đầi ã-đ: 1 (2, 2) v' 1 (1, 1) r' b, t Li m, t L'hn v' h'ng). L' c' n' y t' ng chi ph' s' thay L' i m, t L'ề ng ti' l': $e_{12} = +c_{12} i - c_{22} + c_{21} - c_{11} = 2 - 5 + 7 - 3 = +1$. N' i c'ởch kh'ởc, t' ng chi ph' v' đầi t' l' s' t' ng th' m l' n 1USD cho m i m t L'hn v' h'ng lu@

chuyển theo Lềng Li tron. Ta g^o i e₁₂ l^o hiệu suất c_a a¹ (1, 2).

T^ong t^o :

$$e_{13} = 7 - 2 + 7 - 3 = +9,$$

$$e_{14} = 6 - 5 + 4 - 2 + 7 - 3 = +7,$$

$$e_{24} = 3 - 5 + 4 - 2 = 0,$$

$$e_{31} = 2 - 7 + 2 - 4 = -7,$$

$$e_{32} = 5 - 5 + 2 - 4 = -2.$$

Ch^o c^o hai¹ v_i i h^o u su^o l^o l^o (3, 1) v^o (3, 2) (xem b^o l^ong II.5) c^o th^o W^o a ch^o n L^oW L^o v^o o s^o d^ong trong ph^ong s^on m^o i. Ta quy^o l^onh trong ph^ong s^on m^o i s^o ch^o n^o (3, 2) L^oW L^o v^o o s^o d^ong, m^o i L^onh v^o h^ong L^o v^o o s^o d^ong t^o (3, 2) s^o l^o m^o t^o ng chi ph^o gi^o l^om 2USD. K^o h^o u e = e₃₂.

Chú ý: C^o th^o W^o ch^o ng minh L^o c e_{ij} = Δ_{ij} v_i i Δ_{ij} l^o gi^o tr^o t^oron h^ong Δ_o ng v_i i c^o t x_{ij} n^o l^o gi^o b^o i to s^on v^och t^o b^ong ph^ong ph^o s^op L^onh h^onh.

Xác định lượng hàng đưa vào ô chọn

Nh^o t^oron L^o ph^o t^och, m^o t L^onh v^o h^ong L^o v^o o s^o d^ong l^o m^o gi^o l^om t^o ng chi ph^o v^och t^o 2 USD. Ta c^o f^oh t^om q, l^ong h^ong t^o i L^o c^o th^o W^o L^o v^o o s^o d^ong (3, 2). n^o L^ong Li qua^o (3, 2) v^o m^o t s^o L^o L^o c s^o d^ong l^o: (3, 2) → (2, 2) → (2, 3) → (3, 3) → (3, 2), v_i i c^o s^o L^o c L^onh d^o c^o ng tr^o xen k^o l^o (3, 2) mang d^o (+). L^ong h^ong q L^o c t^onh theo quy t^oac:

q = gi^o tr^o nh^o nh^o l^o c, a c^o s^o l^ong h^ong t^o c^o s^o mang d^o (-) = Min {l^ong h^ong t^o (2, 2), l^ong h^ong t^o (3, 3)} = Min {4000, 1000} = 1000.

V^oy trong ph^ong s^on m^o i, l^ong h^ong t^o c^o s^o mang d^o ñ^o (c^o s^o (3, 2), (2, 3)) L^o c t^ong th^om 1000 L^onh v^o, c^o n t^o c^o s^o mang d^o ñ^o (c^o s^o (2, 2) v^o (3, 3)) l^ong h^ong gi^o l^om Li 1000 L^onh v^o (xem b^o l^ong II.6). Ph^ong s^on m^o i g^o m 6^o s^o d^ong l^o (3, 3) ng v_i i q = 1000 L^o b^o l^o ra).

Bảng II.6. Phương án vận tải sau hai bước

3	2	7	6	5000
5000				
7	5	2	3	6000
1000	3000	2000		
2	5	4	5	2500
(-5)	1000		1500	
6000	4000	2000	1500	

T^o ng chi ph^o v^och t^o:

$$\Sigma CPVT = (3 \times 5 + 7 \times 1 + 5 \times 3 + 2 \times 2 + 5 \times 1 + 5 \times 1,5) \times 1000 = 53500;$$

ho^oh

$$\Sigma CPVT_{m_i} = \Sigma CPVT_{c_i} - e \times q = 55500 - 2 \times 1000 = 53500.$$

Điều kiện tối ưu

Thì, c hi' n theo quy tr ³nh tr³n cho t, i khi t³c c³c hi' u su³t e_{ij} ≥ 0 ∀¹ (i, j) l' c³c¹ ch³a s' d, ng. ³ c³y ch³nh l' LiQ ki' n t³ i c³ hay LiQ ki' n d, ng. ³ iQ ki' n n'y th, c ch³ l' LiQ ki' n Δ_{ij} ≥ 0 v, i m³ i bi³n ngo³i ch³ s' x_{ij} n³u gi³ b³i to³n b³ng ph³ng ph³p L³n h³nh.

ư Wgĩĩ tĩĩ b ư i toĩn, c Fh t²nh cĩc hi' u suĩĩ cho cĩc ¹ ch ¹ s ¹ d, ng trong ph ¹ng sñ
 m i:

$$e_{12} = 2 - 5 + 7 - 3 = +1; \quad e_{13} = 7 - 2 + 7 - 3 = +19;$$

$$e_{14} = 6 - 5 + 5 - 5 + 7 - 3 = +5; \quad e_{24} = 3 - 5 + 5 - 5 = -2;$$

$$e_{31} = 2 - 7 + 5 - 5 = -5; \quad e_{33} = 4 - 5 + 5 - 2 = +2.$$

Ta quy L nh s d ng 1 ch n (3, 1) trong ph Φ ng sn m i $v^3 e_{31} = -5$. T³m L²c q = 1000 theo quy t de L²c bi Li. C hai 1 ng v i q t 3 m L²c, ch ng ta ch b Li 1 (2, 1) c n ph i gi L⁴ 1 (3, 2) L²c v o s d ng. Ph Φ ng sn sau b e c th ba cho trong b i ng II.7.

Bảng II.7. Phương án vận tải sau ba bước

3	2	7	6
5000			
7	5	2	3 (-2)
	4000	2000	
2	5	4	5
1000	0		1500
6000	4000	2000	1500

T'ng chi ph² vdn t'fi:

$$\Sigma_{CPVT} = 53500 - 5 \times 1000 = 48500.$$

Tiŋp t̩ c t²nh cɕc hi¹ u suɓt̩.

$$e_{12} = +1; \quad e_{13} = 7 - 2 + 5 - 5 + 4 = 9;$$

$$e_{14} = 6 - 5 + 2 - 3 = 0; \quad e_{21} = 7 - 2 + 5 - 5;$$

$$e_{24} = 3 + 5 + 5 - 5 = -2; \quad e_{33} = 4 - 5 + 5 - 2 = 2.$$

Chⁿ 1 (2, 4) L^a v^o sⁱ d^u ng v^o t^h nh q = 1500. T^u L^u c^u ph^u ng s^u n mⁱ i sau bⁱ n b^e c nh^u trong bⁱ ng II.8.

Bảng II.8. Phương án vận tải sau bốn bước

3	2	7	6
5000	(-4)		
7	5	2	3
	2500	2000	1500

2	5	4	5
1000	1500		
6000	4000	2000	1500

Tổng chi phí vận tải:

$$\Sigma CPVT = 48500 - 2 \times 1500 = 45500.$$

Tính các giá trị e_{ij} như sau:

$$e_{12} = 2 - 5 + 2 - 3 = -4; \quad e_{13} = 7 - 2 + 5 - 5 + 2 - 3 = 4;$$

$$e_{14} = 6 - 3 + 5 - 5 + 2 - 3 = 2; \quad e_{21} = 7 - 2 + 5 - 5 = 5;$$

$$e_{33} = 4 - 5 + 5 - 2 = 2; \quad e_{34} = 5 - 5 + 5 - 2 = 3;$$

Ta có $e_{12} = -4$ chọn $(1, 2)$ làm cặp vận chuyển $q = 1500$ chuyển sang phương án mới trong bảng II.9.

Bảng II.9. Phương án vận tải sau năm bước

3	2	7	6	5000
3500	1500			
7	5	2	3	6000
	2500	2000	1500	
2	5	4	5	2500
2500				
6000	4000	2000	1500	

Tổng chi phí vận tải:

$$\Sigma CPVT = 45500 - 4 \times 1500 = 39500.$$

Lúc này $e_{ij} \geq 0$ và $i \neq j$ chọn (i, j) cho giá trị nhỏ nhất là $e_{12} = 4$ chọn phương án vận tải tiếp theo cho trong bảng II.9 và tổng chi phí nhỏ nhất là 39500.

Bài toán vận tải không cân bằng thu phát

Trong hình 1.3 ta thấy tổng cung lớn hơn tổng cầu, chênh lệch m tấn. Vì vậy ta cần thêm một điểm cầu giả định để tổng cung bằng tổng cầu.

Tổng t , nếu cung vượt cung thì t là chênh lệch giữa tổng cung và tổng cầu, coi mức chi phí vận chuyển từ L đến LQ bằng 0.

1.4. Phương pháp phân phối cải biên giải bài toán vận tải

Phương pháp này là một phương pháp phân phối cải biên để giải bài toán vận tải không cân bằng. Về nguyên tắc, ta sẽ nghiên cứu phương pháp phân phối cải biên như sau:

Xét phương án xuất phát từ L đến LQ bằng phương pháp các phép biến đổi cho trong

II.10 (vị trí ng chi ph đ n t l ~ 42000).

Bảng II.10. Phương án vận tải xuất phát

3 1000	2 4000	7	6	5000
7 2500	5	2 2000	3 1500	6000
2 2500	5	4	5	2500
6000	4000	2000	1500	

Ta có $e_{13} = 7 - 2 + 7 - 3 = +9$. Ta tìm cách tính e_{13} bằng cách khác nhanh hơn
bây giờ sau đó.

Trở c h J c f n x o y d n g h ' t h ' n g s ' t h J v ' h " n g v " c, t { (u_i, v_j), i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3}.
 C. t h W g s n c h o m, t t h J v ' b b l k³ g i s t r ' 0 (h o h m, t g i s t r ' b b l k³ k h s c), t h J v ' n g l c c h n ' h " n g h a y c, t c: n h i Q u¹ s ' d n g n h b l C h n g h c h n u₂ = 0.

C§c thJv kh§c LÊ c t²nh b' i c¹ ng th_ c: $u_i + v_{ij} = c_{ij} \forall^1 (i, j) s' d_ ng.$

$$u_2 = 0 \Rightarrow v_1 = 7 (= c_{21} - u_2)$$

$$v_3 = 2 \quad (= c_{23} - u_2)$$

$$v_4 = 3 (= c_{24} - u_2)$$

$$u_1 = -4 (= c_{11} - v_1)$$

$$u_3 = -5 (= c_{37} - v_1)$$

$$v_2 = 6 \quad (= c_{12} - u_1)$$

C1 ng th c t ng qu st L^W nh c sc hi u su h cho c sc¹ (i, j) ch a s d ng l:

$$\mathbf{e}_{ij} = \mathbf{c}_{ij} - (\mathbf{u}_i + \mathbf{v}_j).$$

Chứng minh ta có: $e_{13} = c_{13} - (u_1 + v_3) = 7 - (-4 + 2) = 9$. Các hệ quả suy ra từ (xem bảng II.11).

Bảng II.11. Tính toán các thế vị và các hiệu suất

	$v_1 = 7$	$v_2 = 6$	$v_3 = 2$	$v_4 = 3$	
$u_1 = -4$	3 1000	2 4000	7	6	5000
$u_2 = 0$	7 2500	5 (-1)	2 2000	3 1500	6000
$u_3 = -5$					2500

2	5	4	5
2500			
6000	4000	2000	1500

Trong bảng II.11 ta thấy $e_{22} = -1 < 0$. Chọn $^1(2, 2)$ LVL và số dòng v_i và $q = 2500$, ta chuyển sang phương án mới và tính lại các hệ thống số thứ tự như trong bảng II.12.

Bảng II.12. Tính toán các thế vị và các hiệu suất cho phương án mới

	$v_1 = 6$	$v_2 = 6$	$v_3 = 2$	$v_4 = 3$	
$u_1 = -3$	3	2	7	6	5000
	3500	1500			
$u_2 = 0$	7	5	2	3	6000
		2500	2000	1500	
$u_3 = -4$	2	5	4	5	2500
	2500				
	6000	4000	2000	1500	

Chọn $u_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 5 (= 6 - 0); v_3 = 2 (= 2 - 0); v_4 = 3 (= 3 - 0);$

$u_1 = -3 (= 2 - 5); v_1 = 6 (= 3 - (-3)); u_3 = -4 (= 2 - 6).$

Tổng chi phí vận tải:

$$\begin{aligned}\sum CPVT &= (3 \times 3,5 + 2 \times 1,5 + 5 \times 2,5 + 2 \times 2 + 3 \times 1,5 + 2 \times 2,5) \times 1000 \\ &= 39500 \quad (\text{tính các hệ số, } \sum CPVT_{m,i} = 42000 - 1 \times 2500).\end{aligned}$$

Tiếp tục tính toán các hệ số:

$$e_{13} = c_{13} - (u_1 + v_3) = 7 - (-3 + 2) = 8;$$

$$e_{14} = c_{14} - (u_1 + v_4) = 6 - (-3 + 3) = 6;$$

$$e_{21} = c_{21} - (u_2 + v_1) = 7 - (0 + 6) = 1;$$

$$e_{32} = c_{32} - (u_3 + v_2) = 5 - (-4 + 5) = 4;$$

$$e_{33} = c_{33} - (u_3 + v_3) = 4 - (-4 + 2) = 6;$$

$$e_{34} = c_{34} - (u_3 + v_4) = 5 - (-4 + 3) = 6.$$

Ta thấy $e_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ chọn số dòng nòng LVL và số dòng nòng LVL để thoát khỏi vòng lặp. Phương án tối ưu cho trong bảng II.12, và tổng chi phí vận tải nhỏ nhất là 39500.

Chú ý:


– Nếu v_i và b_i là tổng vận tải cần có của hàng i thì tổng chi phí vận tải sẽ là

$e_{ij} \leq 0 \quad \forall (i, j)$ chấp s' d' ng.

– n' i v' i b' i to' n v' n t' i c' c' i' n (cung l' e' ng kh' ng l' e' c' s' d' ng) th' l' h' c' c' p' h' M = +∞ cho c' s' c' i' n v' i b' i to' n Min ho' h' M = −∞ v' i b' i to' n Max.


Giải bài toán vận tải bằng phần mềm Lingo

n' Wgi' i b' i to' n v' n t' i trong Lingo, ta c' th' Ws' d' ng c' s' c' b' i to' n m' u' b' o' ng c' s' ch' nh' h' v' o' bi' m' t' e' ng Lingo v' th' c' h' i' n c' s' c' l' nh *File > Open > Tran.lng* l' W' v' o' b' i to' n v' n t' i m' u'. Sau l' nh' p' c' s' c' s' l' i' u' l' Fu' v' o' c' a' b' i to' n c' f' n gi' i, ch' ng h' i' n, c' a' v' d' l' « x@ trong c' s' c' m' c' tr' o' n thay cho c' s' c' s' l' i' u' c' a' b' i to' n m' u' (xem h' n' h' II.1).



Hình II.1. Nhập số liệu cho bài toán vận tải

Sau l' ch' ng ta th' c' h' i' n *LINGO>Solve*, k' qu' t' n' h' to' n s' e' h' i' n ra tr' o' n m' n' h' n' h' (xem h' n' h' II.2).



Rows= 8 Vars= 12 No. integer vars= 0 (all are linear)
 Nonzeros= 43 Constraint nonz= 24(24 are +- 1) Density=0.413
 Smallest and largest elements in absolute value= 1.00000 6000.00
 No. < : 3 No. =: 0 No. > : 4, Obj=MIN, GUBs <= 4
 Single cols= 0

Optimal solution found at step: 8
 Objective value: 39500.00

Variable	Value	Reduced Cost
VOLUME(WH1, C1)	3500.000	0.000000E+00
VOLUME(WH1, C2)	1500.000	0.000000E+00
VOLUME(WH1, C3)	0.000000E+00	8.000000
VOLUME(WH1, C4)	0.000000E+00	6.000000
VOLUME(WH2, C1)	0.000000E+00	1.000000
VOLUME(WH2, C2)	2500.000	0.000000E+00
VOLUME(WH2, C3)	2000.000	0.000000E+00
VOLUME(WH2, C4)	1500.000	0.000000E+00
VOLUME(WH3, C1)	2500.000	0.000000E+00
VOLUME(WH3, C2)	0.000000E+00	4.000000
VOLUME(WH3, C3)	0.000000E+00	6.000000
VOLUME(WH3, C4)	0.000000E+00	6.000000

Hình II.2. Kết quả của bài toán vận tải

2. Mô hình mạng PERT

(Program Evaluation and Review Technique)

2.1. Các khái niệm cơ bản về PERT

Vai trò của PERT

PERT có thể được sử dụng để phân tích và lập kế hoạch theo dõi và điều chỉnh tiến độ của dự án, giúp quản lý thời gian và chi phí của dự án.

– Dự án sẽ hoàn thành khi nào?

– Mục tiêu của dự án là gì? Dự án này có thể được thực hiện theo cách nào? Kế hoạch nào là tốt nhất?

– Nhận xét về dự án, dự án phải có kế hoạch thực hiện và phải có kế hoạch cho toàn bộ dự án, kế hoạch chi tiết hơn so với kế hoạch chung?

– Liệt kê các công việc cần thực hiện (nhân lực, vật lực) và các công việc khác nhau, phân công các công việc khác nhau (các công việc phải hoàn thành trước công việc tiếp theo) mà không thể thực hiện tiếp theo khi nào?

– Nhận xét về dự án, dự án có thể được thực hiện theo dõi?

– Việc lập kế hoạch dự án PERT, chúng ta cần vẽ đồ thị sau đây.

Ví dụ:


Giả sử cần thực hiện một dự án, dự án có thể được thực hiện theo các công việc khác nhau, các công việc khác nhau có thể thực hiện trong bảng II.13.

Bảng II.13. Các hoạt động của một dự án, thứ tự và thời gian thực hiện

Hoạt động	Hoạt động kế tiếp	Thời gian thực hiện (tuần)
A	—	2
B	—	2
C	—	2
D	A	3
E	A	4
F	E	0 (hoạt động giả)
G	B	7
H	B	6
I	D, F	4
J	C	10
K	H, J	3
L	G, I, K	4

Ta cần lập kế hoạch thời gian dự án từ trên xuống dưới, chọn thời gian bắt đầu của các hoạt động, và dự kiến trong thời gian ngắn nhất, để có thể phân tích được các hoạt động nào cần chú ý.

Vẽ sơ đồ mạng PERT



Hình II.3. Sơ đồ mạng PERT

Trong hình II.3 ta thấy rằng PERT là một mạng các nút có liên hệ với nhau bởi các cung có chiều hướng. Mỗi cung có chiều hướng biểu thị cho hoạt động, và các nút biểu thị cho các thời điểm bắt đầu và kết thúc của các hoạt động.

Hoạt động giả F là một nút có chiều hướng biểu thị cho thời gian thực hiện bằng 0, nhằm tránh cho hoạt động D và E có cùng nút bắt đầu và kết thúc. Như vậy, trong sơ đồ mạng PERT ta thấy rằng theo quy tắc: hai hoạt động khác nhau không thể có cùng nút bắt đầu và kết thúc.

Xác định thời gian tối thiểu thực hiện dự án

Để xác định thời gian tối thiểu thực hiện dự án, ta cần chú ý rằng ta cần phải biết thời gian bắt đầu sớm nhất và thời gian kết thúc sớm nhất (EST và EFT – Earliest start time và Earliest finish time) cho từng hoạt động.

Ví dụ: Hoạt động A có $EST_A = 0$ và $EFT_A = 2$, và


– Thời gian bắt đầu sớm nhất khi bắt đầu hoạt động dự án,

– Thời gian kết thúc sớm nhất sau 2 tuần.

Mối quan hệ giữa EST và EFT là:

$$EFT = EST + \text{thời gian thực hiện hoặc lắp ráp}$$

Một cách tiếp cận khác để xác định EST cho các hoạt động là quy tắc *thời điểm bắt đầu sớm nhất*: thời gian bắt đầu sớm nhất của một hoạt động rời một nút nào đó là thời gian muộn nhất trong các thời gian kết thúc sớm nhất của các hoạt động đi vào nút đó. Áp dụng quy tắc trên đây, các thời gian EST của EST_K = 12 (do EFT_H = 8, EFT_J = 12 và số lượng hình là 12) và EFT_K = 15. Kết quả tính EST và EFT cho các hoạt động đã nêu ở bảng tính toán tiến trình và hình 11.4 và 11.9 và ở bảng 11.14 và hình 11.4. Vậy thời gian kết thúc sớm nhất của dự án sau 19 tuần.



Hình 11.4. Tính EST và EFT cho các hoạt động của dự án
Bảng 11.14. Tính EST, LST, EFT, LFT và tìm đường găng

Hoạt động	EST	LST	EFT	LFT	LST-EST (LFT-EFT)	Trên cùng găng
A	0	5	2	7	5	
B	0	4	2	6	4	
C	0	0	2	2	0	*
D	2	8	5	11	6	
E	2	7	6	11	5	
F	6	11	6	11	5	
G	2	8	9	15	6	
H	2	6	8	12	4	
I	6	11	10	15	5	
J	2	2	12	12	0	*
K	12	12	15	15	0	*
L	15	15	19	19	0	*

Bộ các tiến trình theo sơ đồ xác định thời gian bắt đầu muộn nhất và thời gian kết thúc muộn nhất (LST và LFT – Latest start time và Latest finish time) cho từng hoạt động.

Ví dụ: Hoạt động L có LST_L = 15 và LFT_L = 19, và

– Thời gian kết thúc dự án sau 19 tuần (nếu ta bắt đầu dự án phải kết thúc sau 19 tuần),


– Thời gian bắt đầu dự án muộn nhất là 15 (do hoạt động L cần phải có ít nhất 4 tuần trước khi bắt đầu).

Mối quan hệ giữa LST và LFT là:

$$LST = LFT - \text{thời gian thực hiện hoạt động}.$$

Một cách tiếp cận khác, cách xác định LFT bằng ta có quy tắc *thời điểm kết thúc muộn nhất*: thời gian kết thúc dự án muộn nhất của một hoạt động đi vào một nút nào đó là thời gian muộn nhất trong các thời gian bắt đầu dự án muộn nhất của các hoạt động rời nút đó.

Cập nhật quy tắc trên lại, có thể nhận được LFT_A = 7 (do LST_D = 8, LST_E = 7 và số bắt đầu là 7) và LST_A = 5. Khi quy tắc LFT và LST cho các hoạt động đã sẵn sàng tính toán lùi từ nút 9 và nút 1 về LFT của nút trong bảng II.14 và hình II.5.



Hình II.5. Tính LFT và LST cho các hoạt động của dự án

Chú ý: Một cung có nhiều nút thì một hoạt động, nhưng có thể bao gồm nhiều hoạt động khác nhau. Nếu cách khác, phân tích từng hoạt động của dự án có thể là một mô hình PERT.

Xác định hoạt động găng, đường găng

Hoạt động găng là hoạt động mà

$$LST = EST = LFT = EFT = 0, \text{ hay } [EST, EFT] = [LST, LFT]$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} EST = LST \\ EFT = LFT \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Slack = LST - EST = 0 \\ Slack = LFT - EFT = 0 \end{cases} \quad (\text{Lựa chọn cho phép bằng 0}).$$


Giải thích: Slack $\equiv$ Lẻn i l, ng (Lẻn tr).

Trong v² d, Lang x², các hoạt động găng là: C $\rightarrow$ J $\rightarrow$ K $\rightarrow$ L (xem bảng II.14) và từ đó nhận được đường găng (Critical Path). Vậy, phương pháp mạng PERT còn có tên là phương pháp đường găng (CPM – Critical Path Method).

Xác định đường găng bằng phần mềm Lingo


Nếu xác định đường găng bằng phần mềm Lingo, ta có thể sử dụng các biến toán học

bằng cách nháy vào biểu tượng Lingo và thì chỉ cần nhấn *File > Open > Pert.lng* vào biểu tượng PERT mẫu. Sau đó nhập các số liệu vào và bấm vào biểu tượng giải vào thay các số liệu và bấm vào biểu tượng mẫu, chúng hiển thị như sau (xem hình II.6).



Hình II.6. Nhập số liệu cho bài toán PERT

Sau đó chúng ta thì chỉ cần nhấn *LINGO > Solve*, kết quả tính toán sẽ hiển thị trên màn hình (xem hình II.7).



Hình II.7. Kết quả tìm cung căng của bài toán PERT

2.2. Sơ đồ PERT với số liệu ngẫu nhiên

Thì giữa thì chỉ cần nhập vào dữ liệu ngẫu nhiên chung là một bảng dữ liệu ngẫu nhiên. Giả sử ta có các số liệu theo vế thì giữa thì chỉ cần nhập vào dữ liệu (xem bảng II.15) a, m, b. Lúc đó thì giữa trung bình và độ lệch chuẩn thì giữa thì chỉ cần nhập vào độ lệch theo công

thực tế $t = \frac{a + 4m + b}{6}$.

Bảng II.15. Số liệu ước tính về thời gian thực hiện các hoạt động

Hoạt động	Hoạt động kế tiếp	Thời gian ước tính				
		a (sớm nhất)	m (nhiệm vụ bình thường)	b (muộn nhất)	t (thời gian trung bình)	σ (độ lệch tiêu chuẩn, độ lệch tiêu chuẩn)
A	—	1	2	3	2	1/3
B	—	1	2	3	2	1/3
C	—	1	2	3	2	1/3
D	A	1	2	9	3	4/3
E	A	2	3	10	4	4/3
F	E	0	0	0	0	0
G	B	3	6	15	7	2
H	B	2	5	14	6	2
I	D, F	1	4	7	4	1
J	C	4	9	20	10	8/3
K	H, J	1	2	9	3	4/3
L	G, I, K	4	4	4	4	0

Bộ công việc theo lập trình sẽ được thực hiện và các thời gian trung bình và độ lệch tiêu chuẩn. Hoạt động kế tiếp C → J → K → L bao gồm các hoạt động kế tiếp C, J, K và L. Các hoạt động này có thể xảy ra đồng thời, hay nói cách khác, không có phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, các hoạt động kế tiếp H, J sẽ xảy ra đồng thời, vì cả hai đều phải chờ đợi hoạt động trước đó trong số này. Lưu ý rằng theo sự chậm trễ trong tiến độ, các công việc sẽ là Critical Path (tiếng Anh) để chỉ ra rằng việc trễ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.


Thời gian thực hiện dự kiến sẽ là tổng thời gian thực hiện theo công thức: $T = T_C + T_J + T_K + T_L$. Ta tìm kiếm giá trị của T (thời gian trung bình thực hiện dự kiến) theo công thức: $m = m_T = t_C + t_J + t_K + t_L = 2 + 10 + 3 + 4 = 19$ (tuần).

Thời gian lệch tiêu chuẩn của thời gian thực hiện dự kiến:

$$\sigma = \sigma_T = \sqrt{\sigma_C^2 + \sigma_J^2 + \sigma_K^2 + \sigma_L^2} = \sqrt{(1/3)^2 + (8/3)^2 + (4/3)^2 + 0} = 3.$$

Ta coi T (thời gian thực hiện dự kiến) là biến ngẫu nhiên tuân theo luật chuẩn $N(m = 19; \sigma = 3)$.

Để tìm hiểu mức độ xác suất của T cho trường hợp II.8.



Trong mẫu P, xác suất thất bại của sản phẩm trong v, ng (khả năng vượt quá) 19 tuấn, ta phân bố quy T v. Qbi. Jh ng. X. nh. n. v. i. ph. n. ph. i. chu. X. n. t. đ. N(0, 1) nh. Echo trong ph. i. c. 1. L. 1. L. :

$$P(T \leq 19) = P\left(\frac{T - m}{\sigma} \leq \frac{19 - 19}{3}\right) = P(Z \leq 0) = 0,5 \text{ (hay 50\%)},$$

Ở đây $Z = (T - m)/\sigma$ là biến ngẫu nhiên tuân theo phân bố $N(0, 1)$.


Tổng cộng, xác suất thất bại của sản phẩm trong v, ng (khả năng vượt quá) 21 tuấn là 75% như sau:

$$P(T \leq 21) = P\left(\frac{T - m}{\sigma} \leq \frac{21 - 19}{3}\right) = P(Z \leq 0,666) = 75\%.$$

Ta chuyển sang xem xét vấn đề LQVQL tin cậy của thời gian hoàn thành sản phẩm. Chúng ta muốn trả lời câu hỏi sau: Muốn thời gian thất bại của sản phẩm tin cậy 90% thì thời gian tối thiểu (tính theo số tuấn) là bao nhiêu? Nếu $P(T \leq t) = 90\%$. Tra bảng phân bố chuẩn tắc $N(0, 1)$, tìm được $z = 1,28$. Với $z = (t - 19)/3 = 1,28$ nên $t = 19 + 3 \cdot 1,28 \approx 23$ (tuấn). Như vậy, sản lượng xem xét khả năng hoàn thành và độ tin cậy 90% trong v, ng (khả năng vượt quá) 23 tuấn.

2.3. Điều chỉnh dự án khi kế hoạch một số hoạt động bị phá vỡ

Ví dụ: Nếu khi trong quá trình thất bại của sản phẩm, khả năng vượt quá của một số hoặc là bị phá vỡ. Chúng ta thấy, khi phát hiện sản lượng bị chậm so với khả năng LQra ta cần phải tính lại thời gian thất bại của (thời gian rã g) một số hoặc là trong giai đoạn tiếp theo. Xét các điều kiện cho trong hình II.9 và bảng II.16.



Hình II.9. Sơ đồ mạng PERT dự án cần điều chỉnh

Bảng II.16. Số liệu điều chỉnh khi kế hoạch bị phá vỡ

Hoạt động	Thời gian thực tế	Thời gian dự kiến	Kinh phí bổ sung/1 đơn vị thời gian rảnh (trên 1 đơn vị)
A	6	4	2
B	4	3	3
C	3	2	1
D	8	6	1,5
E	7	4	0,5

Sau khi có thời gian thực tế cho các hoạt động như trong bảng II.16, dự định tìm kiếm thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn thành kế hoạch là 16 (tuần). Tuy nhiên do yêu cầu mới, cần giảm thời gian hoàn thành dự án trong vòng (khoảng dưới 10) (tuần). Muốn vậy ta thấy cần các biện pháp sau:

- Tìm thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án (16 tuần) và tìm kiếm các biện pháp.
- Xác định thời gian rảnh tối thiểu là (cột 3, bảng II.16)
- Khi giảm thời gian trên các đường cần phải chú ý rằng phải giảm thời gian của các cung liên kết khác.

Trong hình II.9, ta thấy các thời gian A, C và E và thời gian rảnh tối thiểu là (4, 2, 4 lần lượt các thời gian thực tế của các hoạt động giảm là 10 tuần), thời gian tối thiểu của các hoạt động B và D mới cho phép:

- Phương án 1: giảm thời gian thực tế của hoạt động B mới tuần và giảm thời gian của D mới tuần.
- Phương án 2: khoảng giảm thời gian B và giảm thời gian D hai tuần.

Vậy khi cần giảm thời gian thực tế dự án ta cần thay đổi kế hoạch của các hoạt động theo các bước nêu trên.

Tuy nhiên khi phương án giảm thời gian, như trong ví dụ phân tích kế hoạch các hoạt động của dự án mới tiếp tục giảm thời gian của các hoạt động chi phí gia tăng của các hoạt động tối thiểu là giảm thời gian thực tế của các hoạt động chi phí giảm như vậy và dự án ta cần phương án 2.

Có thể sử dụng phương pháp tiếp cận giảm thời gian theo các mức tối thiểu trên (phương pháp phân tích cho BTQHTT liên quan là mức tối thiểu) như sau để có thể giảm thời gian dự án.

2.4. Tính thời gian rút gọn tối ưu bằng phương pháp đơn hình

Để tính thời gian rút gọn tối ưu bằng phương pháp đơn hình (có thể sử dụng các phần mềm máy tính thích hợp), ta phải đưa ra bài toán hình thức, hay cách khác, cần phải biến bài toán BTQHTT (hình hay là mục tiêu).

Trước hết, cần xác định các biến quy hoạch. Gọi x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 là các thời gian làm việc của các hoạt động (tức các công nhân); y_A, y_B, y_C, y_D, y_E là thời gian cần rút gọn cho các hoạt động. Lưu ý rằng các biến này phải là số nguyên không âm. Ta có BTQHTT là mục tiêu sau (cần chú ý cách đặt biến thời gian rút gọn để đảm bảo tính nguyên):

$$\text{Mục tiêu 1: } z_1 = x_5 \rightarrow \text{Min}$$

$$\text{Mục tiêu 2: } z_2 = 2y_A + 3y_B + y_C + 1,5y_D + 0,5y_E \rightarrow \text{Min}$$

với các ràng buộc:

$$\begin{cases} x_2 \geq 6 - y_A + x_1 \\ x_4 \geq 3 - y_C + x_2 \\ x_3 \geq 4 - y_B + x_1 \\ x_5 \geq 7 - y_E + x_4 \\ x_5 \geq 8 - y_D + x_3 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3, 4, 5 \\ y_j \geq 0, j = A, B, C, D, E \\ y_A \leq 2, y_B \leq 1, y_C \leq 1, y_D \leq 2, y_E \leq 3 \\ x_5 \leq x_1 + 10 \end{cases} \quad (*)$$

Có 2 cách giải bài toán:


– Chuyển mục tiêu 1 thành ràng buộc (*). Như là bài BTQHTT không có phương tiện khi thì thứ tự ưu tiên là ràng buộc (*): chúng ta thay (*) bởi $x_5 \leq x_1 + 11$.

– Nguyên tắc hai mục tiêu được giải theo phương pháp BTQHTT là mục tiêu.

2.5. Áp dụng mạng PERT trong phân tích chi phí và quản lý tài chính dự án

Trong giai đoạn lập kế hoạch PERT và CPM, các phương pháp này thường được sử dụng để cho biết thời gian tối thiểu và tối đa để hoàn thành dự án, và các hoạt động nào sẽ ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án. Khi được sử dụng để phân tích chi phí, chúng ta có thể thấy được mối liên hệ giữa chi phí và thời gian hoàn thành dự án (bao gồm chi phí trực tiếp, gián tiếp và chi phí tiềm ẩn) cũng như quan trọng. Tuy nhiên, ngay nay, PERT và CPM được sử dụng rất rộng rãi cho các dự án xây dựng.

Ví dụ: Chúng ta xem xét dự án với các dữ kiện cho trong bảng II.17 và hình II.10.



ni

$\frac{1}{2} / m, t$ th§ng (u L ng)
10
100
40
5
15
50
75
6
60

D. th^h i gian t' i thi^h L'Who'n th' nh d, §n l' 15 (th§ng).

Nguyễn tđc LđQ hnh tđi chnh m, tđ đ đn l:

- Lũ ãng kinh ph² ph¹ĩ L^ẽc L^ẽa v^o d^ĩn d^ĩn sao cho L^ẽp ãng L^ẽc ti^ĩh L^ĩ d^ĩ ãn.

- Nj_i kinh ph² L² a v^o th¹ a ho⁶ thi¹ (theo ti¹ L¹) th³ ph¹ k¹ p¹ th¹ i Li¹ ch¹ nh.


Cf n̄ n̄ d̄ b̄ L̄ Ċ: n̄ ng hō Ċ L̄ ng n̄ o kh̄ ng d̄ ng h̄ Ċ kinh ph̄ d̄ ki Ċ, n̄ ng hō Ċ L̄ ng n̄ o s̄ d̄ ng kinh ph̄ n̄ Ċ h̄ Ċ d̄ ki Ċ L̄ Ċ s̄ Ċ Ċ ch̄ n̄ th̄ ch̄ p̄.

- Các báo cáo L'nh k³ cho ph³ ki³ Vn s³ L' c d³ sn v³ Q³ L' v³ lu³ ng kinh ph³.

Mu' n vdy, tr◦ c hJ c fñ ldp bñng theo d »i kinh ph² cho d. Sn t thşng 1 Ljñ thşng 15 (xem bñng II.18). Phññ tr◦ n c, a t ng ¹ _ ng v, i cşc hođ L ng giñ ng@ s m nhññ, phññ d◦ i _ ng v, i giñ ng@ mu, n nhññ. Hai h"ng cu' i bñng d"nh cho kinh ph² trong t _ ng thşng v" t" ng kinh ph² c ng d" n cho t i thşng L: t◦ng _ ng v, i hođ L ng giñ ng@ s m nhññ v" giñ ng@ mu, n nhññ.

[illegible]

	10	10	10												
B	10 0	10 0							10 0	10 0					
C				40						40					
D				5 5	5 5	5 5	5 5								
E								15 15	15 15	15 15	15 15	15 15			
F					50	50					50	50			
G					75						75				
H													6 6	6 6	6 6
I						60	60	60	60				60	60	60
Σ	11 0 10	11 0 10	10 10	45 5	13 0 5	11 5 5	65 5	75 15	75 11 5	15 15 5	15 14 0	15 12 5	6 66	6 66	6 66
Σ+	11 0 10	22 0 20	23 0 30	27 5 35	40 5 40	52 0 45	58 5 50	66 0 65	73 5 18	75 0 33	76 5 47	78 0 60	78 6 66	79 2 73	79 8 79



Hình II.11. Đồ thị miền kinh phí khả thi

Dựa vào bảng II.18, có thể vẽ được đồ thị miền kinh phí khả thi như trên hình II.11. Như thấy, lệ phí ng@ n@ ngo i mĩQ kinh ph² khĩ thi th³ c³n g³p r³4 L@ ra c³c bi' n ph³p

Lưu ý rằng, trong trường hợp này, ta cần phải chú ý đến các điều kiện biên của bài toán. Cụ thể, ta cần phải đảm bảo rằng các điều kiện biên của bài toán là đúng.

Lưu ý

Các bước thực hiện của bài toán quy hoạch tuyến tính khi áp dụng phương pháp PERT hay CPM trong thực tế như sau:

- Xác định các công việc PERT của dự án.
- Tính các thời gian chờ đợi của các công việc.
- Tính các thời gian chờ đợi của các công việc, khi cần thiết, dựa trên các điều kiện biên của bài toán.
- Dựa vào các điều kiện biên của bài toán, tính các thời gian chờ đợi của các công việc.
- Phân tích chi phí của bài toán kinh tế, dựa trên các điều kiện biên của bài toán.

3. Một số mô hình mạng khác


3.1. Bài toán cây khung tối thiểu

Bài toán cây khung tối thiểu là bài toán tìm kiếm một cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất trong một đồ thị vô hướng, liên thông. Bài toán này có thể được giải quyết bằng các phương pháp khác nhau, trong đó có phương pháp của Kruskal và Prim.

Ví dụ: Một công ty muốn xây dựng một mạng lưới đường bộ giữa các địa điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Các địa điểm này được kết nối với nhau bằng các đường bộ có trọng số khác nhau. Công ty muốn tìm kiếm một mạng lưới đường bộ có tổng trọng số nhỏ nhất.

Bài toán này có thể được giải quyết bằng phương pháp của Kruskal hoặc Prim. Trong đó, phương pháp của Kruskal là tìm kiếm một cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất bằng cách chọn các cạnh có trọng số nhỏ nhất và loại bỏ các cạnh có trọng số lớn hơn.

Trong trường hợp này, ta cần phải chú ý đến các điều kiện biên của bài toán. Cụ thể, ta cần phải đảm bảo rằng các điều kiện biên của bài toán là đúng. Ngoài ra, ta cần phải chú ý đến các điều kiện biên của bài toán, khi cần thiết, dựa trên các điều kiện biên của bài toán.



Hình II.12. Sơ đồ khoảng cách từ nguồn điện tới các xã

Bảng II.19. Bảng khoảng cách các cung đường

(Nút hàng)	Nút (c, t)						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0	11	1	3	6	10	4
2	11	0	M	M	M	M	9
3	1	M	0	M	5	M	M
4	3	M	M	0	M	7	M
5	6	M	5	M	0	2	M
6	10	M	M	7	2	0	8
7	4	9	M	M	M	8	0

Thuật giải Prim

– Bước khởi tạo: Lập bảng khoảng cách giữa các nút. Trong bảng trên, chọn cột 1 (ví dụ cột 1, tức là ta chọn nút 1 để bắt đầu), gạch bỏ cột và hàng chứa cột 1.

– Chọn bước tiếp:

Bước 1: Chọn đường có trọng số nhỏ nhất (hàng chứa cột 1) và cột 1. Trong các hàng 2-7 của bảng trên, gạch bỏ cột 1.

Bước 2: Chọn cột 1 và hàng 1 (cột 3 biểu diễn nút chọn mới, ghi cung đường vừa tìm được 1 → 3), rồi gạch bỏ cột 3. Nếu trong bảng vẫn còn các cột, tiếp tục quay vòng bước 1, nếu trở lại chỉ còn một cột.

Comment [T3]:

– B-Đ c kJ th¼c: Njũ tũĩ cĩ c§c c t L« bĩ gũch bĩ hJĩ th³ d ng v, i tũĩ cĩ c§c cung LÊ ng li°n th¹ ng t³m LÊ c tũĩ n°n cõy khung t³ i thiW.

Chú ý: Nh ng c@ in nghi°ng minh hoũ cho b-Đ c khĩ i tũĩ v° b-Đ c lHĩ Lũu ti°n. Sau 6 b-Đ c lHĩ, qu§ tr³nh giũĩ kJĩ th¼c v, i c§c cung LÊ ng sau: $1 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 4, 1 \rightarrow 7, 3 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 6, 7 \rightarrow 2$. T³ ng Lũ d³ i c§c cung LÊ ng c, a cõy khung t³ i thiW l° $\Sigma = 1 + 3 + 4 + 5 + 2 + 9 = 24$. Ngo³i ra, c° th Wchĩ n n¼ khĩ i tũĩ l° bũĩ c, n¼ n°o.

Thuđt to§n Prim c, n LÊ c ng d, ng trong c§c b³i to§n x§c Lũnh chi ph² t³ i thiW nhiQ dũng kh§c. Vĩ c chĩ ng minh thuđt giũĩ tr°n xin d³nh lũĩ cho ngÊi LÊ c quan t°n nghi°n c, u c§c vũĩ LQvQthuđt to§n.


3.2. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và quy hoạch động

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất

Trong b³i to§n t³m LÊ ng Li ngđũ nhũĩ, ch¼ng ta mũn x§c Lũnh h³nh tr³nh ngđũ nhũĩ t m, t L³a LiWũ xuũĩ phũt (LiWũ g³ c) LũLi t³ i LiWũ cFh Lũh (LiWũ L²ch) tr°n m, t mũng li°n th¹ ng. ậ Wcho dũ hiWũ, ch¼ng ta xem x@ v² d, sau Lũy.

Vĩ dụ: B³i to§n ngÊi Li du l³ ch.

C° m, t ngÊi Li du l³ ch, xuũĩ phũt t n¼ 1 v° kJĩ th¼c h³nh tr³nh t³ n¼ 10 theo h³nh tr³nh tr°n h³nh II.13.



Hình II.12. Sơ đồ hành trình đường đi

NgÊi du l³ ch xuũĩ phũt t n¼ 1. Trong giai Loũĩ Lũu anh ta ch° LÊ c quyQ (v° bũĩ bu, c) chĩ n m, t trong ba n¼ (th³nh ph³) 2, 3, 4 LũW°o th³m quan. Giai Loũĩ tiũp theo, anh ta ch° LÊ c chĩ n m, t trong ba n¼ 5, 6, 7 LũWdu l³ ch. Trong giai Loũĩ tiũp n³i, anh ta c° quyQ v° m, t trong hai n¼ 8 hoũ 9 tr-Đ c khi kJĩ th¼c h³nh tr³nh tũĩ n¼ 10.

NhEvũy, trong m, i giai Loũĩ ngÊi Li du l³ ch° LÊ c quyQ Li v° m, t th³nh ph³ (m, i th³nh ph³ LÊ c coi l° m, t trũĩng thũĩ c, a giai Loũĩ L°). H³y t³m c§ch x§c Lũnh LÊ ng Li ngđũ nhũĩ t n¼ 1 t³ i n¼ 10 thoũ m «n c§c LiQũ k³ n Lũra c, a b³i to§n.

Nguyên tắc tối ưu Bellman trong quy hoạch động

Sở dĩ nguyên tắc tối ưu Bellman trong quy hoạch động lại có thể áp dụng được là vì bài toán được chia thành các bài toán con nhỏ hơn, và các bài toán con này lại có thể giải quyết được bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman. Điều này có nghĩa là bài toán ban đầu có thể được giải quyết bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman để giải quyết các bài toán con nhỏ hơn, và các bài toán con này lại có thể được giải quyết bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman để giải quyết các bài toán con nhỏ hơn nữa, và cứ thế tiếp tục như vậy cho đến khi giải quyết được bài toán ban đầu.

Ta có thể nghĩ rằng quy hoạch động sẽ giải quyết được bài toán ban đầu bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman để giải quyết các bài toán con nhỏ hơn, và các bài toán con này lại có thể được giải quyết bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman để giải quyết các bài toán con nhỏ hơn nữa, và cứ thế tiếp tục như vậy cho đến khi giải quyết được bài toán ban đầu. Tuy nhiên, điều này không đúng. Trong quy hoạch động, ta sẽ áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman để giải quyết các bài toán con nhỏ hơn, và các bài toán con này lại có thể được giải quyết bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman để giải quyết các bài toán con nhỏ hơn nữa, và cứ thế tiếp tục như vậy cho đến khi giải quyết được bài toán ban đầu.

Bảng II.20. Các giai đoạn của bài toán quy hoạch động

Giai đoạn	Đầu vào	Đầu ra	Đường đi tối ưu	Khoảng cách tối thiểu
Giai đoạn I	8	10	8 → 10	150
	9	10	9 → 10	100
Giai đoạn II	5	8	5 → 8	400
	6	9	6 → 9	300
	7		7 → 8	275
Giai đoạn III	2	5	2 → 6	600
	3	6	3 → 5	600
	4	7	4 → 6	500
Giai đoạn IV	1	2	1 → 2	700
		3	1 → 3	775
		4	1 → 4	650

Giải thích: Sở dĩ nguyên tắc tối ưu Bellman, lại có thể áp dụng được là vì bài toán được chia thành các bài toán con nhỏ hơn, và các bài toán con này lại có thể giải quyết được bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman. Điều này có nghĩa là bài toán ban đầu có thể được giải quyết bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman để giải quyết các bài toán con nhỏ hơn, và các bài toán con này lại có thể được giải quyết bằng cách áp dụng lại nguyên tắc tối ưu Bellman để giải quyết các bài toán con nhỏ hơn nữa, và cứ thế tiếp tục như vậy cho đến khi giải quyết được bài toán ban đầu.

Trong bảng II.20, từ giai đoạn IV, ta thấy khoảng cách ngắn nhất từ 1 đến 4 là 650. Vì vậy, ta có thể suy ra rằng khoảng cách ngắn nhất từ 1 đến 4 là 650.

Quy trình tính toán tổng quát

– Trước hết, cần phải xác định các biến trạng thái (state variables) nào mà ta cần tính toán trong bài toán.

Bảng II.21. Các biến trạng thái của bài toán quy hoạch động

Biến	Số trạng thái	Các trạng thái (n/4)	Giá trị của hàm mục tiêu tại các biến trạng thái
x_4	1	1	$x_4 = 1$
x_3	3	2, 3, 4	$x_3 = 2$; $x_3 = 3$; $x_3 = 4$
x_2	3	5, 6, 7	$x_2 = 5$; $x_2 = 6$; $x_2 = 7$
x_1	2	8, 9	$x_1 = 8$; $x_1 = 9$
x_0	1	10	$x_0 = 10$

Biến trạng thái mới từ trạng thái cũ, ảnh hưởng trong từng giai đoạn.

– Xác định hàm mục tiêu: hàm $F_i(x_i)$ là khoảng cách ngắn nhất từ x_i đến đích. Theo bảng II.20, ta thấy:

$$F_1(x_1) = \begin{cases} 150 & \text{với } x_1 = 8 \\ 100 & \text{với } x_1 = 9 \end{cases}$$

$$F_2(x_2) = \begin{cases} 400 & \text{với } x_2 = 5 \\ 300 & \text{với } x_2 = 6 \\ 275 & \text{với } x_2 = 7 \end{cases}$$

Mục đích của bài toán là tìm giá trị $F_4(x_4) = F_4(1)$.

– Lập hàm truy tố: $F_{i+1}(x_{i+1}) = \min [F_i(x_i) + f_i(u_i)]$, Min tìm theo u_i để hàm $F_{i+1}(x_{i+1})$ nhỏ nhất, trong đó u_i là biến liên tục khi chuyển từ trạng thái x_i sang x_{i+1} với $f_i(u_i)$ là hàm chi phí của biến liên tục u_i (vấn đề tìm kiếm (vấn đề tìm kiếm mục tiêu, như tính toán bài toán cụ thể)). Theo bảng 2, ảnh hưởng của hàm truy tố ta thấy, nếu $F_i(x_i) + f_i(u_i)$ là hàm phi tuyến thì phải dùng kỹ thuật để tính toán hàm $F_{i+1}(x_{i+1})$.

Sau đây chúng ta sẽ tìm cách hàm truy tố $F_{i+1}(x_{i+1})$ với quy trình tính toán lùi ngược về bài toán theo từng giai đoạn, như sau cụ thể tính toán ra được $F_4(x_4) = F_4(1)$.

Giai đoạn 1: Trong giai đoạn này, muốn chuyển từ nhà 10 ($x_0 = 10$) về nhà 8 ($x_1 = 8$) chúng ta cần biết biến liên tục u_0 phải có giá trị 150 ($u_0 = 150$). Khi đó giá trị nhỏ nhất của $f(u_0) = 150$. Nếu u_0 khác 150 thì sẽ có giá trị khác 150. Như vậy chuyển từ nhà 10 về nhà 8 thì cần chi phí 150.

$F_0(x_0) = 0$	$x_0 = 10$	u_0	$f_0(u_0)$	$F_1(x_1)$
$x_1 = 8$	$+ u_0 = 150$	150	150	150
$x_1 = 9$	$+ u_0 = 100$	100	100	100

Chú ý: Khi tính toán bài toán ngược từ x_i về x_{i+1} thì $f_i(u_i)$ của nó. Nếu tính toán, biến liên tục u_i của hàm $f_i(u_i)$ khác u_i của hàm $f_i(u_i)$ thì cần phải tính toán.

Lo.

Giai đoạn 2:

x_2	$x_1 = 8$	$x_1 = 9$	$F_1(x_1) + f_1(u_1)$		$F_2(x_2) = \text{Min}[F_1(x_1) + f_1(u_1)]$
			$x_1 = 8$	$x_1 = 9$	
5	$+u_1 = 250$	$+u_1 = 400$	400	500	$400 = 150 + 250$
6	–	$+u_1 = 200$	–	300	$300 = 100 + 200$
7	$+u_1 = 125$	–	275	–	$275 = 150 + 125$


Giai đoạn 3:

x_3	x_2			$F_2(x_2) + f_2(u_2)$			$F_3(x_3) = \text{Min}[F_2(x_2) + f_2(u_2)]$
	5	6	7	$x_2 = 5$	$x_2 = 6$	$x_2 = 7$	
2	$u_2 = 275$	$u_2 = 300$	–	675	600	–	600
3	$u_2 = 200$	–	$u_2 = 350$	600	–	625	600
4	$u_2 = 175$	$u_2 = 200$	$u_2 = 275$	575	500	550	500

Giai đoạn 4:

x_4	$x_3 = 2$	$x_3 = 3$	$x_3 = 4$	$F_3(x_3) + f_3(u_3)$			$F_4(x_4) = \text{Min}[F_3(x_3) + f_3(u_3)]$
				$x_3 = 2$	$x_3 = 3$	$x_3 = 4$	
1	$u_3 = 100$	$u_3 = 175$	$u_3 = 150$	700	775	650	650

Thế vào: $F_4(x_4) = F_4(1) = 650$ và là nghiệm tối ưu của bài toán II.14.



Hình II.14. Đường đi ngắn nhất $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

3.3. Áp dụng quy hoạch động cho một số bài toán ngành điện

Bài toán 1

Cần phân phối công suất tại các trạm máy điện và phân tải các tải. Biết chi phí của các nhà máy là hàm $f_i(p_i)$ phụ thuộc vào công suất p_i , với $i = 1, 2, \dots, n$. Cần xác định các giá trị p_i sao cho tổng chi phí là cực tiểu. Vậy ta có bài toán tối ưu sau:

Hàm mục tiêu:

$$z = f_1(p_1) + \dots + f_n(p_n) \rightarrow \text{Min}$$

với các ràng buộc:

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + \dots + p_n = P \\ 0 \leq p_i \leq P_{i, \max} \end{cases}$$

trong $L: P \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm giá trị, $P_{i, \max}$ là giá trị tối đa của p_i cho phép.

Chúng ta có $n = 3$ và bài toán BTQHTT (nguyên) sau đây:


$$z = 3p_1 + 2p_2 + p_3 \rightarrow \text{Min}$$

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 = 15 \\ 0 \leq p_1 \leq 6; 0 \leq p_2 \leq 6; 0 \leq p_3 \leq 8 \end{cases}$$

Để giải bài toán:

$$\begin{cases} f_1(p_1) = 3p_1 \\ f_2(p_2) = 2p_2 \\ f_3(p_3) = p_3 \end{cases}$$

Chúng ta có thể phân tích bài toán này về mặt giá trị tối thiểu của hàm mục tiêu. Các biến liên quan là p_1, p_2, p_3 và các biến liên quan khác là x_1, x_2, x_3 ; các biến liên quan khác là p_1, p_2, p_3 và các biến liên quan khác là x_1, x_2, x_3 . Các biến liên quan khác là p_1, p_2, p_3 và các biến liên quan khác là x_1, x_2, x_3 . Các biến liên quan khác là p_1, p_2, p_3 và các biến liên quan khác là x_1, x_2, x_3 .



Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phương pháp quy hoạch động. Các biến liên quan là p_1, p_2, p_3 và các biến liên quan khác là x_1, x_2, x_3 . Các biến liên quan khác là p_1, p_2, p_3 và các biến liên quan khác là x_1, x_2, x_3 . Các biến liên quan khác là p_1, p_2, p_3 và các biến liên quan khác là x_1, x_2, x_3 .

Sử dụng nguyên tắc tối ưu của Bellman, ta chia bài toán ra thành các giai đoạn sau đây (với quy trình tính toán tiến).

Giai đoạn 1: chọn p_1 để tối thiểu hóa $f_1(p_1)$;

Giai đoạn 2: chọn p_2 để tối thiểu hóa $f_2(p_2)$ và p_1 ;

Giai đoạn 3: chọn p_3 để tối thiểu hóa $f_3(p_3)$, p_2 và p_1 .

Giai đoạn 1: (Coi $F_0(x_0) = 0$)

x_1	$x_0 = 0$	$f_1(p_1) = 3p_1$	$F_1(x_1) = \text{Min} [F_0(x_0) + f_1(p_1)]$
-------	-----------	-------------------	---

0	$p_1 = 0$	0	0
1	$p_1 = 1$	3	3
2	$p_1 = 2$	6	6
3	$p_1 = 3$	9	9
4	$p_1 = 4$	12	12
5	$p_1 = 5$	15	15
6	$p_1 = 6$	18	18


Giai đoạn 2:

x ₂	x ₁							F ₁ (x ₁) + f ₂ (p ₂)								F ₂ (x ₂) = Min[F ₁ (x ₁) + f ₂ (p ₂)]
	0	1	2	3	4	5	6									
	p ₂							0	1	2	3	4	5	6		
0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
1	1	0	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	2
2	2	1	0	-	-	-	-	4	5	6	-	-	-	-	-	4
3	3	2	1	0	-	-	-	6	7	8	9	-	-	-	-	6
4	4	3	2	1	0	-	-	8	9	10	11	12	-	-	-	8
5	5	4	3	2	1	0	-	10	11	12	13	14	15	-	-	10
6	6	5	4	3	2	1	0	12	13	14	15	16	17	18	-	12
7	-	6	5	4	3	2	1	-	15	16	17	18	19	20	-	15
8	-	-	6	5	4	3	2	-	-	18	19	20	21	22	-	18
9	-	-	-	6	5	4	3	-	-	-	21	22	23	24	-	21
10	-	-	-	-	6	5	4	-	-	-	-	24	25	26	-	24
11	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	27	28	-	27
12	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	30	-	30

Giai đoạn 3:

x ₃	x ₂								F ₂ (x ₂) + f ₃ (p ₃)						F ₃ (x ₃) = Min [F ₂ (x ₂) + f ₃ (p ₃)]	
	0		6	7	8	9	10	11	12							
	p ₃								7	8	9	10	11	12		
15	–		–	8	7	6	5	4	3	23	25	27	29	31	33	23

Đáp số: Tổng chi phí tối thiểu là 23, với $p_1 = 1, p_2 = 6, p_3 = 8$.



Lưu ý

C\sc v\h{a}m l\c{Q} ch b\h{a}n c\h{a}n gi\h{a}i quy\h{a}t khi \sc \sp d, ng ph\h{a}ng ph\h{a}p quy ho\h{a}ch l\c{a} ng theo nguy\h{a}n t\h{a}c Bellman l\c{a}:

– Chia b'i toŋn th'nh nhiQu giai Loŋn nh LŊgiŋ b'i toŋn t' i C cho t ng giai Loŋn. CŊc yJi t' c, a b'i toŋn quy hoŋh L ng l' biJh trŋng thŊi, biJh LiQu khiW, h'm truy toŋn v' h'm m c ti'u.

– Khi chuyể m t trư ng th i n o L (trong m t giai Lo ư n) sang trư ng th i kh ợc (giai Lo ư n kh ợc) c ư n c bi ư n Li Q khi W.

– M₂ i gi§ tr' c̣ a biJh LiQ₁ khiW g̣y ra ṃ t hi' u₂ ng l' n h' m ṃ c ti' u₂.

– Tu8 theo c8c b i to8n t' i 8 ph8t sinh trong c8c giai Lo8h m' l, a ch' n ph8ng ph8p t' i 8 th'ch h' p.

Trong v² d_n Lang x₀, khi c₅c hi' u_n ng f_i(p_i) cho d₀ i d₀ng h_m tuy₀ t₂nh v_i i c₅c bi₀h p_i nh₀dn c₅c gi₅ tr' r' i r₀u₀nguy₀n th₃ h_m truy to₅gn F_{i+1}(x_{i+1}) = Min [F_i(x_i) + f_{i+1}(p_{i+1})] s₀E t₂nh L₀'₀c b₀ng thu₀đ gi₀l d₀ a tr₀o b₀ng li' t k₀ (nh₀ph₀ng ph₀p gi₀l L₀'₀c tr₀nh b₀'y). N₀J₀ f_i(p_i) phi tuy₀h v_i i c₅c bi₀h p_i nh₀dn c₅c gi₅ tr' li₀n t_n c th₃ L₀W₀m F_{i+1}(x_{i+1}) = Min[F_i(x_i) + f_{i+1}(p_{i+1})] ta c₀ hai c₅ch:


– Csch 1: r° i r° ho§ theo t ng m. c. Chng hñ v. i $p_1 \in [0, 6]$, th³ coi $p_1 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

– C\$ch 2: \$p d_1\$ ng ph-\$\Phi\$ng ph\$sp t' i - \$\Phi\$ th\$ch h' p v_i\$ bi\$Li h' o n t_1\$ c (xem ch-\$\Phi\$ng I) cho
h'm m_1\$ c ti'u. Ch\$ng h' h_1\$, trong v^2 d_1\$ tr'o n khi c\$fn t\$3m F_2(x_2) = Min [F_1(x_1)+ f_2(p_2)] =
Min[f_1(p_1) + f_2(p_2)] = Min [3p_1 + 2p_2] v_i\$ Li\$Q_i\$ k' i' n r'ng bu, c: p_1 + p_2 \$\le\$ 15 v' 0 \$\le\$ p_1 \$\le\$ 6, 0
\$\le\$ p_2 \$\le\$ 6, c' th\$W\$sp d_1\$ ng ph-\$\Phi\$ng ph\$sp L\$H h\$3nh.

Bài toán 2


Xác định tuy nhiên để ng Li c, a để ng duy truy n t l Li n t Li n A L j Li n B, v i c s c h e ng ng i v d kh s c nhau, sao cho t ng chi ph i l nh, nh l C s c d k i n c, a b i to s n cho tr n h nh II.15.


Nh-~~ev~~dy Lw^{hi}Jⁱ l^{dp} sh L^o E^èng truyQⁿ t^l Li' n th³ xu^hi ph^st t A ta c thW^lnh tuyJ^h Li c a E^èng truyQⁿ t^l Li' n tr-^qc hJⁱ ph^l qua m t trong hai LiW^h s^st g^fn, theo h-^qng b^de hay h-^qng Lⁱng, v_i i c^sc chi ph²l^o 15 v^o 12. T_i m t trong hai LiW^h n^y, ch^hng ta l^hi tⁱJ^h t c x^sc Lⁱnh tuyJ^h Li cho E^èng truyQⁿ t^l Li' n, v_i i c^sc chi ph² L^o biJ^h... V^dy ta c bⁱ to^sn t³m E^èng Li v_i i chi ph² nh^o nh^hi.



Hình II.15. Sơ đồ tuyến đi cho dây truyền tải điện

B''i toşn n''y ho''n to''n t' Chng t_v i b''i toşn ng' i du l' ch L« x@ v'' c' th Wgi l' b'ng ph' Chng phşp quy ho'ch L_g ng (Huong d'nn: Chia b''i toşn th''nh nhi'Q giai Lo'p nh' theo cşc L'ng v_i i n@ L_t t' n' i tr'°n h'nh II.15).





Chương III

GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT MÔ PHỎNG VÀ MÔ HÌNH HÀNG CHỜ

1. Mục đích và các công cụ của mô phỏng

1.1. Khái niệm về mô phỏng ngẫu nhiên

Mô phỏng (Simulation) là một kỹ thuật trong kinh tế, kỹ thuật và nhiều lĩnh vực khác. Theo *Từ điển chính xác Oxford*, năm 1976, "mô phỏng" là một kỹ thuật để mô phỏng các quá trình thực tế bằng cách sử dụng các mô hình toán học, thường là các mô hình xác suất, để mô phỏng các quá trình thực tế. Mô phỏng là một kỹ thuật để mô phỏng các quá trình thực tế bằng cách sử dụng các mô hình toán học, thường là các mô hình xác suất, để mô phỏng các quá trình thực tế.

Vấn đề đầu tiên trong mô phỏng (hay nói cách khác là mô phỏng ngẫu nhiên) là mô phỏng các quá trình thực tế bằng cách sử dụng các mô hình toán học, thường là các mô hình xác suất, để mô phỏng các quá trình thực tế. Vấn đề đầu tiên trong mô phỏng (hay nói cách khác là mô phỏng ngẫu nhiên) là mô phỏng các quá trình thực tế bằng cách sử dụng các mô hình toán học, thường là các mô hình xác suất, để mô phỏng các quá trình thực tế.

Thuật toán mô phỏng Monte-Carlo xuất hiện từ những năm 1940, hai mươi năm trước khi thuật toán mô phỏng Monte-Carlo được phát minh ra. Ngày nay, thuật toán mô phỏng Monte-Carlo được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ vật lý đến tài chính. Thuật toán mô phỏng Monte-Carlo được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ vật lý đến tài chính.

Chúng ta sẽ mô phỏng hai quan điểm: một là mô phỏng các quá trình thực tế bằng cách sử dụng các mô hình toán học, thường là các mô hình xác suất, để mô phỏng các quá trình thực tế. Hai là mô phỏng các quá trình thực tế bằng cách sử dụng các mô hình toán học, thường là các mô hình xác suất, để mô phỏng các quá trình thực tế.

1.2. Các công cụ chủ yếu của mô phỏng

Nguồn ngẫu nhiên (Source of randomness)

Trong mô phỏng, nguồn ngẫu nhiên là một yếu tố cần thiết để mô phỏng các quá trình thực tế bằng cách sử dụng các mô hình toán học, thường là các mô hình xác suất, để mô phỏng các quá trình thực tế.

Trong nhiều ngôn ngữ lập trình (như Visual C++ 6.0, hay Builder C++ 5.0,...), ta sẽ thấy các hàm để tạo ra các số ngẫu nhiên, chẳng hạn như hàm `rand()` trong Visual C++ hoặc hàm `random()` trong Builder C++. Các hàm này tạo ra các số ngẫu nhiên dựa trên một giá trị ban đầu gọi là "seed".

Thật ra, việc tạo ra các số ngẫu nhiên không đơn giản như vậy. Việc tạo ra các số ngẫu nhiên đòi hỏi phải có một thuật toán để tạo ra các số ngẫu nhiên dựa trên một giá trị ban đầu gọi là "seed".

vấn đề LQtr°n. M t c§ch kh§i qu§t c thWh i r³ng, c§c s' L' c g i l' s' ngXu nhi°n L' c t' b ra nhEvdy c, n xa m, i th c s l' ngXu nhi°n. M t c§ch ch²nh x§c h hn, ch¼ng ch c thWg i l' c§c s' *giả ngẫu nhiên* m' th i. Chh l' c ng c, a ngu n ngXu nhi°n c thWnh h c ng r b l, n t i kJf qu l ng hi°n c u khi s' d, ng ph c ng ph§p m¹ ph ng ngXu nhi°n.

X@vQth c chh, c§c s' gi l ngXu nhi °n l' c§c s' c t nh chh t b l' nh (*deterministic*), nh c ng ch¼ng c t nh chh gi ng v, i m t d y c§c gi§ tr thWh i n c, a c§c biJh ngXu nhi°n L' c l p, c ph c ph i LQ. V² d, x@ d y s' : 13, 8, 1, 2, 11, 14, 7, 12, 13, 12, 17, 2, 11, 10, 3,... D y s' n y tr¹ ng th³ c v t ngXu nhi°n, nh c ng th c chh l' tu c theo m t quy t c (h y ph§t hi n ra quy t c n y). V i c t m kiJm c§c thu t gi l (hay c§c quy t c t b l' nh) L w ph§t sinh ra c§c s' gi l ngXu nhi°n L' t t l' m t l nh v, c nghi°n c u chuy°n s c c, a To§n h c v Tin h c. M h d½ trong th c tJ khi §p d, ng m¹ ph ng ngXu nhi°n, ng c i ta t khi d½ ng c§c s' ngXu nhi°n tu c theo lu t ph c ph i x§c su b l Q U[0, 1) tr°n [0, 1), nh c ng ngu n s' ngXu nhi°n lo c n y ch²nh l' ch s' L w m¹ ph ng c§c ph c ph i x§c su b l kh§c (xem m, c 1.3).

Mô hình ngẫu nhiên

Hai l² do ch²nh cho v i c §p d, ng m¹ ph ng ngXu nhi °n l' :

– T' ng h p d l i u theo s ph c lo c nh h l' nh.

– n c ra c§c d, b§o.

M u n §p d, ng m¹ ph ng ngXu nhi°n c f n ph l i c m¹ h³nh. NhEvdy, m, c L²ch c, a m¹ ph ng ngXu nhi°n c l ng g f n v, i m, c L²ch c, a m¹ h³nh ho§ (*modelling*). C hai lo c m¹ h³nh th c ng L' c §p d, ng, L' l' : m¹ h³nh ch chJ (*mechanistic model*) v m¹ h³nh t i n d, ng (*convenient model*). C l hai lo c n y LQ c thW L' c s' d, ng L w tr i gi½p c§c c¹ ng v i c nghi°n c u, kh l o s t nh³m gia t ng s nh c n biJ v t m kiJm tri th c, d b§o v h tr v i c ra quyJ l' nh.

n W ng d, ng m t m¹ h³nh, ta c hai s, l, a ch n sau:

– TiJh h nh c§c ph c t²ch v Qm h to§n h c L w m hiW h nh vi c, a m¹ h³nh. V b l Q n y nhi Q khi tr n°n r b l ph c t b v, i c§c h phi tuyJh nhi Q biJh, do L ch¼ng ta c f n L h ra th°m c§c gi l thiJ. Tuy nhi°n nh ng gi l thiJ "ch h c h qu§" c, a to§n h c l i khi tr n°n "L§ng nghi ng " trong th c tJ

– Th² nghi m v, i m¹ h³nh L' ng xem x@. n i v, i c§c m¹ h³nh ngXu nhi°n c§c gi§ tr ph l h i (L f u ra) s e biJh thi°n, v³ v dy ch¼ng ta c f n t b ra h ng lo c c§c thWh i n (d l i u nh c t b) v, i nh ng b, tham s kh§c nhau c, a m¹ h³nh.

n i khi c l ng c f n xem x@ t, i s, l, a ch n th ba, L' l' tiJp c n lai (*hybrid approach*) c, a hai l, a ch n tr°n.

1.3. Mô phỏng một số phân phối xác suất

Một số phân phối xác suất thường gặp

n W §p d, ng m¹ ph ng ngXu nhi°n c f n biJ m t s' kiJh th c ch b l n m ch¼ng ta s e nh c l i ngay sau L y. BiJh ngXu nhi°n l' m t kh§i n i m quan tr i ng trong l² thuyJ x§c su b l th ng k°. M t c§ch gi l h c, biJh ngXu nhi°n (*random variable*), c, n g i l' L' l' c ng ngXu nhi°n, L' c hiW l' biJh nh c n gi§ tr tu§ thu, c v o kJf qu l c, a ph c thi (ph c Lo,

quan sát, thí nghiệm) mà không thể đoán trước được.

Biến ngẫu nhiên chia làm hai loại chính: rời rạc và liên tục. Biến rời rạc thể hiện các giá trị tập hợp hữu hạn (có thể đếm được) hoặc vô hạn đếm được. Biến liên tục là một tập hợp không thể đếm được (vô hạn không đếm được) thể hiện các giá trị đầy đủ nhau trên một khoảng, một đoạn / một điểm (Ví dụ như vận tốc, khối lượng, chiều cao, ...). Trong thực tế, khi nói đến biến liên tục theo nghĩa này, chúng ta thường nói đến biến liên tục theo nghĩa của lý thuyết xác suất (mức độ chính xác hay khối lượng) không thể đo lường được.


Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc minh họa qua ví dụ sau: Xét biến X thể hiện số lần trúng thưởng trong ba lần thử nghiệm độc lập. Các giá trị 6, 9, 12 và các xác suất tương ứng của các trường hợp là 0,3, 0,4 và 0,3. Chúng ta có thể xác định bảng 1 (100%) các phân phối của biến ngẫu nhiên X thể hiện như sau:

Các giá trị của X : x_i	6	9	12
Xác suất tương ứng: p_i	0,3	0,4	0,3

(Chú ý: $\sum p_i = 1$)

Một số phân phối xác suất thông dụng của biến ngẫu nhiên liên tục và rời rạc được liệt kê ở đây.

Phân phối đều trong $[0,1]$: X nhận các giá trị thuộc khoảng $[0,1]$ và khi đó hàm mật độ của X xác định bởi đồ thị trong Hình III.1.



Hình III.1. Đồ thị hàm mật độ phân phối đều

Phân phối Poát-xông: Với một thí nghiệm chỉ một lần (xem mục 3), số lần X xảy ra trong một khoảng thời gian là biến ngẫu nhiên.

Giả sử số lần xảy ra trung bình trong một khoảng thời gian là λ (khi λ là một số nguyên), thì với một số bất kỳ k khác 0, ta có thể coi X tuân theo luật phân phối xác suất Poát-xông (Poisson) như sau:

Các giá trị của X: x_i	0 1x..... + ∞
Xác suất tương ứng	$p(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$

$$\sum p_i = e^{-\lambda} \left[\frac{\lambda^0}{0!} + \frac{\lambda^1}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \dots + \frac{\lambda^x}{x!} + \dots \right] = e^{-\lambda} \times e^{\lambda} = 1.$$

Chúng ta sẽ trình bày cho giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên X để có ý nghĩa và ứng dụng. Trong phần tiếp theo Poisson, chúng ta sẽ thấy rằng cho phân phối của giá trị của X xung quanh giá trị trung bình của nó để có ý nghĩa là để tính chu kỳ. Vì phần tiếp theo Poisson thì $\sigma^2 = \lambda$.

Phân phối mũ: Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phân phối Poisson là một phân phối xác suất rời rạc, mô tả số lần xảy ra của một sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được đặt theo tên của nhà toán học người Pháp Siméon-Denis Poisson. Phân phối này thường được sử dụng để mô hình hóa các hiện tượng ngẫu nhiên như số lần gọi điện thoại, số lần hỏng hóc của một thiết bị, hoặc số lần xảy ra của một thảm họa.

thực tế xác suất $P(\tau \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau$ của thời gian chờ đợi cho đến khi có một sự kiện xảy ra. Do đó hàm phân phối của biến ngẫu nhiên $F(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau = \int_0^t \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau = -e^{-\lambda \tau} \Big|_0^t = 1 - e^{-\lambda t}$.

Phân phối chuẩn tắc $N(0, 1)$: Gọi X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc $N(0, 1)$. Lúc đó các đặc trưng của nó là $m = 0$ và $\sigma = 1$. Hàm phân phối của X có dạng:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2) dx.$$

Cho X là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn $N(m, \sigma^2)$ có trung bình m và độ lệch chuẩn σ . Lúc đó, để tính hàm phân phối của biến $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ thì Z là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn $N(0, 1)$.

Mô phỏng các phân phối xác suất

Ví dụ 1: Một phòng thí nghiệm phân phối điện áp trong $[0, 1]$

Cách 1: Dùng bảng số ngẫu nhiên (xem phụ lục 2A và 2B). Lấy các cặp số ghi lại các số (giữa) ngẫu nhiên để có phân bố sinh ngẫu nhiên trong máy tính. Chẳng hạn, số đầu tiên của bảng 2B chúng ta nhận được là một dãy số ngẫu nhiên: 0,10; 0,09;

0,73; 0,25 é

Cách 2: S' d'ng c'c h'm sinh s' ng'X' nhi'°n (*Random number generator*) L'« L'« c' c' i L'« tr'°n m'şy t'nh.

D'đ'ng b'ng s' ng'X' nhi'°n hay s' d'ng c'c h'm sinh s' ng'X' nhi'°n trong m'şy t'nh, ta c'ng l'ý ra ho' h' t'nh L'« c' l'°n t'đ' c'c s' ng'X' nhi'°n x_i trong $[0, 1)$ v' i $i = 1, 2, \dots, n$. T'đ' s' c'c gi'ş tr' n'ý r'hi v'° k' kho'ng nh' v' i L'« d' i b'ng nhau $1/k$ L'« c' chia ra t' $[0, 1)$ l' g'đ' nh'°n nhau ($\approx n/k$). V' i n l' n th' c'c t'đ' s' L'« c'ng s'đ' g'đ' n/k. V' v'đy ta coi c'c gi'ş tr' ph'şđ' sinh L'« c' l' c'c th'Wh' n' c' a bi'đ'ng ng'X' nhi'°n X tu'°n theo ph'°n ph' i L'« tr'°n $[0, 1)$.

Trong tr'°ng h' p c'đ' m' ph' ng bi'đ'ng Y ph'°n ph' i L'« tr'°n $[a, b)$, ta ch' v' c' t'nh $y_i = a + (b - a)x_i$. Ch'đ' r'ng L'« ph'şđ' sinh c'c s' ng'X' nhi'°n nh'đ' gi'ş tr' nguy'°n $0, 1, 2, \dots, N$, ch' c'đ' ş'p d'ng c'đ'ng th' c' $y_i = [(N + 1)x_i]$, trong L'« v'đ'ph'đ' l' ph'đ'ng nguy'°n c' a $(N + 1)x_i$. M' t' s' b'ng s' ng'X' nhi'°n nguy'°n hay h'm sinh s' ng'X' nhi'°n nguy'°n c' i L'« s'đ' trong c'c h' m'şy t'nh c'ng gi'đ'p gi'đ' quy'đ' v'đ' L'« n'ý.

Ví dụ 2: M' ph' ng ph'°n ph' i r' i r'đ' v' i l'đ' ph'°n ph' i x'şc su'đ' sau

C'c gi'ş tr' c' a X: x_i	6	9	12
X'şc su'đ' p_i	0,3	0,4	0,3

M' n m' ph' ng ph'°n ph' i tr'°n, tr'°c c' h'đ' c'đ' t'đ' ra m' t'đ' c'c ch' s' ng'X' nhi'°n b'ng c'đ'ch tra b'ng s' ng'X' nhi'°n hay đ'ng h'm sinh s' ng'X' nhi'°n L'« L'« c' c' i L'« trong m'şy t'nh. Ch'ng h'đ' ta c' th'Wh' n đ'ý sau 1009732533 7652013586 3467354876 é l'ý t' h'ng L'« b'ng s' ng'X' nhi'°n trong ph'°n l' c' 2B. Ta quy'đ' nh' n'đ' c'c ch' s' 0, 1, 2 xu'đ' h' n th' coi X = 6, n'đ' 3, 4, 5, 6 xu'đ' h' n th' coi X = 9, c' n'đ' 7, 8, 9 xu'đ' h' n th' coi X = 12. L'« c' ng' v' i 10 ch' s' L'« t'°n c' a đ'ý tr'°n $a_1 a_2 \dots a_{10} = 1009732533$ ta c' b'ng sau L'« cho bi'đ' c'c gi'ş tr' c' a X c' th'Wh'đ':

a_i	1	0	0	9	7	3	2	5	3	3
C'c gi'ş tr' c' a X: x_i	6	6	6	12	12	9	6	9	9	9

Nh'°v'đy, L'« c' 10 gi'ş tr' (th'Wh' n) c' a X L'« c' t'đ' ra. T'°ng t' , c' th'Wh'đ' ra c'c th'Wh' h' n kh'şc c' a X. Do t'đ'ng su'đ' (hay x'şc su'đ' th' c'ng h' m) c' a m' i ch' s' ng'X' nhi'°n t' 0 t' i 9 trong b'ng s' ng'X' nhi'°n l' kho'ng 10% n'°n t'đ'ng su'đ' (x'şc su'đ' th' c'ng h' m) X nh'đ' gi'ş tr' 6, 9 v' 12 theo th' t' l' 30%, 40% v' 30%. Do L'« c' th'Wh'đ' coi $P(X = 6) = 30\%$, $P(X = 9) = 40\%$, $P(X = 12) = 30\%$.

V'ý mu'°n mô ph'°ng ph'°n ph'°i c' a X ph'°i ph'°t sinh ra m'°t lo'°t c'c gi'° tr' (c'c th' h' i'°n) x_i c' a bi'°n ng'°u nhi'°n X tu'°n theo quy'đ' lu'°t ph'°n ph'°i đ' cho.

Ví dụ 3: M' ph' ng ph'°n ph' i m'đ'.

Gi'đ' s' bi'đ'ng ng'X' nhi'°n t' tu'°n theo ph'°n ph' i m'đ' v' i h'm ph'°n ph' i x'şc su'đ' l' $F(t)$

$=P(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$. η $\odot$ y ch^2nh l^- xsc $subl$ $LW\tau$ $nhdn$ $gi\dot{s}$ tr^+ kh^1ng l^- n hhn m t s^+ t cho
 $tr\ominus c$; λ l^- $tham$ s^+ $L\ll$ cho c_+ a $ph\oplus$ ph^i $m\ddot{l}$.

$$N_{\text{J}} \text{ r l' b l J n g X u n h i' o n c' p h o n p h' i L Q u t r' o n } [0, 1) \text{ th } 3 \text{ P(r} \geq e^{-\lambda t}) = 1 - e^{-\lambda t} = \text{P}(\tau \leq t)$$
 (xem h³nh III.1). Do L' , $\text{P}(\ln r \geq -\lambda t) = \text{P}(-\frac{1}{\lambda} \ln r \leq t) = \text{P}(\tau \leq t)$. V $\dot{d}$ y L $\dot{W}$ ph $\dot{s}$ t sinh ra c $\dot{s}$ c gi $\dot{s}$ tr' ng $\dot{X}$ u nhi' o n (c $\dot{s}$ c th $\dot{W}$ hi' n) c $\dot{a}$ τ th $\dot{3}$ tr $\dot{e}$ c h $\dot{J}$ c $\dot{F}$ n ph $\dot{s}$ t sinh ra c $\dot{s}$ c gi $\dot{s}$ tr' ng $\dot{X}$ u nhi' o n r v' t $\dot{n}$ h $\tau = -\frac{1}{\lambda} \ln r$. Ch $\dot{3}$ ng h $\dot{u}$ n, t b $\dot{f}$ ng s' ng $\dot{X}$ u nhi' o n (ph $\dot{u}$ l $\dot{u}$ c 2B), n $\dot{J}$ u l $\dot{e}$ y r = 0,10 v' $\lambda = 5$ th $\dot{3}$ $\tau = -0,2 \times \ln r = -0,2 \times \ln 0,1 = 0,46$. Ti $\dot{p}$ theo, n $\dot{J}$ u l $\dot{e}$ y r = 0,09 th $\dot{3}$ $\tau = -0,2 \times \ln 0,09 = 0,482$. C $\dot{u}$ nh $\dot{e}$ v $\dot{d}$ y ta thu l $\dot{e}$ c m $\dot{t}$ d $\dot{e}$ y c $\dot{s}$ c th $\dot{W}$ hi' n c $\dot{a}$ τ .

2. Áp dụng mô phỏng ngẫu nhiên

2.1.Vai trò của phương pháp mô phỏng

NhiQu b' i to s n th, c tJ ch a c s c yJ t' ng Xu nhi' n, b' i' n l' nh kh' ng gi l' E' c b' ng c s c ph' Chng ph s p gi l' t' ch. NjJ ch' ng ta s p d, ng c s c ph' Chng ph s p gi l' t' ch, th' trong nhiQu tr' ng h' p bu, c ph l' c' ng nh' n nh' ng gi l' thiJ ch' ch' ch' kh' ng E' c tho l' m' n tr' n th, c tJ v' do l' l' i gi l' t' m E' c c' ng t' c' gi s' tr' th, c tJ n. Ph' Chng ph s p m' ph' ng E' c d' ng r, ng r' i l' W' gi l' c s c b' i to s n lo' i l' , nh' i' nh' ng b' i to s n li' n quan l' J h' th' ng l' n, b' i' n l' nh, h' m ch a nhiQu yJ t' ng Xu nhi' n.

Ch¹ng ta cFn sƣ d. ng ph¹ng ph¹sƣ m¹ ph. ng trong cƣc t³nh hu' ng sau L'c:

- Khi kh¹ ng t³m L³c m¹ h³nh gi¹ t²ch n^oo th²ch h^o p.
- C³sc ho¹ t¹ L¹ ng c¹ a h¹ th¹ ng th¹ ng b¹ ng đ¹ qu¹ng, L¹ t Lo¹h¹ kh¹ ng theo quy lu¹đ n^oo c¹.
- M¹ ph¹ ng l¹ ph¹ng ph¹sp duy nh¹ t¹ cho chi ph² ti¹ ki¹ m v¹ t¹ n² t¹ th¹ i gian. Tuy nhi¹ n ph¹ng ph¹sp m¹ ph¹ ng c¹ m¹ t¹ s¹ Li¹ h¹ ch¹ sau:
- Kh¹ ng L¹ ra L¹c c¹ i gi¹ ch²nh x³sc.
- Kh¹ x³sc L¹ nh L¹c sai s¹.
- M¹ ph¹ ng ch¹ s¹ đ¹ ng khi m¹ i tr¹ c¹ ng c¹ t²nh b¹ n L¹ nh.
- M¹ ph¹ ng ch¹ t¹ ra c³sc ph¹ng s¹ n L¹nh gi¹ ch¹ kh¹ ng L¹ ra L¹c k¹th¹ đ¹ t³m i gi¹ t¹ c¹.
- M¹ ph¹ ng L¹ i khi r¹ đ¹ ti¹ n.

2.2. Các bước cần tiến hành khi áp dụng mô phỏng

- X̣ɕc L' nh ṿḥ L' Qhay h' th' ng c̣Fn m' ph, ng.
- X̣ɕc L' nh m' h' 3nh m' ph, ng.
- n o v' thu tḥp s' li' u c̣Fn thi' 1 cho m' h' 3nh.

- Chũy m¹ ph_{ng}.
 - Ph_{on} t²ch k_J qu_l m¹ ph_{ng}, n_J c_{fn} th³ ph_l s¹ a l_l ph_{ong} s_n L_c L_c c L_{snh} gi_s qua chũy m¹ ph_{ng}.
 - Chũy m¹ ph_{ng} L_{Wki} m_{ch} ng ph_{ong} s_n m_i.
 - Ki_W tra t²nh L_{ng} L_{dn} c_a m_i k_J lu_{dn} v_{Qh} th³ ng th_c t_J L_c c r_{1/4} ra sau khi chũy m¹ ph_{ng}.
- Tr_{on} L_{cy} l_c c_s b_c c_{fn} l_m khi s_p d_{ng} m¹ ph_{ng} ng_{Xu} nhi_{on} L_W m_{ra} c_s ph_{ong} s_n h_p l₂ cho c_s b_i to_{sn} th_c t_J Ngo_i ra, m¹ ph_{ng} c_n L_c c s_p d_{ng} L_{Wgi} quy_J nhi_Q v_l L_{Qkh} s_c.

2.3. Một số ví dụ về áp dụng phương pháp mô phỏng

Ví dụ 1: C_{fn} l_a ch_n m_t trong hai chi_{Jh} l_c L_{Wph} s_{tr} m_s ph_{Xn}, v_i c_s s_l u thu th_{dp} L_c cho trong ba b_lng III.1, III.2 v_i III.3.

Bảng III.1. Xác suất thời gian phát triển sản phẩm

Th _i gian ph _{st} tr _W s _l ph _{Xn}	X _s s _u l _l	
	Chi _{Jh} l _c I	Chi _{Jh} l _c II
6	0,2	0,4
9	0,3	0,4
12	0,5	0,2

Bảng III.2. Chi phí lợi nhuận

Chi ph ₂ /gi _s b _{sn}	Chi _{Jh} l _c I	Chi _{Jh} l _c II
Chi ph ₂ c _l L _{nh}	600.000	1.500.000
Chi ph ₂ bi _{Jh} th _i n _{/L} h _v	7,5	6,75
Gi _s b _{sn} /L _h v _i s _l ph _{Xn}	10	10

Bảng III.3. Doanh số phụ thuộc thời gian phát triển sản phẩm

Doanh s _c	X _s s _u l _l		
	6 th _{ng}	9 th _{ng}	12 th _{ng}
1.000.000	0,2	0,4	0,5
1.500.000	0,8	0,6	0,5

V_l L_{QLH} ra l_c s_p d_{ng} ph_{ong} ph_s m¹ ph_{ng} L_W nh_i i nh_un trung b₃nh c_a t_{ng} chi_{Jh} l_c, sau L_c ki_W tra k_J qu_l (so s_{nh} v_i k_J qu_l l₂ thuy_J).

Nh_c v_d c_n L_m ph_{on} ph_i x_s s_u l_l c_{fn} m¹ ph_{ng}, ng v_i n_l m bi_{Jh} ng_{Xu} nhi_{on}: X₁ – th_i gian ph_{st} tr_W s_l ph_{Xn} (theo chi_{Jh} l_c) I, X₂ – th_i gian ph_{st} tr_W s_l ph_{Xn} II, X₃ – doanh s_c cho th_i gian 6 th_{ng}, X₄ – doanh s_c cho th_i gian 9 th_{ng} v_i X₅ – doanh s_c cho th_i gian 12 th_{ng}. Trong v₂ d_n y, L_W tr₃nh b₃y L_h gi_lh v_Q v_l L_Q m¹ ph_{ng} c_s

phân phối xác suất của các biến trên, ta dùng mẫu ngẫu nhiên, mẫu số g m m để kiểm tra ngẫu nhiên rồi rút ra kết luận ngẫu nhiên – phân phối c 2A (vây các số 0, 1, 2,..., 9 mẫu số chi phí khoảng 10%).

a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₆	a ₇	a ₈	a ₉	a ₁₀
1	5	8	1	9	2	2	3	9	6
2	0	6	8	5	7	7	9	8	4
8	2	6	2	1	3	0	8	9	2
8	3	7	4	8	3	6	0	4	9
4	6	3	7	5	6	7	4	8	8
0	9	2	8	1	0	5	5	8	2
7	2	9	5	0	8	8	5	7	9
9	5	8	6	1	1	1	6	3	2
7	0	5	5	5	0	8	7	6	7
6	4	7	2	3	8	2	9	3	4

Ta quy định a₁...ng v_i i X₁, a₂...ng v_i i X₂, a₆...ng v_i i X₃, a₈...ng v_i i X₄ v a₁₀...ng v_i i X₅. Ngoài ra cũng quy định:

$$a_1 = \begin{cases} 0,1 & \text{th}^3 X_1 = 6 \text{ th}^3 \text{ng (th}^3 \text{ i gian ph}^3 \text{t tri}^3 \text{W s}^3 \text{h ph}^3 \text{Xn I)} \\ 2,3,4 & \text{th}^3 X_1 = 9 \text{ th}^3 \text{ng} \\ 5,6,7,8,9 & \text{th}^3 X_1 = 12 \text{ th}^3 \text{ng} \end{cases}$$

$$a_2 = \begin{cases} 0,1,2,3 & \text{th}^3 X_2 = 6 \text{ th}^3 \text{ng (th}^3 \text{ i gian ph}^3 \text{t tri}^3 \text{W s}^3 \text{h ph}^3 \text{Xn II)} \\ 4,5,6,7 & \text{th}^3 X_2 = 9 \text{ th}^3 \text{ng} \\ 8,9 & \text{th}^3 X_2 = 12 \text{ th}^3 \text{ng} \end{cases}$$

$$a_6 = \begin{cases} 0,1 & \text{th}^3 X_3 = 10^6 \text{ (doanh s}^3 \text{ 6 th}^3 \text{ng ph}^3 \text{t tri}^3 \text{W s}^3 \text{h ph}^3 \text{Xn)} \\ 2,3,..., 9 & \text{th}^3 X_3 = 1,5.10^6 \end{cases}$$

$$a_8 = \begin{cases} 0,1,2,3 & \text{th}^3 X_4 = 10^6 \text{ (doanh s}^3 \text{ 9 th}^3 \text{ng ph}^3 \text{t tri}^3 \text{W s}^3 \text{h ph}^3 \text{Xn)} \\ 4,5,..., 9 & \text{th}^3 X_4 = 1,5.10^6 \end{cases}$$

$$a_{10} = \begin{cases} 0,1,2,3,4 & \text{th}^3 X_5 = 10^6 \text{ (doanh s}^3 \text{ 12 th}^3 \text{ng ph}^3 \text{t tri}^3 \text{W s}^3 \text{h ph}^3 \text{Xn)} \\ 5,6,..., 9 & \text{th}^3 X_5 = 1,5.10^6 \end{cases}$$

Cfñ nhđđ lĩĩ mĩ t s' c' ng thĩ c trong lqñh vĩ c quĩñ trĩ kinh doanh nhĩ 'Esau:

$$+ \text{Lợi nhuận} = (\text{Doanh số} - \text{Điểm hoà vốn}) \times (\text{Lợi nhuận} / \text{đơn vị sản phẩm})$$

$$+ \text{Điểm hoà vốn} = (\text{Chi phí cố định}) / (\text{Lợi nhuận} / \text{đơn vị sản phẩm})$$

$$+ \text{Lợi nhuận} / \text{đơn vị sản phẩm} = (\text{Giá bán} / \text{đơn vị sản phẩm}) - (\text{chi phí} / \text{đơn vị sản phẩm})$$

Cşc tñnh toşñ m' phĩ ng lĩĩ c' tĩ ng h' p trong bĩng III.4.

Bảng III.4. Kết quả tính toán mô phỏng

S' ng xĩ nhĩ òn										Thĩ i gian		Doanh s'		L' i nhũñ	
a ₁	a ₂				a ₆		a ₈		a ₁₀	I	II	I	II	I	II
1	5	8	1	9	2	2	3	9	6	6	9	1,5.10 ⁶	10 ⁶	3,15.10 ⁶	1,75.10 ⁶
2	0	6	8	5	7	7	9	8	4	9	6	1,5.10 ⁶	1,5.10 ⁶	3,15.10 ⁶	3,38.10 ⁶
8	2	6	2	1	3	0	8	9	2	12	6	10 ⁶	1,5.10 ⁶	1,9.10 ⁶	3,38.10 ⁶
8	3	7	4	8	3	6	0	4	9	12	6	1,5.10 ⁶	1,5.10 ⁶	3,15.10 ⁶	3,38.10 ⁶
4	6	3	7	5	6	7	4	8	8	9	9	1,5.10 ⁶	1,5.10 ⁶	3,15.10 ⁶	3,38.10 ⁶
0	9	2	8	1	0	5	5	8	2	6	12	10 ⁶	10 ⁶	1,9.10 ⁶	1,75.10 ⁶
7	2	9	5	0	8	8	5	7	9	12	6	1,5.10 ⁶	1,5.10 ⁶	3,15.10 ⁶	3,38.10 ⁶
9	5	8	6	1	1	1	6	3	2	12	9	10 ⁶	1,5.10 ⁶	1,9.10 ⁶	3,38.10 ⁶
7	0	5	5	5	0	8	7	6	7	12	6	1,5.10 ⁶	10 ⁶	3,15.10 ⁶	1,75.10 ⁶
6	4	7	2	3	8	2	9	3	4	12	9	10 ⁶	1,5.10 ⁶	1,9.10 ⁶	3,38.10 ⁶

$$\text{ñ iVñ ho' v' n c' a chiVñ l'ĩ c I} = \frac{600.000}{10 - 7,5} = 240.000$$

$$\text{ñ iVñ ho' v' n c' a chiVñ l'ĩ c II} = \frac{1500.000}{10 - 6,75} = 461538$$

Bảng III.5. So sánh lợi nhuận giữa chiến lược I và II

Tỷ lệ lợi nhuận	Chiến lược I	Chiến lược II
	$26,5 \times 10^6$	$28,91 \times 10^6$
Lợi nhuận trung bình (Σ lợi nhuận/ 10)	$2,65 \times 10^6$	$2,891 \times 10^6$

Cần chú ý rằng trong bảng III.5 là kết quả tính toán khi chỉ có một phiên bản 10 để tính và 10 số để chọn ra. Như ta thấy công nghệ của số ngẫu nhiên thứ 3 là chính xác là để công nghệ cao. Vì vậy, nếu vì công nghệ toán trong công nghệ là để lập trình và chỉ có một phiên bản và không thể, không nên là thứ 3 là chính xác sẽ rất cao.

Qua các phần trình bày ta thấy

Để tiến hành mô phỏng cần phải có:

– Cơ sở dữ liệu (DataBase)

– Cơ sở tri thức (KnowledgeBase)

Kiểm tra kết quả mô phỏng trên bảng các số sinh và kết quả lý thuyết là để tính các chỉ số như sau:

Doanh số chiến lược I = $0,2 \times (0,2 \times 10^6 + 0,8 \times 1,5 \times 10^6) + 0,3 \times (0,4 \times 10^6 + 0,6 \times 1,5 \times 10^6) + 0,5 \times (0,5 \times 10^6 + 0,5 \times 1,5 \times 10^6) = 1,295 \times 10^6$. Lợi nhuận trung bình chiến lược I = $(1,295 \div 0,24) \times 2,5 \times 10^6 = 2,637 \times 10^6$. Kết quả tính toán một phiên bản là 2,65 $\times 10^6$ rất sát và kết quả này.

Tổng tỷ lệ tính là của doanh số và lợi nhuận trung bình cho chiến lược II ($2,84 \times 10^6$), và rút ra là của kết quả lý thuyết chính xác của tính toán một phiên bản.

Ví dụ 2: Tìm xác suất để bao phủ 4 điểm bất kỳ trong vùng tròn lớn và tìm vị trí của tam giác (bài toán Sylvester).

Cần để ý rằng khi giải bài toán này là để tìm một phiên bản ngẫu nhiên theo các bước sau đây:

i) Gán cho biến L_j Counter giá trị ban đầu bằng 0.

ii) Tính hình mẫu của các điểm ngẫu nhiên trong số thực $0 \leq r_i \leq 1$ và $0 \leq \varphi_i \leq 2\pi$ (để tạo ra các số ngẫu nhiên thu được $[0, 1)$ theo các hàm φ_i và 2π), $i = 1, 2, 3, 4$. và $H_{x_i} = r_i \sin \varphi_i$, $y_i = r_i \cos \varphi_i$, ta có 4 điểm ngẫu nhiên trong hình tròn lớn và $H_A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, $C = (x_3, y_3)$, $D = (x_4, y_4)$.

iii) Ta tính diện tích 4 tam giác ABC, ABD, ACD và BCD. Như ta có diện tích của tam giác bằng tổng diện tích ba tam giác, nên để tính là để bao phủ 4 điểm A, B, C và D là tam giác. Ta dùng giá trị của biến L_j Counter lần đầu tiên, nếu thấy biến L_j giảm xuống giá trị 0 và quay vòng bước ii).

Quá trình tính toán này cho thấy khi số điểm tạo ra một giá trị khác nhau là để chọn ra một phiên bản (chẳng hạn 10000 lần hoặc 20000 lần, hoặc 100000 lần). Mỗi lần biến L_j Counter sẽ có giá trị khác nhau. Để tính số của số là và số lần, ta có thể sử dụng xu hướng của số là "bao phủ của 4 điểm là tam giác". Sử dụng số này theo luật số là để tính

gần bằng π , a xác suất gần đúng.

Theo các tài liệu chuyên khảo, lấy giá trị gần đúng của bài toán là: $p = 35/(12\pi^2) \approx 0,29552$. Rồi, trong trường hợp này, ta nên sắp đặt ngẫu nhiên các điểm ra ngoài (ví dụ để thử, chứng minh), thay thế cho việc tính xác suất theo lý thuyết (ví dụ khó thử, chứng minh).

Sau đây là văn bản chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình C giá trị bài toán Sylvester.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

#define PI 3.14159265358979
const double esp = 4.5e-12;
struct diem {double x,y;};

/* Tao bo so ngau nhien bang cach tron - shuffling */
int rd(){return rand()%10;}
double radm()
{return rand()%100+0.1*rd()+0.001*rd()+0.0001*rd();}

/* Chương trình chính */
void main()
{
clrscr(); long int count = 0, reps; diem d[4]; double r, goc;
printf("\n Provide number of repetitions:");
scanf("%ld",&reps); printf("\n reps= %ld",reps); srand(19587);

/* Gieo ngau nhien 4 diem va tinh dien tich bon tam giac */
for(long int i=0;i<reps;i++)
{
for (int j=0;j<4;j++)
{
r=radm(); goc=radm()/100;
d[j].x=r*cos(goc); d[j].y=r*sin(goc);
}
double d12=sqrt(pow(d[0].x-d[1].x,2)+pow(d[0].y-d[1].y,2));
double d13=sqrt(pow(d[0].x-d[2].x,2)+pow(d[0].y-d[2].y,2));
```

```

double d14=sqrt(pow(d[0].x -d[3].x,2)+pow(d[0].y -d[3].y,2));
double d23=sqrt(pow(d[1].x -d[2].x,2)+pow(d[1].y -d[2].y,2));
double d24=sqrt(pow(d[1].x -d[3].x,2)+pow(d[1].y -d[3].y,2));
double d34=sqrt(pow(d[2].x -d[3].x,2)+pow(d[2].y -d[3].y,2));
double p123=(d12+d23+d13)/2;
double p124=(d12+d24+d14)/2;
double p134=(d13+d34+d14)/2;
double p234=(d23+ d24+d34)/2;
double s123=p123*(p123 -d12)*(p123-d13)*(p123-d23);
double s124=p124*(p124 -d12)*(p124-d14)*(p124-d24);
double s134=p134*(p134 -d13)*(p134-d14)*(p134-d34);
double s234=p234*(p234 -d23)*(p234-d24)*(p234-d34);

/* Cac truong hop bao loi cua 4 diem la tam giac */
if(s123>0&& s123>0&& s134>0&& s234>0)
{
s123=sqrt(s123);s124=sqrt(s124);
s134=sqrt(s134);s234=sqrt(s234);
if(fabs(s123-(s124+s134+s234))<esp)
count++;
else if(fabs(s124-(s123+s134+s234))<esp)
count++;
else if(fabs(s134-(s123+s124+s234))<esp)
count++;
else if(fabs(s234-(s123+s124+s134))<esp)
count++;
}
else count++;
}
printf("\n Number of repetitions = %ld",reps);
printf("\n Number of successes = %ld",count);
printf("\n Probability to compute= %0.9f", count *1.0/reps);
getch();
}

```

Các kết quả chạy chương trình trong bốn lần nháy sau:

esp = 4.5e-12	esp = 4.5e-12	esp = 4.5e-12	esp = 4.5e-12
---------------	---------------	---------------	---------------

số lần lặp 10000	số lần lặp 20000	số lần lặp 100000	số lần lặp 200000
số lần thử nghiệm	số lần thử nghiệm	số lần thử nghiệm	số lần thử nghiệm
3050	5941	29594	58993
xác suất 0.30500	xác suất 0.29705	xác suất 0.29594	xác suất 0.294965

Ví dụ 3: Giải bài toán tối ưu của hàm sau (xem ví dụ 4.2 chương I và bài 3 của bài tập về nhà).

$$f(x) = 4x_1^2 - 2,1x_1^4 + x_1^6/3 + x_1x_2 - 4x_2^2 + 4x_2^4 \rightarrow \text{Min}$$

với điều kiện ràng buộc (miền ràng buộc D):

$$\begin{cases} -2,5 \leq x_1 \leq 2,5 \\ -1,5 \leq x_2 \leq 1,5 \end{cases}$$

Bài toán trên là bài toán tối ưu phi tuyến tính, có thể giải bằng các phương pháp tối ưu hóa. Bài toán này được trình bày trong tài liệu tham khảo.

Ta tìm phương pháp tối ưu của bài toán bằng phương pháp mô phỏng ủ (Simulated Annealing). Phương pháp (SA) mô phỏng quá trình vật lý sau khi đun nóng rồi để nguội. Khi đun nóng, các hạt chuyển động hỗn loạn. Khi để nguội, các hạt dần dần sắp xếp thành trật tự. Phương pháp này dựa trên mô hình chuyển động ngẫu nhiên (bước nhảy ngẫu nhiên) và quy tắc Markov, nhằm tìm kiếm cực tiểu của hàm mục tiêu. Thuật toán SA được trình bày trong chương IV, có thể thấy rằng minh họa quá trình SA sẽ như sau:

Bước khởi tạo

Ta xác định tập mẫu tối ưu của bài toán bằng phương pháp mô phỏng ủ. Lấy ngẫu nhiên một điểm khởi tạo X_0 trong miền ràng buộc D. Đặt $T = T_{\text{ban đầu}}$ (thường là 10000, tùy thuộc vào bài toán).

Các bước lặp

Tính giá trị hàm mục tiêu tại điểm X_0 và tính các tham số ban đầu.

i) Chọn $X_0 \in D$ và tính giá trị hàm mục tiêu tại X_0 .

ii) $X_{k+1} = X_k + \Delta X$ với ΔX là một vectơ ngẫu nhiên. Nếu $\Delta f < 0$ thì chấp nhận X_{k+1} . Nếu $\Delta f > 0$ thì chấp nhận X_{k+1} với xác suất $p = \exp(-\Delta f / (K_b \times T))$, trong đó K_b là hằng số Boltzmann ($K_b = 1,38 \cdot 10^{-23}$), T là nhiệt độ hiện tại trong quá trình ngẫu nhiên.

Quy trình i) và ii) lặp lại cho đến khi đạt được tiêu chí dừng (thường là $L = 200, 300, \dots$).

Sau mỗi lần lặp, ta tính giá trị hàm mục tiêu tại điểm mới X_{k+1} theo công thức $T = \alpha T$ ($\alpha \approx 1$, thường chọn $\alpha = 0,95$ hay $0,99$). Thuật toán dừng khi $T \leq T_{\text{cutoff}}$ (T_{cutoff} là giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 0).

Sau khi kết thúc quá trình mô phỏng ủ, ta có được kết quả tối ưu.

/* Sử dụng kỹ thuật annealing – mô phỏng ủ để giải bài toán tối ưu toàn cục có ràng buộc */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
```

```
/* Tinh gia tri ham so can cuc tieu hoa */
```

```
float f(float x,float y)
{
    float fg = 4*pow(x,2)-2.1*pow(x,4)+pow(x,6)/3;
    fg = fg +x*y -4*pow(y,2)+4*pow(y,4);
    return fg;
}
```

```
/* Kiem tra cac dieu kien rang buoc */
```

```
int constraint(float x,float y)
```

```
{
    float fg;
    fg = x + 2.5;
    if (fg<0) goto ZERO;
    fg = 2.5 - x;
    if (fg<0) goto ZERO;
    fg = y + 1.5;
    if (fg<0) goto ZERO;
    fg = 1.5 - y;
    if (fg<0) goto ZERO;
    return 1;
ZERO: return 0;
}
```

```
/* Thu tuc tim diem thay the mo phong qua trinh annealing */
```

```
void sa(float x0,float y0,int k,float T,float Tlast,float alfa,float delta)
```

```
{
    float x1,y1,deltaf,u,p,ux,uy;
    int l=1; srand(27556);
    printf("\n starting value of the function=%f",f(x0,y0)); getch();
```



```

printf("\n obtained at x=%f, y=%f",x0,y0);getch();
do
{
    do
    {
        ux=float(random(10000))/10000 -0.5;
        x1=x0-delta*ux;
        uy=float(random(10000))/10000 -0.5;
        y1=y0-delta*uy;
        if(constraint(x1,y1)==1)
        {
            deltaf=f(x1,y1)-f(x0,y0);
            if(deltaf<=0) {x0=x1;y0=y1;}
            else
            {
                u=float(random(10000))/10000;
                p=exp(-deltaf/T);
                if(u<=p) {x0=x1;y0=y1;}
            }
        }
        l=l+1;
    }while(l<=k);
    T=T*alfa;
}while(T>Tlast);
printf("\n Optimal value fMin=%f",f(x0,y0)); getch();
printf("\n obtained at x=%f, y=%f",x0,y0);getch();
}
/* Chuong trinh chinh tim diem toi uu */
void main()
{
    clrscr();

    float x0,y0,T,Tlast,k,alfa,delta;

    printf("\n Within the range -2.5 to 2.5 provide value x0=");
    scanf("%f",&x0);

    printf("\n Within the range -1.5 to 1.5 provide value y0=");
    scanf("%f",&y0);

    printf("\n Specify number of iterations at each T level=");
    scanf("%d",&k);

    printf("\n Specify a very high value for Tstart=");

```

KJ̄ qū ch̄y ch̄-ŋg tr³nh m̄sy t²nh v, i thuđt gīl̄ SA l̄:

(v_s i alfa = 0.997, delta = 0.01, $T_{\text{ban LFU}} = 10000$, $L = 500$, $T_{\text{cu i}} = 0.0001$).

3.1. Một số yếu tố cơ bản của hệ thống hàng chờ

Mô hình hàng chờ

– Ph₀n t²ch b₁l₁n ch₁l₁c, a qu₁s tr³nh di₁ n ra trong c₁s₁c h¹ th¹ng h¹ng ch¹ v¹ thi₁J l₁p c₁s₁c m¹ i li⁰n h¹ v₁Q₁l₁ng gi₁ a c₁s₁c L₁H₁tr³ng c₁ a c₁s₁c qu₁s tr³nh b₁l₁ n i Q₁L₁c₁ ngh₁a l¹ c₁h₁ thi₁J l₁p hay l₁ a ch₁ n m₁ t₁m¹ h₁nh h¹ng ch¹ (*Waiting Line Model*) ph₁l₁n s₁nh L₁c₁b₁l₁n ch₁l₁c, a

h' th' ng.

– Tr' n ch s' c' sc m' i li' n h' L« L' c x@ d' ng v' c' sc s' li' u thu L' c t' h' th' ng, c' f' n t' nh to' sn, ph' n t' ch v' L' ra c' sc quy' J' L' nh nh' m t' m ra c' sc gi' s' tr' th' ch h' p cho c' sc tham s' Li' Q' khi' W / thi' J' k' J' c, a h' th' ng L' W thi' J' k' J' hay Li' Q' khi' W c' sc ho' i' L' ng c, a h' th' ng ho' i' L' ng m' t' c' sc ch' c' hi' u qu' h' hn.

Các phương pháp giải bài toán mô hình hàng chờ

n' W' m l' i gi' i cho m' t m' h' nh h' ng ch' ng- i ta th' c' ng s' d' ng hai ph' c' ng ph' p: ph' c' ng ph' p gi' i t' ch v' ph' c' ng ph' p m' ph' ng tr' n m' s' y t' nh. Ph' c' ng ph' p gi' i t' ch L' W gi' i m' h' nh h' ng ch' g' m c' sc b' c' c' sau:

Bước 1: Ph' n t' ch h' th' ng, ch' y' J' l' ph' n t' ch b' n ch' i' c, a d' ng y' u c' f' u / t' n hi' u L' J' v' c' sc tr' c' ng th' i' c, a h' th' ng.

Bước 2: Thi' J' l' p h' ph' c' ng tr' nh tr' c' ng th' i' cho c' sc x' s' c su' i' tr' c' ng th' i' (x' s' c su' i' L' W h' th' ng' m' t' tr' c' ng th' i' n' o L' t' i' th' i' L' i' W' t).

Bước 3: Gi' i h' ph' c' ng tr' nh L' W' m c' sc x' s' c su' i' tr' c' ng th' i'. T' L' thi' J' l' p c' sc m' i quan h' g' i' a c' sc ch' ti' o u c' f' n ph' n t' ch.

Bước 4: T' nh to' sn, ph' n t' ch c' sc ch' ti' o u, tr' n ch s' L' L' ra c' sc nh' n x@ v' c' sc quy' J' L' nh.

Ph' c' ng ph' p gi' i t' ch th' c' ng s' d' ng c' sc gi' i thi' J' r' i' ch' h' ch' c, a To' sn h' c' v' Q' c' sc L' H' tr' c' ng c, a h' th' ng, v' v' d' y n' c' m' t s' h' i' ch' J' nh' i' L' nh khi gi' i c' sc b' i to' sn th' c' t' J'

Trong khi L' , ph' c' ng ph' p m' ph' ng / m' ph' ng ng' X' u nh' i' n L' W gi' i m' h' nh h' ng ch' L' c' s' p d' ng cho c' sc b' i to' sn d' ch v' L' m L' ng kh' ng gi' i L' c' b' ng c' ng c, gi' i t' ch, nh' i' l' nh' ng b' i to' sn li' n quan L' J' h' th' ng l' n, b' i' n L' nh, h' m ch' a nh' i' Q' y' J' t' ng' X' u nh' i' n, kh' ng tu' n theo c' sc gi' i thi' J' qu' s' ch' h' ch' c, a To' sn h' c. Trong nh' i' Q' tr' c' ng h' p ph' c' ng ph' p m' ph' ng cho ta ti' J' ki' m L' c' th' i' gian v' chi ph' nghi' n c' u. Tuy ph' c' ng ph' p m' ph' ng ch' t' i' ra c' sc ph' c' ng s' n L' t' t' L' W' s' nh gi' s' ho' i' L' ng c, a h' th' ng ch' kh' ng L' ra L' c' k' o' thu' d' t' m l' i gi' i t' t' nh' i' n' t' ra r' i' th' nh c' ng khi gi' i quy' J' nh' i' Q' b' i to' sn h' ng ch' n' l' y' sinh t' th' c' t' i' n. C' sc b' c' c' f' n ti' J' h' nh khi s' p d' ng ph' c' ng ph' p m' ph' ng bao g' m:

Bước 1: X' s' c L' nh b' i to' sn hay h' th' ng h' ng ch' c' f' n m' ph' ng v' m' h' nh m' ph' ng.

Bước 2: n' o v' thu th' p s' li' u c' f' n thi' J' c' f' n thi' J' L' W kh' o' s' s' t' th' ng k' c' sc s' L' H' tr' c' ng / c' sc y' J' t' ch b' n c, a m' h' nh.

Bước 3: Ch' y' m' ph' ng ki' W' n ch' ng (test simulation) m' h' nh v' so s' nh k' J' qu' i' ki' W' n ch' ng v' i c' sc k' J' qu' i' L' c' bi' J' L' c' trong th' c' t' J' Ph' n t' ch k' J' qu' i' ch' y' m' ph' ng ki' W' n ch' ng, n' J' c' f' n th' p' h' i' s' a l' i' ph' c' ng s' n L' c' L' s' nh gi' s' qua ch' y' m' ph' ng.


Bước 4: Ch' y' m' ph' ng L' W ki' W' n ch' ng ph' c' ng s' n c' u' i' c' ng v' ki' W' n tra t' nh L' ng L' d' n c, a m' i k' J' lu' n v' Q' h' th' ng th' c' t' J' L' c' r' i' 4 ra sau khi ch' y' m' ph' ng. Tri' W' khai ho' i' L' ng c, a h' th' ng h' ng ch' d' a tr' n ph' c' ng s' n t' m L' c.

T' nh' ng ph' n t' ch tr' n L' c' th' W' th' i' L' 2 thuy' J' h' ng ch' (Waiting Line Theory) c, n g' i' l' L' 2 thuy' J' h' ph' c' v' c' ng c' ng hay L' 2 thuy' J' h' d' ch v' L' m L' ng l' l' q' nh v' c

trên quan trọng của Tổ chức quản lý / Vận hành hệ thống. Nhiệm vụ của tổ chức trong các lĩnh vực của hệ thống dịch vụ, kết hợp để tạo ra các giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Các yếu tố cơ bản của hệ thống hàng chờ

Hệ thống hàng chờ tổng quát được minh họa như trên hình III.2.




Hình III.2. Hệ thống hàng chờ

Các yếu tố cấu thành của hệ thống hàng chờ bao gồm:


a. Bố trí vật lý của hệ thống

Hệ thống hàng chờ có một số dạng bố trí vật lý (physical layout) như minh họa trên hình III.3.


Single Channel – Single Server (Một kênh phục vụ, một lối dịch vụ)




Single Channel – Multi Server (Một kênh phục vụ, nhiều lối dịch vụ)



Multi Channel – Single Server (Nhiều kênh phục vụ, một lối dịch vụ)



Multi Channel – Multi Server (Nhiều kênh phục vụ, nhiều lối dịch vụ)



Hình III.3. Các dạng hệ thống hàng chờ

Trên hình III.3, các kênh phân cấp là các hàm l' như thi bị kq thu đt ho h con ng i ho h nh ng t' h' p các thi bị kq thu đt v' con ng i là c' t' ch' c qu l' m' t c' sch th' ch h' p nh' m' ph' c v' c' sch y' u c' f' / c' sch t' n' h' u l' h' t' h' ng. Ch' ng h' h' , c' sch tr' m' l' n tho' t' l' ng, k' nh ph' c v' l' c' sch l' ng d' y l' n l' c' ng c' sch thi bị kq thu đt kh' sch ph' c v' cho v' c' l' m' tho' t'.

b. Nguyên tắc phục vụ

Nguyên tắc ph' c v' (hay n' i quy) c' a h' t' h' ng l' c' sch th' c nh' c' sch y' u c' f' v' o c' sch k' nh ph' c v' . Nguyên tắc ph' c v' cho bi' tr' i' ng h' p n' o th' y' u c' f' l' c' nh' v' o ph' c v' v' c' sch th' c ph' b' c' sch y' u c' f' v' o c' sch k' nh nh' i' t' h' n' o. n' ng th' i' nguy' n tắc ph' c v' c' l' ng cho bi' tr' trong tr' i' ng h' p n' o y' u c' f' b' t' ch' i' ho h ph' i' ch' v' gi' i h' h' c' a th' i' gian ch' .

M' t s' nguy' n tắc ph' c v' th' i' ng l' c' s' p d' ng trong c' sch h' t' h' ng h' ng ch' l' FIFO (First in first out) , LIFO (Last in first out) , FCFS (First come first serve) , c' i' ti' n, kh' ng i' ti' n,...

c. Các phân phối xác suất của các dòng tín hiệu, dòng phục vụ

S' t' n' h' u l' h' trong m' t kho' ng th' i' gian l' ng nh' i' i' gian ph' c v' t' ng t' n' h' u n' i' chung l' nh' ng bi' ng' n' i' n' , v' do l' , ch' ng tu' theo c' sch quy l' t' ph' i' i' x' sch su' b' . C' sch quy l' t' ph' i' i' x' sch su' b' n' y l' c' thi' l' p c' n' c' c' sch s' l' i' u th' c' ng h' m' thu th' p t' c' sch quan s' t, th' ng h' m, hay t' c' h' s' d' l' i' u s' l' c' .

n' i' v' i' d, ng t' n' h' u l' f' v' o, th' i' ng th' i' ng ch' ng ta gi' s' r' ng s' t' n' h' u l' h' trong v, ng m' t kho' ng th' i' gian n' o l' l' c' b' l' nh tr' c (1 ph' /4, 3 ph' /4, 5 ph' /4, 30 ph' /4,...) tu' theo l' t' ph' i' i' Po' t-x' ng $P(\lambda)$. , l' y, tham s' l' l' h' tr' i' ng cho s' t' n' h' u l' h' (trung b' nh) trong kho' ng th' i' gian tr' o' n. V' d' , s' kh' sch v' o si' u th' (trung b' nh) l' 100 ng' i' trong 1 gi' . C' ng h' l' , s' kh' sch v' o si' u th' l' bi' ng' n' i' n' X c' ph' i' i' Po' t-x' ng v' i' $\lambda = 100$. Ho h, v' i' s' c' u' c' g' i' (trung b' nh) l' h' t' ng l' i' trong v, ng 1 ph' /4 l' 3 (t' n' h' u) th' c' $X \sim P(3)$.

M' t c' sch ch' nh x' sch h' n, trong nh' ng tr' i' ng h' p tr' o' n, ta c' d, ng t' n' h' u l' h' l' d, ng Po' t-x' ng d' ng (c, n g' i' l' dòng t' o' i' gi' n) v' i' c' sch t' nh ch' i' tr' o' n sau:

- *Tính không hậu quả*: M' t d, ng t' n' h' u c' t' nh kh' ng h' u qu' n' l' i' x' sch su' b' xu' b' i' n m' t s' t' n' h' u n' o l' trong m' t kho' ng th' i' gian nh' i' l' nh kh' ng ph' thu' c' v' o v' i' c' l' c' bao nh' i' u t' n' h' u l' c' xu' b' i' n v' xu' b' i' n nh' i' t' h' n' o tr' c' kho' ng th' i' gian l' .

- *Tính đơn nhất*: D, ng t' n' h' u c' t' nh l' nh nh' i' n' l' i' x' sch trong kho' ng th' i' gian kh' b' th' s' k' i' n' i' c' nh' i' h' n m' t t' n' h' u xu' b' i' n n' o h' f' u nh' i' kh' ng x' l' y ra. VQ m' h' th' i' gian ta c' th' Wx m' d, ng t' n' h' u c' t' nh l' nh nh' i' n' l' i' l' i' v' n' xu' b' i' n c' sch t' n' h' u kh' ng tr' i' ng nh' au.

- *Tính dòng*: D, ng t' n' h' u c' t' nh d' ng n' l' i' x' sch su' b' xu' b' i' n m' t s' t' n' h' u n' o

L: trong khoảng thời gian τ chờ phục vụ có số lần đến của khách phục vụ có số lần đến khách là L_F của τ .

3.2. Các chỉ số cần khảo sát

Để tính các chỉ số cần khảo sát, cần tìm cách xác định các chỉ số sau:

– A (Arrival rate): số lần đến trung bình trong một khoảng thời gian. Ví dụ: A = 6 (6 khách hàng đến trong 2 tiếng); A = 20 (20 chiếc xe đến trong 1 phút).

– S (Service rate): số lần phục vụ hay số lần xử lý trung bình của một khách hàng trong một đơn vị thời gian. Ví dụ: S = 7 (hàng hóa được phục vụ 7 khách hàng trong 1 giờ); S = 25 (tên gọi của phục vụ là 25 chiếc xe trong 2 phút).

– Lq (Number in queue hay Length of queue): số lần chờ đợi trung bình trong hàng chờ.

– Ls (Number in system hay Length of system): số lần chờ đợi trung bình trong toàn hệ thống (nhắc đến Ls ≥ Lq).

– Wq (Waiting time in queue): thời gian chờ trung bình trong hàng chờ của một khách hàng.

– Ws (Waiting time in system): thời gian chờ trung bình trong hệ thống của một khách hàng.

– Pw (Probability the system is busy): xác suất hệ thống bận (tạm gọi là đang hoạt động) hay đang có khách chờ (chờ) số lần đến của toàn hệ thống (Utilization factor).

3.3. Tính toán các chỉ số

Với các cách tính khác nhau của L_F, sau đây chúng ta sẽ xem xét các hệ thống hàng chờ với một lối đến khách. Bảng phân phối xác suất (xem mục 3.1), cách tính các chỉ số cần khảo sát của hệ thống hàng chờ là như sau:

Mô hình một kênh phục vụ thỏa mãn: số tín hiệu đến có phân phối Poát-xông, thời gian phục vụ có phân phối mũ

Các công thức (1) sau đây là các công thức tính toán (bảng phân phối xác suất):

$$L_q = \frac{A^2}{S(S-A)}; L_s = \frac{A}{S-A}; L_q = \frac{A}{S} L_s;$$

$$W_q = \frac{A}{S(S-A)}; W_s = \frac{1}{S-A}; P_w = \frac{A}{S}.$$

Chúng ta lấy ví dụ A = 3, S = 4 thì:

$$L_q = \frac{9}{4(4-3)} = 2,25; L_s = \frac{3}{1} = 3;$$

$$W_q = \frac{3}{4} = 0,75; W_s = 1; P_w = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Mô hình một kênh phục vụ thỏa mãn: số tín hiệu đến là phân phối Poát-xông, thời gian phục vụ có phân phối bất kì.

Các công thức (II) sau đây dễ dàng chứng minh:

$$L_q = \frac{A^2 \sigma^2 + (A/S)^2}{2(1-A/S)}; \quad L_s = L_q + \frac{A}{S};$$

$$W_q = \frac{L_q}{A}; \quad W_s = W_q + \frac{1}{S}; \quad P_w = \frac{A}{S}.$$

Trong đó σ là độ lệch chuẩn của thời gian phục vụ, σ^2 là phương sai. Chẳng hạn, nếu thời gian phục vụ tuân theo phân phối mũ thì $\sigma^2 = \frac{1}{S^2}$ và công thức thời gian trung bình phục vụ, σ và σ^2 của thời gian chờ đợi là:

$$m = \int_0^\infty t f(t) dt = \frac{1}{S} \quad \sigma = \sqrt{\int_0^\infty (t-m)^2 f(t) dt} = \frac{1}{S}.$$

Để tính các công thức (II) từ (I).

Mô hình một kênh phục vụ thỏa mãn: số tín hiệu đến có phân phối Poát-xông, thời gian phục vụ có phân phối mũ, hàng chờ có giới hạn số tín hiệu tối đa M

Các công thức (III) sau đây dễ dàng chứng minh:

$$P_0 = \frac{1-A/S}{1-(A/S)^{M+1}}; \quad P_w = 1 - P_0;$$

và P_0 là xác suất để không có tín hiệu nào trong hệ thống (hệ số khả năng sử dụng);

$P_M = (A/S)^M P_0$ là tỉ lệ phần trăm tín hiệu không được phục vụ do hệ thống đầy;

$$L_s = \frac{P_w - M(A/S)P_M}{1-(A/S)}; \quad L_q = L_s - \frac{A(1-P_M)}{S};$$

$$W_s = \frac{L_s}{A(1-P_M)}; \quad W_q = W_s - \frac{1}{S}.$$

Chẳng hạn nếu $M = +\infty$ thì (III) trở về (I).

Mô hình nhiều kênh phục vụ thỏa mãn: tín hiệu đến có phân phối Poát-xông, thời gian phục vụ là phân phối mũ.

P_0 - xác suất để tất cả các kênh phục vụ đều không có tín hiệu, tìm được cách tra bảng để tính A/kS (k - số kênh phục vụ) hoặc tính trực tiếp công thức sau:

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{n!} \left(\frac{A}{S}\right)^n + \frac{1}{k!} \left(\frac{A}{S}\right)^k \frac{kA}{kA - S}} \quad \text{vì } kS > A;$$

$$P_w = \frac{1}{k!} \left(\frac{A}{S}\right)^k \frac{kS}{kS - A} P_0;$$

$$L_s = \frac{AS(A/S)^k}{(k-1)!(kS-A)^2} P_0 + \frac{A}{S}; \quad L_q = L_s - \frac{A}{S}; \quad W_s = \frac{L_s}{A}; \quad W_q = \frac{L_q}{A}.$$

Một số điểm hạn chế của các mô hình hàng chờ

Các mô hình hàng chờ chỉ giải thích được một phần nhỏ của thực tế. Tuy nhiên, do các mô hình này chỉ dựa trên các giả thiết đơn giản về phân bố thời gian phục vụ và thời gian đến, chúng không thể mô tả được các hiện tượng phức tạp như sự thay đổi cấu trúc hàng chờ theo thời gian, sự thay đổi ưu tiên của khách hàng, sự thay đổi số lượng phục vụ, v.v. Vì vậy, việc áp dụng các mô hình hàng chờ trong thực tế cần phải có sự điều chỉnh và bổ sung.

Ngay cả khi các giả thiết đơn giản nhất được chấp nhận, việc tính toán các chỉ số hiệu suất cũng rất phức tạp. Điều này đòi hỏi phải sử dụng các phương pháp tính toán phức tạp hoặc các phần mềm chuyên dụng. Hơn nữa, các mô hình hàng chờ thường chỉ mô tả được các hệ thống hàng chờ đơn giản, không thể mô tả được các hệ thống hàng chờ phức tạp như các hệ thống hàng chờ có ưu tiên, các hệ thống hàng chờ có sự thay đổi cấu trúc, v.v.

Do đó, việc áp dụng các mô hình hàng chờ trong thực tế cần phải có sự điều chỉnh và bổ sung. Việc sử dụng các mô hình hàng chờ để phân tích và thiết kế các hệ thống hàng chờ cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về các đặc điểm của hệ thống hàng chờ và các giả thiết của mô hình.

3.4. Áp dụng mô phỏng cho một số hệ thống hàng chờ

Ví dụ 1: Xét một hệ thống hàng chờ đơn giản có ba kênh phục vụ, mỗi kênh có một nhân viên phục vụ. Thời gian phục vụ của mỗi khách hàng tuân theo phân bố mũ với tham số $\mu = 5$, tức là hàm mật độ xác suất $f(t) = 5e^{-5t}$. Số lượng khách hàng đến hệ thống hàng chờ tuân theo phân bố mũ với tham số $\lambda = 15$. Giả sử rằng hệ thống hàng chờ ban đầu trống rỗng.

Cho biết: thời gian phục vụ của mỗi khách hàng tuân theo phân bố mũ với tham số $\mu = 5$, tức là hàm mật độ xác suất $f(t) = 5e^{-5t}$. Số lượng khách hàng đến hệ thống hàng chờ tuân theo phân bố mũ với tham số $\lambda = 15$. Giả sử rằng hệ thống hàng chờ ban đầu trống rỗng. Yêu cầu: tính các chỉ số hiệu suất của hệ thống hàng chờ.

Như vậy, chúng ta sẽ áp dụng mô hình hàng chờ đa kênh đơn nhân viên (MultiChannel – SingleServer System) theo quy tắc First in first out (FIFO: Thứ đến trước được phục vụ trước).

LJn tr- Φ c L $\hat{E}$ c ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$ xong tr- Φ c). Th $\hat{a}$ i gian gi $\hat{a}$ hai t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ li $\hat{u}$ n ti $\hat{p}$ c $\cdot$ ph $\hat{a}$ n ph $\hat{i}$ m $\hat{i}$ v $\hat{r}$ i h $\hat{m}$ m $\hat{d}$ L $\hat{r}$ x $\hat{s}$ c su $\hat{b}$ l $\hat{f}$ (t) = 5e $^{-5t}$. Trong b $\hat{i}$ i to $\hat{s}$ n n $\hat{y}$ (nh $\hat{a}$ n L $\hat{h}$ n gi $\hat{f}$ n c $\hat{s}$ c b $\hat{\Phi}$ c t $\hat{a}$ n to $\hat{s}$ n) th $\hat{a}$ i gian ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$ m $\hat{i}$ i t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ L $\hat{E}$ c coi l $\hat{r}$ kh $\hat{a}$ ng L $\hat{r}$ i v $\hat{r}$ b $\hat{a}$ ng 0,5 ph $\hat{a}$.

Ch $\hat{a}$ ng ta s $\hat{e}$ $\hat{s}$ p d $\hat{a}$ ng m $\hat{i}$ ph $\hat{a}$ ng L $\hat{W}$ x $\hat{s}$ c L $\hat{r}$ nh $\hat{s}$ $\hat{n}$ hu c $\hat{f}$ u trung b $\hat{a}$ nh c $\hat{f}$ n L $\hat{E}$ c ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$ trong kho $\hat{f}$ ng th $\hat{a}$ i gian 4 ph $\hat{a}$ nh $\hat{e}$ tr $\hat{a}$ n b $\hat{y}$ sau L $\hat{O}$ y.

K $\hat{a}$ hi $\hat{u}$ T $\hat{i}$ l $\hat{r}$ th $\hat{a}$ i Li $\hat{V}$ n LJn c $\hat{a}$ t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ th $\hat{a}$ i, T $\hat{k}$ l $\hat{r}$ th $\hat{a}$ i Li $\hat{V}$ n k $\hat{J}$ th $\hat{a}$ c d $\hat{c}$ h v $_{\infty}$ c $\hat{a}$ t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ th $\hat{a}$ i (n $\hat{J}$ u c $\hat{a}$), t $\hat{a}$ k $\hat{a}$ n $\hat{h}$ th $\hat{a}$ k (k = 1, 2, 3). Th $\hat{a}$ i Li $\hat{V}$ n LJn c $\hat{a}$ n $\hat{h}$ u c $\hat{f}$ u ti $\hat{p}$ theo l $\hat{r}$ T $\hat{i}$ = T $\hat{i}-1$ + τ $\hat{i}$ v $\hat{r}$ i τ tu $\hat{a}$ n theo lu $\hat{d}$ t ph $\hat{a}$ n ph $\hat{i}$ m $\hat{i}$ c $\hat{a}$ h $\hat{m}$ m $\hat{d}$ L $\hat{r}$ f(t) = 5e $^{-5t}$ v $\hat{r}$ h $\hat{m}$ ph $\hat{a}$ n ph $\hat{i}$ l $\hat{r}$ F(t) = 1 - e $^{-5t}$ = P(τ $\leq$ t).

L $\hat{a}$ c L $\hat{r}$ T $\hat{1}$ = 0, T $\hat{11}$ = T $\hat{1}$ + 0,5. K $\hat{J}$ qu $\hat{f}$ n $\hat{y}$ cho bi $\hat{J}$ th $\hat{a}$ i Li $\hat{V}$ n LJn c $\hat{a}$ t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ th $\hat{a}$ nh $\hat{a}$ l $\hat{r}$ T $\hat{1}$ = 0 v $\hat{r}$ L $\hat{E}$ c k $\hat{a}$ n $\hat{h}$ 1 ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$. K $\hat{J}$ th $\hat{a}$ c ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$ t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ l $\hat{r}$ th $\hat{a}$ i Li $\hat{V}$ n T $\hat{11}$ = T $\hat{1}$ + 0,5 = 0,5. M $\hat{s}$ y LJn ghi nh $\hat{a}$ n 1 L $\hat{h}$ n v $\hat{r}$ l $\hat{r}$ s $\hat{a}$ t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ L $\hat{a}$ L $\hat{E}$ c ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$.

n $\hat{a}$ W $\hat{a}$ m T $\hat{2}$ theo c $\hat{a}$ ng th $\hat{a}$ c T $\hat{2}$ = T $\hat{1}$ + τ $\hat{2}$, ta ph $\hat{s}$ t sinh τ $\hat{2}$ theo c $\hat{s}$ sch L $\hat{a}$ bi $\hat{J}$ $\hat{r}$ m $\hat{a}$ c 3.1.3: Tr- Φ c h $\hat{J}$, ph $\hat{s}$ t sinh s $\hat{a}$ ng $\hat{a}$ n $\hat{h}$ i n $\hat{r}$ r $\hat{2}$ c $\hat{a}$ 2 ch $\hat{a}$ s $\hat{a}$ sau d $\hat{b}$ u ph $\hat{x}$ y 0 $\leq$ r $\hat{i}$ $\leq$ 1 (theo b $\hat{f}$ ng s $\hat{a}$ ng $\hat{a}$ n $\hat{h}$ i n $\hat{r}$ i ph $_{\infty}$ l $\hat{a}$ c 2B) ta c $\hat{a}$ r $\hat{2}$ = 0,10. Sau L $\hat{r}$ t $\hat{a}$ n $\hat{h}$ τ $\hat{2}$ = - $\frac{1}{5}\ln r_2$ v $\hat{r}$ T $\hat{2}$ = T $\hat{1}$ - $\frac{1}{5}\ln r_2$ = 0 i

0,2ln0,1 = 0,46. V $\hat{a}$ y t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ ti $\hat{p}$ theo ph $\hat{f}$ i v $\hat{r}$ o k $\hat{a}$ n $\hat{h}$ 2 v $\hat{r}$ 3 k $\hat{a}$ n $\hat{h}$ 1 c $\hat{a}$ n L $\hat{a}$ ng b $\hat{a}$ n. M $\hat{s}$ y LJn ghi th $\hat{a}$ m 1 L $\hat{h}$ n v $\hat{r}$ th $\hat{a}$ i Li $\hat{V}$ n k $\hat{J}$ th $\hat{a}$ c ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$ t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ 2 l $\hat{r}$ T $\hat{22}$ = T $\hat{2}$ + 0,5 = 0,46 + 0,5 = 0,96.

Ti $\hat{p}$ t $\hat{a}$ c ph $\hat{s}$ t sinh r $\hat{3}$ = 0,09, ta c $\hat{a}$ τ $\hat{3}$ = -0,2ln 0,09 = 0,482. Do L $\hat{r}$ th $\hat{a}$ i Li $\hat{V}$ n LJn c $\hat{a}$ t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ 3 l $\hat{r}$ T $\hat{3}$ = T $\hat{2}$ + τ $\hat{3}$ = 0,46 + 0,482 = 0,942. L $\hat{a}$ c n $\hat{y}$ k $\hat{a}$ n $\hat{h}$ 1 L $\hat{a}$ L $\hat{E}$ c gi $\hat{f}$ i ph $\hat{a}$ ng do L $\hat{a}$ ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$ xong t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ 1, n $\hat{a}$ n t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ 3 L $\hat{E}$ c ti $\hat{p}$ nh $\hat{a}$ n v $\hat{r}$ o k $\hat{a}$ n $\hat{h}$ 1. T $\hat{a}$ th $\hat{a}$ i Li $\hat{V}$ n k $\hat{J}$ th $\hat{a}$ c ph $_{\infty}$ c v $_{\infty}$ t $\hat{a}$ n hi $\hat{u}$ 3 l $\hat{r}$ T $\hat{13}$ = T $\hat{3}$ + 0,5 = 0,942 + 0,5 = 1,442 m $\hat{s}$ y LJn l $\hat{a}$ ghi ti $\hat{p}$ 1 L $\hat{h}$ n v $\hat{r}$. Th $\hat{a}$ c hi $\hat{u}$ n t $\hat{a}$ n $\hat{h}$ to $\hat{s}$ n t $\hat{a}$ ng t $\hat{a}$, k $\hat{J}$ qu $\hat{f}$ t $\hat{a}$ ng h $\hat{a}$ p L $\hat{E}$ c ghi trong b $\hat{f}$ ng III.6.

Bảng III.6. Tính toán mô phỏng tìm số nhu cầu được phục vụ

Thứ tự tính	Số nhân	$-\ln r_i$	$\tau_i =$ $-1/5 \ln r_i$	Thứ tự Lịch	Thứ tự phân			Số nhân	
					1	2	3	nhân	b _i
1				0	0,5			1	
2	0,10	2,30	0,46	0,46		0,96		1	
3	0,09	2,44	0,482	0,942	1,442			1	
4	0,73	0,32	0,064	1,006		1,506		1	
5	0,25	1,39	0,278	1,284			1,784	1	
6	0,33	1,11	0,222	1,506	2,006			1	
7	0,76	0,27	0,054	1,560		2,060		1	
8	0,52	0,65	0,13	1,690					1
9	0,01	4,6	0,92	2,61	3,11			1	
10	0,35	1,05	0,21	2,82		3,32		1	
11	0,86	0,15	0,03	2,85			3,35	1	
12	0,34	1,08	0,216	3,066					1
13	0,67	0,40	0,08	3,146	3,646			1	
14	0,35	1,05	0,21	3,356		3,856		1	
15	0,48	0,73	0,146	3,502			4,022	1	
16	0,76	0,27	0,054	3,556					1
17	0,80	0,22	0,044	3,600					1
18	0,95	0,05	0,01	3,61					1
19	0,9	0,10	0,02	3,63					1
20	0,91	0,09	0,018	3,648	4,148			1	
21	0,17	1,77	0,354	4,002				1	
								14	6

Phân tích kết quả tính toán ta thấy trong 20 nhu cầu lịch thứ 14 nhu cầu lịch phân công. Tính toán tổng cộng 6 lịch nhân viên cần kết quả:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
14	15	14	12	13	15

Vậy số nhu cầu trung bình lịch phân công trong vòng 4 phút vào kho hàng

$$\bar{x} = (14 + 15 + 14 + 12 + 13 + 15)/6 = 13,83.$$

Giải bài toán dịch vụ ba kênh có từ chối trên máy tính

Một phòng máy tính với 6 nhân viên MOPHONG1 phiên bản 1.0 Lỗi lịch kết quả trên máy tính Builder C++ 5.0 Lỗi lịch bài toán mô phỏng lịch phân công cần tính

chỉ i nh-EL« tr³nh b"y trong v² d... 1 v, i c§c LiQ ki' n sau:

– S' k°nh ph, c v, n c· thWbý gi§ tr' t 2 t i 10.

– D, ng t²n hi' u Lªh l' d, ng Po§t-x¹ ng, th' i gian d«n c§ch gi\ a hai t²n hi' u li°n tiªp tu« theo ph«n ph' i m³ v, i h"m m³ L, x§c su³ l' f(t) = 5e^{-5t}.


– Th' i gian trung b³nh ph, c v, (x' l²) m, t t²n hi' u l' 0,5 ph¹.

– T²nh s' t²n hi' u L'c ph, c v, trong s' m t²n hi' u Lªh (m c· thWbý gi§ tr' t 10 t i 100).

– Th, c hi' n k lªh m¹ ph, ng (k lªh th' , k c· thWbý gi§ tr' t 4 t i 10).

M, c L²ch c, a vi' c x©y d, ng phªn mQn n"y nh³m v"o: ph, c v, dũy v" h' c m¹n M¹ ph, ng ngªu nhi°n, cªng nh-Elªp t, c nªng chª phi°n bªn 1.0 Lªh m¹ ph, ng L'c h' nhiQ k°nh ph, c v, – nhiQ lo³i d' ch v, c· t' ch' i trong tr-ªng h' p tªng qu§t khi d, ng t²n hi' u Lªh v" th' i gian ph, c v, t²n hi' u c· ph«n ph' i bª k³.

ª Wchũy phªn mQn MOPHONG1 chªng ta cªn c"i Lªh Builder C++ 5.0 v"o mªy t²nh. Sau khi k²ch chu t v"o biW tªng c, a phªn mQn, chèn File > Open Project > Look in > Mophong1 (Thư mục lưu trữ phần mềm) > Mp1.bpr. Sau L' chèn Run tr°n thành c¹ng c, Lªhũy phªn mQn (xem h³nh III.4).



Hình III.4. Chạy phần mềm MOPHONG 1

Chªng ta nhªp s' k°nh ph, c v, n = 3 v"o¹ s' (k°nh) d' ch v, , s' t²n hi' u phªt sinh m = 20 v"o¹ s' t²n hi' u, s' lªh m¹ ph, ng k = 6 v"o¹ s' lªh th' . Ngo"i ra ta phªi chèn hũy

mặt mà t số nguyên (L_1, l_1) nhằm khi i tở h m sinh số ngXn nhi n c phn ph i LQ trong $[0, 1)$, chng hñ s 123456 Lwghi v o h ã mfm ngXn nhi n, nhm t L m ph ng d, ng Pošt-x¹ ng csc tn hi u Lj. Sau L chng ta kch chu, t v o n⁴ Chay Lwchñy chng trnh.

KJ quĩ ta thñ t ng c ng s tn hi u Lj l 120, trong L c 83 tn hi u Lc c ph, c v (do L c 37 tn hi u b t chí i). Vdy trung bnh trong 20 tn hi u Lj c 13,833 tn hi u Lc c ph, c v. KJ quĩ n y so v i kJ quĩ tn nh tosn tr n giñy cho v² d tr n l kh sst nhau.

Chú ý: Vì c tn nh tosn d a v o bñng s ngXn nhi n cho trong ph, l c hoñ d a v o h m sinh s ngXn nhi n trong mñy tn nh kh ng cho kJ quĩ ho n to n gi ng nhau trong csc lñ chñy m ph ng khsc nhau. ñ iQ n y xly ra l v³ csc b, s ngXn nhi n tở Lc c kh ng gi ng nhau. V i csc hñ mfm khsc nhau th h m sinh s ngXn nhi n cñng cho csc b, s ngXn nhi n khsc nhau v do L csc kJ quĩ cú i cñng cñng kh ng trñng nhau. Mu n kJ quĩ m ph ng n L nh hñ cñn ch n s tn hi u Lj m L₁ l n.

Ngo i ra, chng ta c th Wñ n s k ònh ph, c v tu8ĩ, chng hñ n = 5. KJ quĩ chñy phñ mQn v i hñ mfm 123456 cho biñ trong s 20 tn hi u Lj trung bnh c 18,167 tn hi u Lc c ph, c v.

Ví dụ 2: M t cñng ti LiQ hñnh m t kho nguyên li u Lwchñ phñt cho csc L c cñng c a 10 phn xñng. Hi n tñ, hai nhñ vi n ph, c v Lang Lc c cñng ti giao cho nh m v cñ phñt nguyên li u. B phñn quĩ l cñng ti mu n cñ nhñ li u c n òn th m m t nhñ vi n ph, c v ñ a hay kh ng.

R rñng rñng s L c cñng (tn hi u cñn ph, c v) l h u hñ, phn ph i c, a s tn hi u Lj trong m t Lñ v th i gian cñng kh ng theo kiW Pošt-x¹ ng v th i gian ph, c v tn hi u cñng kh ng tu òn theo luñ phn ph i mñ. Do L, kh ng thW m ra Lc c l i giñ giñ tch thñng qua m t m hñnh nhñ k ònh ph, c v v i csc giñ thiñ nh vdy. Phng phñp ñduy nhñ l tñm cñch sp ñ ng m ph ng.

Số liệu thu thập được

– Quan sst trong v ng m t thñng v o csc ng y l m vi c, m i ng y m t gi v o csc th i Lñ nhñ ngXn nhi n, csc s li u vQ th i gian ph, c v m t tn hi u v tñ suñ tñng ng Lc c thu thp (bñng III.7).

– Tñnh th i gian ph, c v trung bnh cho m t tn hi u (tn nh k³ v ng):

$$8 \times 0,1 + 9 \times 0,2 + 10 \times 0,3 + 11 \times 0,4 = 10 \text{ (ph}^4\text{)}.$$

– Ngo i ra cñng Lc khñ sst Lc c: giñ cñch th i gian trung bnh gi a hai tn hi u li òn tiñp l 5 ph⁴ v s l cñng tn hi n trung bñh Lj trong m t khoñg 5 ph⁴ l m t tn hi u.

Bảng III.7. Thời gian phục vụ một tín hiệu và tần suất

Thời gian phục vụ một tín hiệu (ph⁴)	Số lần	Tần suất / Xác suất thực nghiệm
8	15	0,1
9	30	0,2
10	45	0,3
11	60	0,4
	$\Sigma = 150$	$\Sigma = 1$

Cần chú ý rằng, độ tin cậy của kết quả thu được theo phương pháp Poisson chỉ đúng khi thời gian phục vụ một tín hiệu ngắn nhất thì tuân theo phương pháp mẫu. Do đó, khi áp dụng để tính các tham số của mô hình 3.3 thì phải dùng một phương pháp quy định về độ chính xác bảo đảm của kết quả (nhận vào phạm vi) trong khoảng phát hiện nguy hiểm là phạm vi phát hiện. Nếu vậy thì phương pháp phân tích xác suất thống kê sẽ không đúng, sẽ không đúng trong thực tế xảy ra khi phân tích theo các phương pháp xác suất thống kê như hay theo các hình vẽ, v.v.

Mô phỏng hệ thống hàng chờ

– Một phương pháp tín hiệu Lữ: trung bình 5 phút có 1 tín hiệu Lữ. Chúng ta dùng 24 số ngẫu nhiên sau lấy ra từ bảng số ngẫu nhiên (phần 2A), lấy số gần 10 chữ số Lữ một phương pháp 24 khoảng 5 phút (nhận vào phạm vi 120 phút, lấy số dùng Lữ một phương pháp khoảng 5 phút từ 9h – 11h): 1581922396, 2068577984, 8262130892, 8374856049, 4637567488, 0928105582, 7295088579, 9586111652, 7055508767, 6472382984, 4112077556, 3440672486,..., 5973470495. Nếu chữ số 7 xuất hiện trong số 10 chữ số Lữ chọn, ta coi như 1 tín hiệu Lữ trong khoảng thời gian tương ứng (vì trung bình trong 5 phút có 1 tín hiệu Lữ cũng giống như trung bình trong một số có 10 chữ số có một chữ số 7). Chúng ta chỉ trong khoảng 5 phút Lữ khi không có tín hiệu u nào, khoảng 5 phút thì hai có 2 tín hiệu Lữ.

Ta thấy số tín hiệu Lữ chỉ có thể 0, 1, 2, 3, 4 tín hiệu u. Thì là Lữ Lữ có tín hiệu u trong một khoảng 5 phút Lữ quy định như sau theo số tín hiệu Lữ trong khoảng Lữ (bảng III.8). Chúng ta chỉ hai tín hiệu Lữ, thì thì là Lữ Lữ là vớ Lữ phút thì nhất và Lữ phút thì ba.

Bảng III.8. Quy định thời điểm đến của tín hiệu

Ph⁴	1	2	3	4	5
Nếu 1 tín hiệu Lữ	*				
Nếu 2 tín hiệu u	*		*		
Nếu 3 tín hiệu u	*		*		*
Nếu 4 tín hiệu u		*	*	*	*

– Một phương pháp thời gian phục vụ X một tín hiệu u: Ta một phương pháp phương pháp xác suất bảng III.7 theo cách Lữ bi. Trục hệ lấy ba số ngẫu nhiên có 10 chữ số: 9846413446,

8306646692, 0661684251 (hàng 4 t. d. ở i l°n, ph. l. c 2A). X = 8 ph^{1/4} nJi xuất hi' n ch
s' 0; X = 9 ph^{1/4} nJi xuất hi' n ch s' 1, 2; X = 10 ph^{1/4} nJi xuất hi' n ch s' 3, 4, 5; X = 11
ph^{1/4} nJi xuất hi' n ch s' 6, 7, 8 hoặc 9. Bảng III.9 t' ng h' p kJ quĩ m¹ ph' ng s' t' n hi' u
Lên và thời gian phục vụ các tín hiệu.


Bảng III. 9. Kết quả mô phỏng số tín hiệu đến và thời gian phục vụ tín hiệu

Chu k ³	S' ngX ¹ nhi°n 10 ch' s'										S' t' n hi' u L/Jh	Th' i gian ph' c v.
1	1	5	8	1	9	2	2	3	9	6	0	
2	2	0	6	8	5	7	7	9	8	4	2	11, 11
3	8	2	6	2	1	3	0	8	9	2	0	
4	8	3	7	4	8	5	6	0	4	9	1	10
5	4	6	3	7	5	6	7	4	8	8	2	11, 10
6	0	9	2	8	1	0	5	5	8	2	0	
7	7	2	9	5	0	8	8	5	7	9	2	9, 10
8	9	5	8	6	1	1	1	6	5	2	0	
9	7	0	5	5	5	0	8	7	6	7	3	10, 10, 11
10	6	4	7	2	3	8	2	9	3	4	1	11
11	4	1	1	2	0	7	7	5	5	6	2	10, 8
12	3	4	4	0	6	7	2	4	8	6	1	11
13	1	8	8	2	4	1	2	9	6	3	0	
14	0	6	8	4	0	1	2	0	0	6	0	
15	0	9	3	3	1	4	7	9	1	4	1	11
16	7	4	5	7	4	7	7	4	6	8	4	10, 11, 11, 11
17	5	4	3	5	8	8	0	7	8	8	1	9
18	9	6	7	0	8	5	2	9	1	3	1	8
19	1	2	9	1	2	6	5	7	3	0	1	11
20	4	8	9	0	0	3	1	3	0	5	0	
21	0	0	9	9	5	2	0	8	5	8	0	
22	3	0	9	0	9	0	8	8	7	2	1	11
23	2	0	3	9	5	9	3	1	8	1	0	
24	5	9	7	3	4	7	0	4	9	5	2	9,11

η Wti/Jh h' nh minh hoĩ quĩ tr' nh t' nh to' n m¹ ph' ng cho s' t' n hi' u L/Jh trong t' ng
kho' ng th' i gian 5 ph^{1/4} v' th' i gian ph' c v. m, i t' n hi' u, ch' ng ta quy' c c' s' c k² hi' u sau:

○ T²n hⁱ u L²J² Ch² ————— n² c ph² c v²

H³nh III.5 t² ng h² p kJ² qu² t²nh to²sn m² ph² ng cho h² t² ng ch² hai k² ònh ph² c v² i m² t² d² ch v².



ình III.5. Tổng hợp kết quả mô phỏng hệ thống chờ

Theo h³nh III.5 c² th² Wh²L², trong t² i gian 120 ph² c² 25 t²n h² u L²J² (25 s² 7 xu² h² i n² c²sc chu k² 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24). T² ng t² i gian L² i 213 ph², v² v²đy t² i gian L² i trung b²nh = $\frac{213}{25} = 8,52$ ph².

Ch²ng ta ph² t²ch I² ngh² kinh t²J² c² a t²nh to²sn m² ph² ng nh²Esau: M² h²nh h²ng ch² tr²on c² hai k²nh ph² c v² (hai nh² vi²on ph² c v²). Gi² s² r²ng l²Ch²ng 7\$/1 gi² /1 nh² vi²on ph² c v², l²Ch²ng c² a m² i L² c c²ng l² 12\$/1 gi² /1 L² c c²ng. Theo đ² k²i n² c² a b² i to²sn, t² i gian trung b²nh gi² a hai l²fn t²n h² u L²J² li²on ti²J² l² 5 ph². Nh²Ev²đy, trong trong 8 gi² c² 96 l²fn Li, v² ph² l² i 8,52 ph² m² i l²fn. Do L², t² ng hao h² t² / m² i ng² y l² m² vi² c do t² i gian L² c c²ng l²ng ph² do ph² l² i l²: $(8,52 \times 12\$ \times 96) / 60 = 163,56\$$. Ngo²i ra, t² ng chi l²Ch²ng / ng² y cho hai nh² vi²on ph² c v² l²: $7\$ \times 8 \times 2$ ng² c² i = 112\$. T² L², t² ng chi ph² / ng² y cho h² t² ng h²ng ch² tr²on l² \$ 275,56.

T²Ch²ng t², n²J² b² tr² ba k²nh ph² c v² (ba nh² vi²on ph² c v²) th² c² th²W²nh L² c t² i gian trung b²nh ch² L² i l² 1,88 ph² v² t² ng chi ph² cho h² t² ng ba k²nh l² 204\$. N²J² đ²ng b² n k²nh ph² c v² th² t² i gian ch² L² i trung b²nh l² 0 ph², t² ng chi ph² l² 224\$. V²đy

h' th' ng h' ng ch' tr' n n' n d' ng ba k' nh ph' c v' l' t' t nh' N' i c' sch kh' sc, ban LiQi h' nh c' ng ti n' n LiQi th' m' m' t nh' vi' n ph' c v' t' i l' m' vi' c t' kho c' ph' st nguy' n l' u nh' m' gi' m' b' t chi ph' h' h' i' o.

So sánh với lời giải lý thuyết

So sánh l' i gi' l' d' ng m' ph' ng v' i l' i gi' l' d' a tr' n l' thuy' m' h' nh h' ng ch' (l' c L' c' f' gi' s' r' ng: s' t' n h' u L' h' tu' theo lu' Po' st-x' ng, th' i gian ph' c v' m' t t' n h' u tu' theo ph' i m' l').

Khi tra ph' l' c 3 t' m P₀ d' a v' o t' s' A/(kS) v' i k = 3 l' s' k' nh ph' c v' , ta l' c

$$P_0 = 0,11435 \quad (A = 12, S = 6; A/(kS) = 0,66);$$

$$L_s = \frac{AS(A/S)^k}{(k-1)!(kS-A)^2} P_0 + \frac{A}{S} = 2,915; \quad L_q = L_s - \frac{A}{S} = 0,915;$$

$$W_q = \frac{L_q}{A} = 0,076 \quad (g') = 4,5 \text{ ph' } 4.$$

Trong khi L' theo k' qu' m' ph' ng th' th' i gian ch' trung b' nh l' 1,88 ph' 4. Tuy nhi' n, n' h' ch' m' ph' ng cho th' i gian d' i h' n (10 t' i 15 g') th' ng qua ch' ch' ng tr' n tr' n m' y t' nh th' c' k' qu' th' i gian ch' trung b' nh l' 2,63 ph' 4 t' ng L' i' n L' nh.

T' c' sc ph' i t' ch tr' n c' th' W' h' , trong c' sc t' nh h' ng ch' ng ta kh' ng x' l' l' c' sc LiQi ki' n t' o' n h' c' ph' c t' p' X' ch' a trong b' i t' o' n h' ng ch' , l' a ch' n duy nh' l' s' p d' ng m' ph' ng L' gi' b' i t' o' n.

Phần mềm mô phỏng hệ thống hàng chờ

Ph' n m' m' m' y t' nh v' i t' n g' i MOPHONG2 ph' n b' n 1.0 L' c l' c thi' k' d' a tr' n ng' n ng' Builder C++ 5.0 L' m' ph' ng h' th' ng h' ng ch' nh' c' tr' n b' y trong v' d' 2 v' i c' sc LiQi ki' n sau:

– S' k' nh ph' c v' n c' th' W' h' gi' s' t' t' 2 t' i 10.

– D, ng t' n h' u L' h' theo quy lu' c: c' trung b' nh 5 ph' 4 c' m' t t' n h' u L' h' , nh' ch' a bi' l' l' c' ph' i l' ph' i Po' st-x' ng hay kh' ng. Ngo' i ra, th' i l' m' L' h' c' a c' sc t' n h' u trong v' ng 5 ph' 4 đ' ng ch' a bi' l' r' , n' n ch' ng l' c m' ph' ng c' n c' b' ng III.8.

– Th' i gian ph' c v' (x' l') m' t t' n h' u tu' theo ph' i m' l' i r' c' L' c' bi' l' :

Th' i gian x' l' m' t t' n h' u (ph' 4)	8	9	10	11
X' s' su' l' i	0,1	0,2	0,3	0,4


– Kho' ng th' i gian m' ph' ng c' th' W' h' n k' chu k' , m' i chu k' 5 ph' 4 (k c' th' W' h' n gi' s' t' 12, 24, 32, 48, é)

– C' f' n t' nh th' i gian ch' trung b' nh (ph' 4) cho m' i t' n h' u Li L' h' h' th' ng d' ch v' tr' n L' y.

Mục đích của việc xây dựng phần mềm này là để phục vụ việc hình thành và phát triển các mô hình mạng xã hội, cũng như nghiên cứu các đặc điểm của mạng xã hội. Phần mềm được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau đây: - Nguyên tắc đầu tiên là tính đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng. - Nguyên tắc thứ hai là tính chính xác và độ tin cậy cao. - Nguyên tắc thứ ba là tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

Để thực hiện phần mềm MOPHONG2, cần phải có các công cụ hỗ trợ như: Visual Basic 6.0 và Microsoft Access. Sau khi đã cài đặt xong các công cụ này, ta tiến hành xây dựng phần mềm theo các bước sau đây: 1. Khởi động Visual Basic 6.0 và tạo một dự án mới. 2. Thiết kế giao diện người dùng. 3. Viết mã nguồn chương trình.

Chúng ta nhập số khởi đầu là 3 (số khởi đầu) để phục vụ việc hình thành và phát triển các mô hình mạng xã hội. Ngoài ra, ta phải chú ý đến các đặc điểm của mạng xã hội như: tính đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng. Sau khi đã hoàn thành các bước trên, ta tiến hành chạy thử phần mềm.




Hình III.6. Chạy phần mềm MOPHONG2

Kết quả của việc mô phỏng cho thấy: 27 tín hiệu đã được xử lý, tổng thời gian chờ là 288 phút, trung bình mỗi tín hiệu chờ là 10,667 phút. Kết quả này so với kết quả tính toán trên giấy sẽ được trình bày ở chương 4 (phần 4.2) để so sánh.

Cần nhớ rằng việc tính toán dựa vào các mô hình mạng xã hội cho trong phần 4.2 và việc hình thành và phát triển các mô hình mạng xã hội trong thực tế không cho kết quả hoàn toàn giống nhau do các đặc điểm của mạng xã hội khác nhau. Vì vậy, cần phải có các mô hình khác nhau để hình thành và phát triển các mô hình mạng xã hội.

số ngXu nhi°n cầ ng cho c§c b, số ngXu nhi°n kh§c nhau v" do L' c§c kJ quĩ cú i c¹ng cầ ng kh¹ ng tr¹ng nhau. Ch³ng h¹n, nJm thay h¹ mfm 345678 (cho kJ quĩ th³ i gian ch³ trung b³nh 10,667 ph¹) b³ng h¹ mfm 456789 th³ th³ i gian ch³ trung b³nh sE ch³ l" 4,158 ph¹. Njm l³y trung b³nh c, a hai kJ quĩ n³y th³ L' c con số s§t h³n v, i kJ quĩ t²nh to§n L' biJ d, a tr°n ph, l, c 2A.

T' c§c ph©n t²ch tr°n ta th³y, mu' n kJ quĩ m¹ ph, ng" n L' nh h³n c³h ch³ n s' chu k³ m¹ ph, ng m L' l, n v" ch³y cho nhiQ h¹ mfm kh§c nhau L'W²nh gi§ tr³ trung b³nh c, a kJ quĩ c§c l³h ch³y L'. V³m EQn³y th³ c ch³ l" v³m EQ**bổ trí thí nghiệm mô phỏng** tr°n m³y t²nh, cầ ng l" m, t h-C ng trong nghi°n c, u vQm¹ ph, ng ngXu nhi°n hi³ n nay L'ang L' c tiJh h³nh trong nhiQ l³nh v, c.



Chương IV

PHÂN TÍCH MARKOV VÀ ỨNG DỤNG

1. Các khái niệm cơ bản về xích Markov

1.1. Một số định nghĩa

Nhiệm vụ chính của môn học trong Văn hóa và Kinh tế Kỹ thuật, Đặc biệt là, Di truyền học, ... dựa trên các quá trình Markov. Hệ thống, hiện tại, là một lĩnh vực mới và Tin - Sinh học (Bioinformatics) chuyên nghiên cứu về gene, ... các quá trình Markov. Trong ngành Chẩn đoán hiện nay, nhiệm vụ chuyên gia là suy luận về các hình thức liên quan đến các quá trình Markov nói chung, công nghệ, ... quá trình sinh-tử hay quá trình hồi phục năng lượng.

Ví dụ: Xét một hệ thống vật lý theo thời gian. Thời điểm $t = 0$, hệ thống có thể hiện một trong ba trạng thái (hay vị trí) 1, 2 hoặc 3 một cách ngẫu nhiên. Khi biết $X(0)$ là vị trí của hệ thống tại thời điểm $t = 0$, thì $X(0)$ là một biến ngẫu nhiên, có thể nhận các giá trị 1 hoặc 2 hoặc 3 và các xác suất như sau. Giả sử rằng cần vẽ các kết quả quan sát hay nghiên cứu, chúng ta có bảng phân phối xác suất sau cho $X(0)$:

Các giá trị của $X(0)$	1	2	3
Xác suất tương ứng	0,2	0,5	0,3

Tại các thời điểm tiếp theo, chúng ta, $t = 1, 2, 3$, ... vị trí của hệ thống sẽ là các biến ngẫu nhiên $X(1), X(2), X(3)$, ... và các bảng phân phối xác suất tương ứng. Dựa trên dãy này, chúng ta có thể nhận được sau quá trình ngẫu nhiên.

Định nghĩa 1

Xét một hệ thống vật lý (hay một hệ thống sinh học, hệ thống dịch vụ, ...) theo thời gian. Gọi $X(t)$ là vị trí (trạng thái) của hệ thống tại thời điểm t . Như vậy, nếu vị trí tại thời điểm t , $X(t)$ chính là một biến ngẫu nhiên mà tại vị trí (trạng thái) của hệ thống. Quá trình $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ là các giá trị mà quá trình ngẫu nhiên.

Tập hợp các vị trí có thể có của hệ thống là không gian trạng thái. Khi không gian trạng thái là các kết quả của S . Trong ví dụ trên, nếu giả sử rằng $X(t)$ có thể nhận một trong ba giá trị 1, 2, 3 $\forall t$, thì $S = \{1, 2, 3\}$.

Giả sử tập các thời điểm s, h là các trạng thái liên tiếp, và tại thời điểm s, h là các trạng thái liên tiếp. Chúng ta muốn tính xác suất để tại thời điểm t ($t > s$), hệ thống ở trạng thái j . Nếu xác suất này chỉ phụ thuộc vào bố trí (s, i, t, j) , tức là $P[X(t) = j | X(s) = i] = p(s, i, t, j)$ là đúng $\forall i, \forall j, \forall s, \forall t$ thì ta có nghĩa là, sự tiến triển của hệ thống lại chỉ phụ thuộc

vô hướng (tính trung của hướng thì là 0), và hơn nữa nó là một quá trình (tính không nhớ). Một chuỗi là *tính Markov*. Một quá trình ngẫu nhiên $X(t)$ là một quá trình Markov.

Trong ví dụ trên $P[X(1) = 2 | X(0) = 1]$ là xác suất để LiQuin đi đến X(1) = 2 (tức là LiQuin đi đến trạng thái 2) và LiQuin đi đến X(0) = 1 (tức là LiQuin đi đến trạng thái 1). Một quá trình ngẫu nhiên có tính Markov thì xác suất này chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hướng thì là 0 và hơn nữa nó là một quá trình trung của hướng thì là 0.

Định nghĩa 2

Một quá trình ngẫu nhiên S gọi là một chuỗi Markov nếu và chỉ nếu là một quá trình Markov thì quá trình Markov $X(t)$ là một chuỗi Markov. Một quá trình Markov là một quá trình Markov nếu và chỉ nếu là một quá trình Markov. Một quá trình Markov là một quá trình Markov nếu và chỉ nếu là một quá trình Markov.

Định nghĩa 3

Một quá trình Markov. Một quá trình Markov chuyển trạng thái $p(s, i, t, j) = p(s+h, i, t+h, j)$ với $\forall j, \forall s, \forall t$ và $\forall h > 0$, thì ta nói rằng quá trình Markov *thuận nhất theo thời gian*.

Ở đây là một khái niệm mà sẽ dễ dàng hiểu ngay sau đây trong mục 1.2. Ngoài ra và trong mục 1.2 và 1.3 chúng ta sẽ xem xét quá trình Markov và thu được những kết quả theo thời gian. Ví dụ quá trình Markov liên tục sẽ dễ dàng xem xét trong mục 2.4 và 2.5.

1.2. Ma trận xác suất chuyển trạng thái và phân phối dừng

Trong mục này chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm quá trình Markov và quá trình Markov liên tục. Trong trường hợp quá trình Markov liên tục và quá trình Markov liên tục. Trong trường hợp quá trình Markov liên tục và quá trình Markov liên tục.

Ví dụ: Xét ví dụ 2.1. Trong mục 1.1, chúng ta đã xem xét một khách hàng trong một cửa hàng. Trong một khu phố 1000 đơn vị (khách hàng) có 3 siêu thị là A, B, và C (A, B, C là các cửa hàng 1, 2, 3 của hướng siêu thị này). Giả sử rằng, trong một tháng một khách hàng mua một sản phẩm và một siêu thị. Ngoài ra, cũng giả sử rằng trong tháng tiếp theo khách hàng sẽ mua một sản phẩm và một siêu thị. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng một khách hàng mua một sản phẩm và một siêu thị. Một khách hàng mua một sản phẩm và một siêu thị. Một khách hàng mua một sản phẩm và một siêu thị.

Các giá trị của $X(0)$	1	2	3
Xác suất chuyển trạng thái	0,2	0,5	0,3

K² hi' u $P[X(0) = 1] = \pi_1^{(0)}$, $P[X(0) = 2] = \pi_2^{(0)}$, $P[X(0) = 3] = \pi_3^{(0)}$, th³ v@ th $\Pi^{(0)} = [\pi_1^{(0)}, \pi_2^{(0)}, \pi_3^{(0)}] = [0,2 \ 0,5 \ 0,3]$ L'Ể c g' i l' véc tơ phân phối xác suất tại thời điểm $t = 0$ hay véc tơ phân phối ban đầu. C§c th'nh phñ c, a $\Pi^{(0)}$ cho bi'J t' l' phñ trŁm (%) kh§ch h'ng v' o c§c si' u th' A, B v' C.

Nh' ng th§ng sau, ta gi' s' x§c su' l' LWm, t ng'Ể i kh§ch, L« v' o mua h'ng' si' u th' A th§ng tr' c, v' o l' A trong th§ng sau lu' n l' 0,8; chuy' sang mua h'ng' B lu' n l' 0,1 v' chuy' sang C lu' n l' 0,1. X§c su' l' LWm, t ng'Ể i kh§ch, L« v' o mua h'ng' si' u th' B th§ng tr' c chuy' sang A lu' n l' 0,07; v' o l' B lu' n l' 0,9 v' chuy' sang C lu' n l' 0,03. C, n x§c su' l' LWm, t ng'Ể i kh§ch, L« v' o si' u th' C th§ng tr' c chuy' sang A lu' n l' 0,083; chuy' sang B lu' n l' 0,067 v' v' o l' C lu' n l' 0,85. L' c§c x§c su' l' chuy' c, a kh§ch h'ng L'Ể c cho th' ng qua ma trận xác suất chuyển trạng thái P (c, n g' i l' ma trận chuyển sau m, t b' c).

$$P = \begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,07 & 0,9 & 0,03 \\ 0,083 & 0,067 & 0,85 \end{bmatrix} = [p_{ij}]_{3 \times 3}.$$

n Wm¹ t' t³nh tr'ng phñ chia th' phñ trong th§ng t ($t = 1, 2, 3, \dots$) c, a h' th' ng si' u th' tr' n, c' th'hi' l'p bi'J ng' nh' n' X(t) v, i quy t'c t'ng t' nh' khi thi' l'p X(0); n'J kh§ch h'ng mua h'ng' si' u th' A th³ L' H' X(t) = 1, si' u th' B th³ L' H' X(t) = 2, c, n' si' u th' C th³ X(t) = 3. V' l' QLH ra l' X(t) c' b'ng phñ ph' i x§c su' l' nh' th'J n' o.

Tr' c h'J ta l' t' m b'ng phñ ph' i x§c su' l' cho X(1). X@ $p_{12} = P[X(1) = 2/X(0) = 1] = 0,1$ l' x§c su' l' LWm, t ng'Ể i kh§ch, L« v' o mua h'ng' si' u th' A th§ng 0 chuy' sang mua h'ng' si' u th' B trong th§ng 1. Ngo' i ra, $P[X(t+1) = 2/X(t) = 1] = 0,1 \quad \forall t$ l' s' t' nh' n', v³ theo gi' thi'J c, a b' i to' n th³ x§c su' l' LWm, t ng'Ể i kh§ch, L« v' o mua h'ng' si' u th' A th§ng tr' c chuy' sang mua h'ng' B lu' n l' 0,1. V' dy p_{12} L'Ể c g' i l' x'ác suất chuyển sau một bước t' v' tr² 1 sang v' tr² 2, b' i v' dy c' th' v' ng k² hi' u $p_{12}^{(1)}$ L' Wch' r» L' c' l' x§c su' l' chuy' sau m, t b' c. C§c phñ t' $p_{ij} \quad \forall i = 1, 2, 3 \text{ v' } \forall j = 1, 2, 3$ c, a ma trận P c' l' ng' t' t'ng t'.

D, th' r'ng trong th§ng 1 s' kh§ch h'ng mua h'ng t' si' u th' A l' $200 \times 0,8 + 500 \times 0,07 + 300 \times 0,083 = 219,9 (\approx 220)$; s' kh§ch h'ng mua h'ng t' si' u th' B l' $200 \times 0,1 + 500 \times 0,9 + 300 \times 0,067 = 490,1 (\approx 490)$; c, n s' kh§ch h'ng mua h'ng t' si' u th' C s' l' $200 \times 0,1 + 500 \times 0,03 + 300 \times 0,85 = 290$. Do t' ng s' kh§ch h'ng l' 1000, n' n X(1) c' b'ng phñ ph' i x§c su' l' sau:

C§c gi' tr' c, a X(1)	1	2	3
X§c su' l' t'ng ng	0,2199	0,4901	0,2900

V' dy v@ th phñ ph' i x§c su' l' t' th' i l' Wm t = 1 l' $\Pi^{(1)} = [\pi_1^{(1)}, \pi_2^{(1)}, \pi_3^{(1)}]$ cho bi'J t' l' phñ trŁm kh§ch h'ng v' o c§c si' u th' A, B v' C trong th§ng 1. B'ng phñ t'nh ma trận c'ng t' m L'Ể c $\Pi^{(1)}$ nh' c sau:

$$\begin{aligned}\Pi^{(1)} &= \Pi^{(0)} \times P = [0,2 \ 0,5 \ 0,3] \times \begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,07 & 0,9 & 0,03 \\ 0,083 & 0,067 & 0,85 \end{bmatrix} \\ &= [0,2199 \ 0,4901 \ 0,2900].\end{aligned}$$

Tổng t, c. thW³m L⁰c Π⁽²⁾:

$$\begin{aligned}\Pi^{(2)} &= \Pi^{(1)} \times P = [0,2199 \ 0,4901 \ 0,2900] \times \begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,07 & 0,9 & 0,03 \\ 0,083 & 0,067 & 0,85 \end{bmatrix} \\ &= [0,234297 \ 0,48251 \ 0,283193].\end{aligned}$$

Sau L⁰y ta L¹t³m ma trđn xđc suđi chuyW trđng thđi sau hai b⁰c. K² hi' u p₁₂⁽²⁾ l' xđc suđi chuyW t⁰ v' tr² 1 sang v' tr² 2 sau hai b⁰c. Theo c¹ng th⁰c xđc suđi to⁰n phđn ta c⁰:

$$\begin{aligned}p_{12}^{(2)} &= P[X(2)=2 / X(0)=1] = P[X(1)=1 / X(0)=1] \times P[X(2)=2 / X(1)=1] \\ &\quad + P[X(1)=2 / X(0)=1] \times P[X(2)=2 / X(1)=2] \\ &\quad + P[X(1)=3 / X(0)=1] \times P[X(2)=2 / X(1)=3] \\ &= p_{11}^{(1)}p_{12}^{(1)} + p_{12}^{(1)}p_{22}^{(1)} + p_{13}^{(1)}p_{32}^{(1)} \\ &= \sum_{k=1}^3 p_{1k}^{(1)}p_{k2}^{(1)} = 0,8 \times 0,1 + 0,1 \times 0,9 + 0,1 \times 0,067 = 0,1767.\end{aligned}$$

M⁰t cđch ho⁰n to⁰n tđng t⁰, ta c⁰ xđc suđi chuyW t⁰ v' tr² i sang v' tr² j sau hai b⁰c l' p_{ij}⁽²⁾ = p_{i1}⁽¹⁾p_{1j}⁽¹⁾ + p_{i2}⁽¹⁾p_{2j}⁽¹⁾ + p_{i3}⁽¹⁾p_{3j}⁽¹⁾ = $\sum_{k=1}^3 p_{ik}^{(1)}p_{kj}^{(1)}$. Vđy ta c⁰ ma trđn chuyW sau hai b⁰c l':

$$\begin{aligned}P^{(2)} &= [p_{ij}^{(2)}]_{3 \times 3} = P^{(1)} \times P^{(1)} = P \times P = P^2 \\ &= \begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,07 & 0,9 & 0,03 \\ 0,083 & 0,067 & 0,85 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,07 & 0,9 & 0,03 \\ 0,083 & 0,067 & 0,85 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

D⁰ thđy Π⁽²⁾ = Π⁽¹⁾ × P = Π⁽⁰⁾ × P². Tđng t⁰, c⁰ thWđh ng minh L⁰c Π^(n+m) = Π⁽ⁿ⁾ × P^(m), trong L⁰ Π^(n+m) v' Π⁽ⁿ⁾ l' cđc vđc thphđn ph' i tđi cđc th⁰i L⁰W t = m + n v' t = n, c, n P^(m) l' ma trđn xđc suđi chuyW trđng thđi sau m b⁰c.

Do P^(m) = [p_{ij}^(m)]_{3×3} nđn P[X(m) = j / X(0) = i] = P[X(n + m) = j / X(n) = i] = P[X(nđ + mđ) = j / X(nđ) = i] = p_{ij}^(m), l' xđc suđi chuyW t⁰ v' tr² i sang v' tr² j sau m b⁰c. n Hđn = s,

Bảng IV.1. Tỷ lệ phần trăm khách hàng vào các siêu thị

Tháng	A	B	C
1	0.2199	0.4901	0.29
2	0.234297	0.4825 1	0.283193
3	0.2447183	0.476662631	0.27861905
4	0.2522664	0.472135676	0.2755979
5	0.2577373	0.46861381	0.27364893
6	0.2617056	0.465860633	0.27243373
7	0.2645868	0.463698194	0.27171505
8	0.2666806	0.461991958	0.27132742
9	0.2682041	0.460639762	0.2711 5613
10	0.269314	0.459563657	0.27112231
11	0.2701238	0.45870389	0.27117228
12	0.2707156	0.458014426	0.27126994
13	0.2711489	0.457459633	0.27139144
14	0.2714668	0.457011789	0.27152141
15	0.2717005	0.456649225	0.27165023
16	0.2718729	0.456354922	0.271 77223
17	0.2720002	0.456115454	0.27188433
18	0.2720947	0.455920181	0.27198516
19	0.2721649	0.455760634	0.27207446
20	0.2722173	0.45563005	0.2721526
21	0.2722566	0.455523004	0.27222035

Định nghĩa 2

Xét xích Markov r i r $\in$ v $\in$ thu $\in$ nh $\in$ v $\in$ i ma tr $\in$ chuy $\in$ $P = [p_{ij}]_{N \times N}$. L $\in$ c $\in$ L $\in$, v $\in$ th $\in$ ph $\in$ n $\in$ ph $\in$ i x $\in$ s $\in$ s $\in$ $\Pi = [\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N]$ th $\in$ a m $\in$ n $\in$ L $\in$ Q $\in$ k $\in$ i $\in$ n $\in$ $\Pi \times (I - P) = 0$ L $\in$ c $\in$ g $\in$ i $\in$ *ph $\in$ n $\in$ ph $\in$ i d $\in$ i $\in$ c $\in$ a x $\in$ ch Markov L $\in$ c $\in$ cho.*

C $\in$ th $\in$ W $\in$ h $\in$ B $\in$ ngay, ph $\in$ n $\in$ ph $\in$ i d $\in$ ng $\in$ Π kh $\in$ i $\in$ ng $\in$ ph $\in$ thu $\in$ c $\in$ v $\in$ o $\in$ $\Pi^{(0)}$ m $\in$ ch $\in$ ph $\in$ thu $\in$ c $\in$ v $\in$ o $\in$ ma tr $\in$ P.

M $\in$ t $\in$ c $\in$ s $\in$ ch $\in$ to $\in$ s $\in$ n $\in$ h $\in$ c $\in$, ta n $\in$ i $\in$ *m $\in$ o $\in$ h $\in$ i $\in$ n $\in$ h $\in$ x $\in$ i $\in$ ch Markov r $\in$ o $\in$ i $\in$ r $\in$ a $\in$ c $\in$ thu $\in$ n $\in$ h $\in$ t $\in$ ch $\in$ nh $\in$ l $\in$ b $\in$ ba* $(X(t_n), S/\Pi, P)$. C $\in$ p $\in$ d $\in$ ng $\in$ m $\in$ i $\in$ h $\in$ s $\in$ nh $\in$ x $\in$ i $\in$ ch Markov L $\in$ W $\in$ ph $\in$ n $\in$ t $\in$ ch $\in$ m $\in$ t $\in$ v $\in$ h $\in$ L $\in$ Q $\in$ n $\in$ o $\in$ L $\in$ trong Kinh t $\in$ J $\in$ K $\in$ o $\in$ th $\in$ u $\in$ d $\in$ t $\in$, Sinh h $\in$ c $\in$,... L $\in$ c $\in$ coi l $\in$ v $\in$ i $\in$ c $\in$ *u $\in$ n $\in$ g $\in$ d $\in$ u $\in$ n $\in$ g $\in$ ph $\in$ n $\in$ t $\in$ i $\in$ ch Markov.*

1.3.Các tính chất và định lý

Xét xích Markov r i r $\in$ c $\in$ v $\in$ thu $\in$ nh $\in$ v $\in$ i ma tr $\in$ chuy $\in$ $P = [p_{ij}]_{N \times N}$. C $\in$ th $\in$ W $\in$ ch $\in$ ng $\in$ minh L $\in$ c $\in$ c $\in$ s $\in$ c $\in$ t $\in$ nh $\in$ ch $\in$ i $\in$ v $\in$ L $\in$ nh l $\in$ s $\in$ sau:

Các tính chất

1/ $p^{(n+m)}_{ij} = \sum_{k=1}^N p^{(n)}_{ik} p^{(m)}_{kj}$ (Lý lẽ: phép cộng tr³nh Chapman–Kolmogorov).

2/ $P^{(2)} = P \times P = P^2$, $P^{(n)} = P^n$ v³ $P^{(n+m)} = P^{(n)} \times P^{(m)}$.

3/ $\Pi^{(n+m)} = \Pi^{(n)} \times P^{(m)}$.

Định lý

1/ Giả s³ P l³ ma trận xác suất chuyển ch²nh quy, t³ c³ t³ n t³ ch³ s³ n_0 , sao cho $\forall i, j$, th³ xác suất chuyển t³ i l³ j sau n_0 b³c l³ m³ t³ s³ d³ng: $p^{(n_0)}_{ij} > 0$. Khi L³ t³ n t³ $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N > 0$, v³ $\pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_N = 1$ L³cho $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{(n)}_{ij} = \pi_j$, kh³ ng ph³ thu³ c v³o i.

C³c s³ $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N$ L³ c³ t³m t³ h³ ph³ng tr³nh

$$x_j = \sum_{k=1}^N x_k p_{kj}, j=1, 2, \dots, N; x_j \geq 0 \forall j \text{ v³ } \sum_{j=1}^N x_j = 1.$$

2/ N³u c³ c³c s³ $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N$ tho³ m³n L³Q³ ki³ n $\pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_N = 1$ v³ $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{(n)}_{ij} = \pi_j$, kh³ ng ph³ thu³ c v³o i, th³ ma trận P l³ ma trận ch²nh quy.

Lưu ý

Ph³n ph³ i ($\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N$) tho³ m³n L³Q³ ki³ n $\pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_N = 1$ v³ $\lim_{n \rightarrow \infty} p^{(n)}_{ij} = \pi_j$, kh³ ng ph³ thu³ c v³o i, L³ c³ g³ i³ ph³n ph³ i g³ i h³h³. Ngo³i ra, n³u L³Q³ ki³ n $\pi_j > 0, \forall j$ L³ c³ th³ a m³n th³ ph³n ph³ i n³y L³ c³ g³ i³ *ph³n ph³i Ergodic*. C³ th³ch³ ng minh L³ c³ r³ng, n³u ph³n ph³ i g³ i h³h³ t³ n t³ th³ L³ l³ ph³n ph³ i đ³ng (đuy nh³). Tuy nhi³n, L³Q³ ng³ c³ l³ kh³ ng lu³ n L³ng.

2. Một số ứng dụng của phân tích Markov

Ph³n t³ch Markov c³ nhi³u ³ng d³ng trong Kinh t³j K³thuat³, Sinh h³c, X³ h³ i³ h³c, C³ng ngh³ th³ng tin,³ Trong m³ c³ n³y, ch³ng ta s³ xem x³ c³c ³ng d³ng nh³t³m c³ b³ng th³ ph³n, xác L³nh ch²nh s³ch thay th³v³t t³th³j b³, đ³ b³o th³ thu³ cho c³c h³p L³ng th³ c³ h³n tr³c³, t³m ph³n ph³ i g³ i h³h³ c³ a m³ t³ th³ng k³thuat³ v³ m³ t³ng d³ng c³ a qu³ tr³nh sinh – t³ cho h³ th³ng h³ng ch³.

2.1. Tìm cân bằng thị phần

Ta nh³c l³ m³ t³ c³ch v³n t³ b³i to³n cho³ m³ c³ 1.2: Trong m³ t³ khu ph³ 1000 d³ (kh³ch h³ng) c³ 3 si³u th³ l³ A, B, v³ C. Gi³ s³, trong th³ng L³u, s³ kh³ch v³o c³c si³u th³ l³n l³ t³ 200, 500 v³ 300. Nh³ng th³ng sau L³, ta gi³ s³ xác suất L³W m³ t³ kh³ch h³ng (L³ v³o si³u th³ A l³c tr³c³) v³o l³ A lu³ n l³ 0,8; chuyển W³ sang B lu³ n l³ 0,1 v³ chuyển W³ sang C lu³ n l³ 0,1... C³c xác suất chuyển kh³c³ a kh³ch h³ng ("tr³ l³ B, chuyển W³ sang A, chuyển W³ sang C...) L³ c³ cho th³ng qua ma trận chuyển W³ P

$$P = \begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,07 & 0,9 & 0,03 \\ 0,083 & 0,067 & 0,85 \end{bmatrix}$$

Lúc đó, theo quy tắc biễu, ta sẽ phân tích các biến động (khi thị trường biến động) sẽ khác nhau về cơ cấu của A, B, C là 27,3%, 45,4% và 27,3% của tổng biến động là $\Pi \times (I - P) = 0$.

2.2. Chính sách thay thế vật tư thiết bị

Trong một hệ thống sản xuất, các thiết bị có cùng một loại sẽ phân ra các tình trạng sau đây: và a) thay, c) nếm, và d) hỏng hóc và l" bị hỏng. Theo số liệu thống kê về các, ta có ma trận xác suất chuyển trạng thái như sau:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0,6 & 0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0,5 \\ 1,0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

trong đó, sau một tuần (xem hàng đầu của ma trận P) có 0%, 80%, 20% và 0% số các thiết bị bị thay, hỏng, nếm, và hỏng hóc và l" bị hỏng. Các hàng khác của ma trận P là các giá trị chuyển trạng thái. Ta sẽ tìm phân phối dừng Π bằng phương pháp biểu diễn.

Xuất phát từ $\Pi^{(n+1)} = \Pi^{(n)} \times P$, cho qua giới hạn của hai vế khi $n \rightarrow \infty$ ta có: $\Pi = \Pi \times P$, hay $\Pi \times (I - P) = 0$.

Do P là ma trận khả nghịch (ma trận chuyển xác suất) nên ta có thể suy ra biểu thức. Khi viết lại dưới dạng hệ phương trình (4 biến, 4 phương trình) ta phải loại bỏ một phương trình nào đó, và thông thường thì các $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1$ và ràng buộc, các $\pi_k \geq 0$ ($k = 1, 2, 3, 4$). Khi đó nếu $x_1 = \pi_1, x_2 = \pi_2, x_3 = \pi_3$ và $x_4 = \pi_4$ ta sẽ có hệ:

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = 0 \\ -0,8x_1 + 0,4x_2 = 0 \\ -0,2x_1 - 0,4x_2 + 0,5x_3 = 0 \\ -0,5x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_4 = \frac{1}{6} \\ x_2 = x_3 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Vậy phân phối dừng $\Pi = [1/6 \ 1/3 \ 1/3 \ 1/6]$.

Giá trị trung bình thay một thiết bị là 25 ngày (ngày) và thu được khi một thiết bị hỏng là 18,5 ngày, thì một tuần hệ thống phải chi trung bình trên một thiết bị số tiền là: $(1/6) \times 25 + (1/6) \times 18,5 = 7,25$ ngày / thiết bị / tuần.

Ta có phương trình hai cho ví dụ thay thế thiết bị và ma trận xác suất chuyển trạng thái sau đây:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0,8 & 0,2 \\ 0 & 0,6 & 0,4 \\ 1,0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ma trận n'y t^hng v, i ch²nh s³sch m_i i vQthay th³Jv³t t³thi³J b' l': thay th³Jm_i i thi³J b' m_i t khi ki³W tra v' ph³st hi' n thi³J b' t³nh tr³h³g v³X d³ng L³É c. n³iQ n'y c' thW d³X t³ i vi' c gi³lm thiW th³th³ thu do thi³J b' h³ ng g³ n³. Th³đ v³đy, _ ng v, i ma trận P tr³o L³Q, ph³ ph' i d³ ng $\Pi = [1/4 \quad 1/2 \quad 1/4]$. L³ c n'y, m_i i tu³fn h' th' ng tr³o ph³l chi trung b³nh tr³o m_i t thi³J b' s' ti³Q l': $(1/4) \times 25 + (0) \times 18,5 = 6,25$ ngh³n / thi³J b' / tu³fn. Nh³ v³đy h' th' ng s³É ti³J ki' m L³É c 1 ngh³n / thi³J b' / m_i t tu³fn. N³Ju h' th' ng c' 2000 thi³J b', th³ nh³ ch²nh s³sch thay th³Jv³t t³Em_i i, m_i i tu³fn h' th' ng s³É ti³J ki' m L³É c 2 tr³i u (L³ ng).

2.3. Phân tích Markov trong dự báo thất thu cho các hợp đồng thực hiện trước

M, t c¹ ng ti kinh doanh trong ng ãnh Li¹ n chuy^on vQs¹ a ch¹ a v¹ thay thJph¹, t¹ng LQ ra ch²nh sSch t²n d¹, ng: LSp¹ ng y^ou cFu¹ c, a khSch h¹ng tr¹ c, thanh toSn sau. PhFn nhiQi h¹ p L¹ng sE L¹ c thanh toSn L¹ng th¹ i h¹h¹, m, t t¹ l¹ nhLi¹ L¹nh sE L¹ c c¹ ng ti cho thanh toSn chdm¹, c, n m, t s¹ 2t kh¹ ng thanh toSn L¹ c. Theo kinh nghi¹ m, sau hai hay ba h¹ p L¹ng thanh toSn chdm¹ c, a m, t khSch h¹ng n¹ o L¹ l¹ h¹ p L¹ng kh¹ ng thanh toSn L¹ c sau m, t th¹ i gian d¹ i, c¹ ng ti coi LQ¹ l¹ h¹ p L¹ng ãnhLi¹ v¹ sE cdu¹ b¹ ch²nh sSch t²n d¹, ng v¹ i khSch h¹ng L¹. NhEvdy¹ t¹ t¹ ng th¹ i Li¹W¹ cSch h¹ p L¹ng c¹ thW¹ hi v¹ o m, t trong cSch t³nh tr¹ng (tr¹ng thSi) sau:

- S_0 : $h^p p^L$ ng L^E c thanh to $\$n$,
- S_1 : $h^p p^L$ ng kh^1 ng L^E c thanh to $\$n$,
- S_2 : $h^p p^L$ ng sE L^E c thanh to $\$n$ L^1 ng th¹ i h^1 ,
- S_3 : $h^p p^L$ ng sE L^E c thanh to $\$n$ ch¹m.

Sau L'cay l' ma trđn xđc subđchuyđ trđng thđi (sau t'ng thđng):

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,3 & 0,2 \\ 0,4 & 0,3 & 0,2 & 0,1 \end{bmatrix}$$

Hĩ n tĩ c¹ ng ti c· c̣sc h̄ p L̄ ng phĩ thanh tọn L̄ ng h̄ v, i t̄ ng s' 500 trĩ u, v̄
c̣sc h̄ p L̄ ng cho thanh tọn ch̄m v, i t̄ ng s' 100 trĩ u. H̄y x̣sc L̄ nh trong t̄ ng tr̄n c.
bao nhi'u s̄ l̄ c̣c thanh tọn, c, n bao nhi'u s̄ l̄ n' ñĩ khĩng L̄ i l̄ c.

η $\otimes$ l $\rightarrow$ l' $\rightarrow$ to g $kh\dot{s}$ $ph_{\dot{c}}$ $\rightarrow$ c $\dot{t}\dot{u}$ $li\dot{o}$ n $quan$ t , i $ph\dot{a}$ $lo\dot{u}$ $c\dot{s}$ c $\dot{t}\dot{u}ng$ $th\dot{s}$ c , a x^2ch $Markov$ l $\rightarrow$ $v\dot{h}$ $LQch/ing$ ta $s\dot{E}$ kh' ng $tr\dot{a}nh$ $b''y$ $trong$ $gi\dot{s}$ o $tr\dot{a}nh$ $n''y$. Tuy $nh\dot{i}$ n , c $\rightarrow$ $th\dot{W}th\dot{s}$ $ngay$ $r\dot{a}ng$ $c\dot{s}$ c $\dot{t}\dot{u}ng$ $th\dot{s}$ S_0 $\rightarrow$ S_1 $\rightarrow$ $c\dot{s}$ c $\dot{t}\dot{u}ng$ $th\dot{s}$ $nh\dot{E}p$ $th\dot{o}$ (*absorbing state*), t c l' $m\dot{e}$ i h p l' ng $d\dot{z}$ hi' n $L\dot{a}ng$ $\rightarrow$ c $\dot{t}\dot{u}ng$ $th\dot{s}$ $n''o$ $th\dot{a}$ $c\dot{u}$ i c/ing sau m , t $th\dot{i}$ $gian$ $nh\dot{E}$ l' nh $c\dot{a}ng$ $s\dot{E}$ rhi $v''o$ m , t $trong$ hai c $\dot{t}\dot{u}ng$ $th\dot{s}$ $tr\dot{o}n$. Trong khi L' $c\dot{s}$ c $\dot{t}\dot{u}ng$ $th\dot{s}$ S_2 $\rightarrow$ S_3 $L\dot{E}$ c $g\dot{i}$ l' $c\dot{s}$ c $\dot{t}\dot{u}ng$ $th\dot{s}$

truyền (hay các trạng thái di chuyển).

Để tìm các trạng thái cho véc-tơ LQH, chúng ta cần tìm các giá trị riêng của ma trận P , ta chia ma trận P theo cách:

$$P = \begin{bmatrix} J & O \\ K & M \end{bmatrix}, \text{ với } J = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 \\ 0,4 & 0,3 \end{bmatrix}, O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,1 \end{bmatrix}.$$

Sau đó, ta tìm ma trận $R = I - M$ và ma trận nghịch đảo của R^{-1} , rồi lấy $I R^{-1}$ ma trận L và các giá trị riêng của ma trận M . Ta có:

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} 1,5254 & 0,3390 \\ 0,3390 & 1,1864 \end{bmatrix},$$

và tính được:

$$R^{-1} \times K = \begin{bmatrix} 0,8983 & 0,1017 \\ 0,6441 & 0,3559 \end{bmatrix}.$$

Các phần tử trong ma trận trên có ý nghĩa như sau. Trong số các hộ gia đình sống ở trạng thái S_2 (phần thanh toán lãi kép hộ) cuối cùng sau một thời gian nhất định là 89,83% sẽ rơi vào trạng thái S_0 (Đã thanh toán) và 10,17% sẽ rơi vào trạng thái S_1 (khả năng đã thanh toán). Các hộ gia đình sống ở trạng thái S_3 (thanh toán chậm) cuối cùng sau một thời gian nhất định là 64,41% sẽ rơi vào trạng thái S_0 (Đã thanh toán) và 35,59% sẽ rơi vào trạng thái S_1 (khả năng đã thanh toán).

Thì các phép tính:

$$[500 \ 100] \times \begin{bmatrix} 0,8983 & 0,1017 \\ 0,6441 & 0,3559 \end{bmatrix} = [459,32 \ 140,68],$$

ta thấy trong 500 triệu phần thanh toán lãi kép hộ và 100 triệu thanh toán chậm cuối cùng sẽ có 459,32 triệu đã thanh toán và 140,68 triệu vẫn chưa thanh toán. Để tính toán trạng thái tiếp theo, cần tính các giá trị riêng của ma trận M và tìm các vectơ riêng tương ứng.

Ngoài ra, ma trận R^{-1} của ma trận P có các tính chất sau:

– Tính các phần tử trong hàng đầu của R^{-1} là 1,8644 là thời gian trung bình (thời gian) mà một hộ gia đình đang phần thanh toán lãi kép hộ sẽ trải qua trước khi rơi vào một trong các trạng thái tiếp theo, tức là thời gian mà một hộ gia đình thanh toán đã hoàn thành.

– Tính các phần tử trong hàng hai của R^{-1} cũng có ý nghĩa tương tự là giá trị của hộ gia đình đang thanh toán chậm.

– Phần tử nằm trên hàng 1 và cột 1 của R^{-1} cho biết thời gian trung bình (thời gian) mà một hộ gia đình đang phần thanh toán lãi kép hộ sẽ ở trong trạng thái S_2 trước khi rơi vào một trong các trạng thái tiếp theo là 1,5254 tháng. Phần tử nằm trên hàng 1 và cột 2 cho biết thời gian trung bình (thời gian) mà một hộ gia đình đang phần thanh toán lãi kép hộ sẽ ở trong

trạng thái S_3 thuộc khi nào thì vào một trong các trạng thái hỗn hợp là 0,3390 trạng.

– Các phần tử trong hàng 2 của ma trận R^{-1} của nghiệm tổng quát là v_i và m là phần tử trong hàng đầu tiên của ma trận.

Sau đây, chúng ta sẽ đưa ra một số công thức giải thích các phần tử trong L cho trạng thái hỗn hợp của ma trận xác suất chuyển trạng thái của xích Markov có dạng sau:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,3 & 0,2 \\ 0,4 & 0,3 & 0,2 & 0,1 \end{bmatrix} \text{ (nhập vào bảng tính)},$$

$$= \begin{bmatrix} J & O \\ K & M \end{bmatrix} \text{ với } J = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} p_{20} & p_{21} \\ p_{30} & p_{31} \end{bmatrix}, O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} p_{22} & p_{23} \\ p_{32} & p_{33} \end{bmatrix},$$

trong đó p_{ij} là xác suất chuyển từ trạng thái S_i sang trạng thái S_j sau một bước. Không gian trạng thái gồm bốn trạng thái S_0, S_1, S_2 và S_3 ; các trạng thái S_0 và S_1 là các trạng thái hỗn hợp, còn S_2 và S_3 là các trạng thái quy nạp. Chúng ta dùng các ký hiệu:

$$U = \begin{bmatrix} u_{20} & u_{21} \\ u_{30} & u_{31} \end{bmatrix},$$

với u_{ik} là xác suất hỗn hợp vào trạng thái S_k khi trạng thái ban đầu là S_i , $k = 0, 1, 2, 3$, $i = 2, 3$.

$$V = \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix},$$

với v_i là thành phần trung bình cho t_i khi vào một trong các trạng thái hỗn hợp của trạng thái ban đầu là S_i , $i = 2, 3$.

$$W = \begin{bmatrix} w_{22} & w_{23} \\ w_{32} & w_{33} \end{bmatrix},$$

với w_{ij} là thành phần trung bình của xích Markov trong trạng thái S_j thuộc khi nào thì vào một trong các trạng thái hỗn hợp của trạng thái ban đầu là S_i , $i = 2, 3$. Lúc đó:

$$U = (I - M)^{-1}, V = (I - M)^{-1} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ và } W = (I - M)^{-1} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Chú ý: Việc chứng minh các công thức trên cho trạng thái hỗn hợp tổng quát thì ra cũng khá phức tạp, có thể tìm thấy trong các sách tham khảo về quá trình Markov. Cách dùng phần tử của xích Markov như trong mục này của chúng tôi để phân tích trong bối cảnh sinh học, xã hội, kinh tế, v.v. trong nghiên cứu khoa học sinh học, xã hội, kinh tế, v.v. thì đây là một hướng nghiên cứu mới, trong đó có thể thấy được.

2.4. Tìm phân phối giới hạn cho một hệ thống kỹ thuật


Một hệ thống kỹ thuật có hai chỉ tiêu có thể bị k³ thì i LiVh n³o. T³i m³ i th³ i LiVh h³ th³ ng c³ th³ h³ v³o m³ t trong nh³ ng tr³ng th³i sau (xem h³nh IV.1):

S_0 : c³ 2 chỉ tiêu t³ t;

S_1 : chỉ tiêu 1 h³ ng, chỉ tiêu 2 b³nh th³ng;

S_2 : chỉ tiêu 1 b³nh th³ng, chỉ tiêu 2 h³ ng;

S_3 : c³ hai chỉ tiêu LQ h³ ng.



Hình IV.1. Sơ đồ các trạng thái

N³i c³sch kh³c, t³i m³ i th³ i LiVh t, bi³h $X(t)$ c³ th³ h³ v³o m³ t trong c³sch v³ tr³ / tr³ng th³i S_0, S_1, S_2 v³ S_3 . Ch³i³ r³ng l³c n³y ta c³ x³ch Markov (th³ i gian) li³n t³ c³ v³ i kh³ ng gian tr³ng th³i $S = \{S_0, S_1, S_2, S_3\}$. Sau L³y, ch³ng ta s³ t³m c³sch x³c L³nh ph³n ph³ i g³ i h³h (long run distribution) c³ $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ n³ y l³ m³ t v³ h³ LQkh³ ph³ c³ t³p n³n ch³ng ta ch³ c³ th³ h³ nh³ b³y v³ h³ LQm³ t c³sch v³n t³.

Tr³c h³ ta nh³c l³ v³ph³n ph³ i Po³t-x³ ng v³ ph³n ph³ i m³. Gi³ s³ d³ ng t³n h³ u L³h (hay x³y ra) tu³n theo ph³n ph³ i Po³t-x³ ng $P(\lambda)$ v³ i λ l³ s³ t³n h³ u L³h trung b³nh trong m³ t kho³ng th³ i gian nh³ l³nh (coi l³ m³ t L³h v³ th³ i gian), λ c³ n³ L³c g³ i l³ c³ng L³ c³ a d³ ng t³n h³ u L³h. L³c L³, trong kho³ng th³ i gian nh³ Δt th³ s³ t³n h³ u x³y ra s³ nh³n gi³ tr³ k³ v³ i x³c su³t $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$. Ta g³ i ph³n t³ x³c su³t P l³ x³c su³t xu³t h³ n (²t nh³)

m³ t t³n h³ u trong kho³ng th³ i gian Δt . Th³ th³, do t³nh ñ³nh nh³ nh³ c³ a qu³ tr³nh Po³t-x³ ng, P c³ ng l³ x³c su³t xu³t h³ n L³ng m³ t t³n h³ u trong kho³ng th³ i gian Δt . Theo c³ ng th³ c³ bi³ th³ $P = \lambda \Delta t$ (ch³nh x³c t³ i v³ c³ng b³o(Δt)). Ch³ng h³h, n³u $\lambda = 6$ t³n h³ u / 1 ph³ v³ $\Delta t = 2$ gi³y, ta s³ c³ $P = \lambda \Delta t = 6 \times (1/30) = 1/5 = 0,2$. T³ L³, ta th³y x³c su³t L³c 1 t³n h³ u L³h trong kho³ng th³ i gian 2 gi³y l³ 0,2.

X³ bi³h ng³u nhi³n T (ch³ng h³h th³ i gian ph³ c³ v³ m³ t t³n h³ u trong m³ t h³ d³ ch³ v³), c³ ph³n ph³ i m³ $\varepsilon(\mu)$ v³ i h³m m³t L³ l³ $f(\tau) = \mu e^{-\mu\tau}$. μ c³ ng L³c g³ i l³ c³ng L³ ph³ c³ v³ hay c³ng L³ c³ a ñ³ng ph³c v³. H³m ph³n ph³ i x³c su³t c³ a T s³ l³

$$F(\tau) = P(T \leq \tau) = \int_0^{\tau} f(t)dt = \int_0^{\tau} \mu e^{-\mu t} dt = 1 - e^{-\mu \tau}.$$

C, n k³ v' ng to s³n v' L₂ l' ch chu³n c, a bi³J³ ng³ nhi³ n T l'.

$$m_T = \int_0^{+\infty} t f(t) dt = \int_0^{+\infty} \mu t e^{-\mu t} dt = \frac{1}{\mu}; \quad \delta_T = \frac{1}{\mu}.$$

Ta nh³ dn th³ b³y ngay r³ng:

$$P(0 \leq T \leq \Delta t) = F(\Delta t) - F(0) = 1 - e^{-\mu \Delta t} - [1 - e^0]$$

$$= 1 - e^{-\mu \Delta t} = \mu \Delta t \quad (\text{ch²nh x³s³c t_i i v¹ c¹ng b³o(Δt)).$$

Chú ý: N³J³ d, ng t²n hi' u L³J³ c³ ph³ n ph' i Po³s³t -x¹ ng $P(\lambda)$ th³ th' i gian g³i a hai t²n hi' u li³ n ti³J³ c³ ph³ n ph' i m³l³ $\varepsilon(\lambda)$.

Ch¹ng ta quay l³ b³i to s³n Lang x³. G³ i λ_1 s' l³fn chi ti³J³ 1 h³ ng v' λ_2 s' l³fn chi ti³J³ 2 h³ ng (t²nh trung b³nh) tr³ n 1 L³hn v' th' i gian. L¹/c L³, ta c³ th³W³coi d, ng t²n hi' u chi ti³J³ 1 v' 2 h³ ng l' d, ng Po³s³t -x¹ ng v_i i c³s³c tham s' λ_1 v' λ_2 . G³ i T₁ v' T₂ l' th' i gian s' a ch³ a chi ti³J³ 1 v' 2, c³ ph³ n ph' i m³l³ v_i i c³s³c k³ v' ng tsc₁ v' tsc₂ l' th' i gian s' a ch³ a (trung b³nh) chi ti³J³ 1 v' chi ti³J³ 2. V³dy T₁ v' T₂ c³ ph³ n ph' i m³l³ $\varepsilon(\mu_1)$ v' $\varepsilon(\mu_2)$, v_i i $\mu_1 = 1/tsc_1$ v' $\mu_2 = 1/tsc_2$.

T³ũ th' i Li³W³h t ta c³ bi³J³ ng³ nhi³ n $X(t) = X_t$ i ph³ n ph' i x³s³c su³ b³i sau L³ý:

X_t	S_0	S_1	S_2	S_3
P	$\pi_0(t)$	$\pi_1(t)$	$\pi_2(t)$	$\pi_3(t)$

Ta t²nh $\pi_0(t + \Delta t)$ t³ũ th' i Li³W³h ti³J³ theo $(t + \Delta t)$ trong hai tr³ng h' p sau L³ý:

- Tr³ng h' p 1: T³ũ th' i Li³W³h t, h' th' ng' tr³ng th³si S_0 v' t³ũ th' i Li³W³h $t + \Delta t$, h' th' ng v³ tr³ng th³si S_0 (kh¹ ng h³ ng).

- Tr³ng h' p 2: T³ũ th' i Li³W³h t, h' th' ng' tr³ng th³si S_1 ho³ h³ S_2 , c, n t³ũ th' i Li³W³h $t + \Delta t$ h' th' ng' tr³ng th³si S_0 .

Do L³, $\pi_0(t + \Delta t) = \pi_0(t) [1 - (\lambda_1 + \lambda_2)\Delta t] + \pi_1(t) \mu_1 \Delta t + \pi_2(t) \mu_2 \Delta t$ (*). Th³dt v³dy, x³s³c su³ b³i do tr³ng h' p 2 g³ý n³ n l' $\pi_1(t)\mu_1 \Delta t + \pi_2(t)\mu_2 \Delta t$, v_i i $\mu_1 \Delta t = P(0 \leq T_1 \leq \Delta t)$ l' x³s³c su³ b³i s' a ch³ a x³ong chi ti³J³ 1 trong kho³ng th' i gian Δt v' $\mu_2 \Delta t = P(0 \leq T_2 \leq \Delta t)$ l' x³s³c su³ b³i s' a ch³ a x³ong chi ti³J³ 2 trong kho³ng th' i gian Δt . Trong khi L³, x³s³c su³ b³i do tr³ng h' p 1 g³ý n³ n l' $\pi_0(t)[1 - (\lambda_1 + \lambda_2)\Delta t]$, v_i i $\lambda_1 \Delta t$: x³s³c su³ b³i h³ ng chi ti³J³ 1 trong kho³ng Δt , c, n $\lambda_2 \Delta t$: x³s³c su³ b³i h³ ng chi ti³J³ 2 trong kho³ng Δt .

N³ i c³s³ch kh³s³c, ch¹ng ta L³« th³ c hi' n c¹ ng th³ c x³s³c su³ b³i L³ý L_i $\pi_0(t + \Delta t) = \pi_0(t)p_{00} + \pi_1(t)p_{10} + \pi_2(t)p_{20}$, trong L³: p_{10} l' x³s³c su³ b³i h' tr³ng th³si S_1 t³ũ th' i Li³W³h t v' chuy³ sang tr³ng th³si S_0 t³ũ th' i Li³W³h $(t + \Delta t)$.

$$T. (*) \text{ ta có: } \frac{\pi_0(t + \Delta t) - \pi_0(t)}{\Delta t} = \pi_1(t)\mu_1 + \pi_2(t)\mu_2 - \pi_0(t)\lambda_1 - \pi_0(t)\lambda_2.$$

Cho $\Delta t \rightarrow 0$ (vì Δt không liên quan với Δt) thì

$$\frac{d\pi_0(t)}{dt} = \pi_1(t)\mu_1 + \pi_2(t)\mu_2 - \pi_0(t)\lambda_1 - \pi_0(t)\lambda_2$$

Khi ta rút ngắn (hệ thống) trong một khoảng thời gian Δt thì hệ thống sẽ chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j với xác suất q_{ij} . Khi đó ta có: $[\pi_0(t), \pi_1(t), \pi_2(t), \pi_3(t)] \rightarrow [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3]$. Vậy ta có:

$$\pi_1\mu_1 + \pi_1\mu_2 - \pi_0\lambda_1 - \pi_0\lambda_2 = 0 \text{ (vì } \frac{d\pi_0(t)}{dt} = 0 \text{ khi } t \rightarrow \infty).$$

Một cách khác, ta có thể viết phương trình:

$$\begin{cases} \frac{d\pi_0}{dt} = \mu_1\pi_1 + \mu_2\pi_2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\pi_0 = 0 \\ \frac{d\pi_1}{dt} = \lambda_1\pi_0 + \mu_2\pi_3 - (\lambda_2 + \mu_1)\pi_1 = 0 \\ \frac{d\pi_2}{dt} = \lambda_2\pi_0 + \mu_1\pi_3 - (\lambda_1 + \mu_2)\pi_2 = 0 \\ \frac{d\pi_3}{dt} = \lambda_2\pi_1 + \lambda_1\pi_2 - (\mu_1 + \mu_2)\pi_3 = 0 \end{cases}$$

Một cách khác, ta có thể viết phương trình: $-\pi_j q_{jj} = \sum_{i \neq j} \pi_i q_{ij}$

hay $\sum_{i \in S} \pi_i q_{ij} = 0, \forall j \in S$ (**), với $\sum_{i \in S} \pi_i = 1$, trong đó q_{ii} là cường độ chuyển từ trạng thái i sang các trạng thái khác (không kể i), còn q_{ij} là cường độ chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j , được định nghĩa như sau:


$$q_{ii} = -\lim_{\Delta t \rightarrow 0} (P[X(t + \Delta t) \neq i / X(t) = i] / \Delta t),$$

$$q_{ij} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (P[X(t + \Delta t) = j / X(t) = i] / \Delta t),$$

Lúc đó, $Q = [q_{ij}]$ là ma trận cường độ. Từ định nghĩa (**) ta thấy, với mọi $i, j \in S$, $q_{ij} \geq 0$ và $q_{ii} \leq 0$. Ta có thể viết phương trình cân bằng dưới dạng $Q^T \pi = 0$ hay $Q^T [\pi_0 \ \pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3]^T = 0$.

Ví dụ: Cho $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \mu_1 = 2, \mu_2 = 3$. Ta sẽ tìm cường độ chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j , được định nghĩa như sau:

$$Q^T = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$



Hình IV.2. Sơ đồ cường độ chuyển trạng thái

Giải thích: $q_{00} = -3$ v³ c₀ c₀ c₀ chuyển từ trạng thái S_0 sang các trạng thái khác là $\lambda_1 + \lambda_2 = 3$, c₀ n₀ $q_{10} = 2$ c₀ c₀ c₀ chuyển từ trạng thái S_1 vào trạng thái S_0 .

Giả sử $[\pi_0 \ \pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3]Q = 0$ hay $Q^T[\pi_0 \ \pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3]^T = 0$ (vì là Q không biến đổi $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$) c₀ k₀ quy: $\pi_0 = 6/15 = 0,4$; $\pi_1 = 3/15 = 0,2$; $\pi_2 = 4/15 = 0,27$; $\pi_3 = 2/15 = 0,13$. Các chuyển đổi, h₀ $[\pi_0 \ \pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3]Q = 0$ theo m₀ t₀ ngh₀ nh₀ L₀ nh₀ t₀ v₀ i₀ $\Pi \times (I - P) = 0$, nh₀ L₀ tr₀nh b₀y trong c₀s c₀ 1.2 v₀ 2.1.

Giả sử L i₀ nh₀u₀đ₀ / 1 L₀nh₀ v₀ th₀ i₀ gian₀ h₀ th₀ ng₀ mang₀ l₀ũ₀ trong c₀s tr₀ng₀ h₀ p₀ c₀ th₀W₀ x₀l₀y ra nh₀ c₀sau: n₀h₀ h₀ th₀ ng₀ trong tr₀ng₀ th₀i S_0 th₀ i₀ nh₀u₀đ₀ l₀ 8 USD, t₀ũ₀ S_1 l₀ 3 USD, t₀ũ₀ S_2 l₀ 5 USD, t₀ũ₀ S_3 l₀ 0 USD. Vậy L i₀ nh₀u₀đ₀ trung b₀nh / 1 L₀nh₀ v₀ th₀ i₀ gian₀ l₀

$$8 \times 0,4 + 3 \times 0,2 + 5 \times 0,27 = 5,15 \text{ (USD)}.$$

Qua v₀đ₀ ta th₀ĩ₀ $\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3$ L₀c₀ c₀ x₀s₀c₀ L₀nh₀ c₀đ₀ c₀ v₀ c₀s c₀gi₀s₀ tr₀ L₀c₀ bi₀đ₀ $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$.

λ_1, λ_2 : s₀ l₀fn₀ chi₀ ti₀đ₀ h₀ ng₀ (tu₀đ₀ thu₀ c₀ h₀ th₀ ng₀ c₀ th₀W₀,

μ_1, μ_2 : c₀s c₀ tham₀ s₀ s₀ a₀ ch₀ a₀ c₀fn₀ L₀c₀ v₀o.

L₀ i₀ nh₀u₀đ₀ c₀ i₀ c₀đ₀ng₀ c₀ a₀ h₀ th₀ ng₀ ph₀ thu₀ c₀ v₀o $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ v₀ L₀c₀ c₀ x₀s₀c₀ L₀nh₀ b₀ng₀ c₀s c₀gi₀s₀ b₀i₀ to₀đ₀ n₀ t₀ i₀ c₀sau:

$$L \text{ i₀ nh₀u₀đ₀ } L = c_0\pi_0 + c_1\pi_1 + c_2\pi_2 \rightarrow \text{Max}$$

(c_0, c_1, c_2 : lợi nhuận từng trạng thái)

v₀ i₀ c₀s c₀ r₀ng₀ bu₀ c:


$$\begin{cases} \mu_1 \pi_1 + \mu_2 \pi_2 - (\lambda_1 + \lambda_2) \pi_0 = 0 \\ \lambda_1 \pi_0 + \mu_2 \pi_3 - (\lambda_2 + \mu_1) \pi_1 = 0 \\ \lambda_2 \pi_0 + \mu_1 \pi_3 - (\lambda_1 + \mu_2) \pi_2 = 0 \\ \lambda_2 \pi_1 + \lambda_1 \pi_2 - (\mu_1 + \mu_2) \pi_3 = 0 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3 \geq 0; \mu_1, \mu_2 \geq 0 \end{cases}$$

Lưu ý: Bội số nguyên tố của μ_1, μ_2 là λ_1, λ_2 (biết). Ta phải tìm μ_1, μ_2 để bội số nguyên tố của μ_1, μ_2 bằng bội số nguyên tố của λ_1, λ_2 .

2.5. Một ứng dụng của quá trình sinh-tử cho hệ thống hàng chờ

Quá trình sinh-tử là một quá trình ngẫu nhiên liên tục trong L^2 thuyết là một quá trình ngẫu nhiên liên tục, và một số ngẫu nhiên khoa học kỹ thuật khác cũng có trong quá trình kinh doanh và vận hành.

Quá trình sinh-tử là một quá trình ngẫu nhiên liên tục Markov thuần nhất trên không gian li-ô-n-t, và khi quá trình sinh-tử S là một quá trình sinh-tử $S = \{S_0, S_1, S_2, \dots, S_n, \dots\}$ và ma trận chuyển trạng thái $Q = [q_{ij}]$ có tính chất $q_{ij} = 0$ với $|i - j| \geq 2$. Điều này có nghĩa là quá trình sinh-tử trong quá trình sinh-tử chỉ có thể chuyển trạng thái lên hoặc xuống một đơn vị (xem hình IV.3).



$$\begin{bmatrix} q_{00} & q_{10} & q_{20} & \dots \\ q_{01} & q_{11} & q_{21} & \dots \\ q_{02} & q_{12} & q_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \end{bmatrix}.$$

hay:

$$\begin{cases} q_{00}\pi_0 + q_{10}\pi_1 + q_{20}\pi_2 + \dots = 0, \\ q_{01}\pi_0 + q_{11}\pi_1 + q_{21}\pi_2 + \dots = 0, \\ q_{02}\pi_0 + q_{12}\pi_1 + q_{22}\pi_2 + \dots = 0, \\ \dots \end{cases}$$

Do t³nh ch³ H³ bi³ t, nh³ « ph³ t³ch³ tr³o³n, c³, a ma tr³nh c³ng L³ Q c³, a qu³ tr³nh sinh-t³, h³ tr³o³n L³ c vi³ m³, t c³sch t³ng minh h³nh nh³ sau:

$$\begin{cases} -\lambda_0\pi_0 + \mu_1\pi_1 + \dots = 0, \\ \lambda_0\pi_0 - (\lambda_1 + \mu_1)\pi_1 + \mu_2\pi_2 + \dots = 0, \\ \lambda_1\pi_1 - (\lambda_2 + \mu_2)\pi_2 + \mu_3\pi_3 + \dots = 0, \\ \dots \end{cases}$$

T³ L³ L³ d³ng t³m L³ c³ $\pi_{n+1} = (\lambda_n/\mu_{n+1})\pi_n$, $\forall n = 1, 2, 3, \dots$ L³Li t³ i c³ng th³ c t³nh $\pi_i, \forall i$.

$$\begin{cases} \pi_1 = (\lambda_0/\mu_1)\pi_0, \\ \pi_2 = (\lambda_1/\mu_2)\pi_1 = (\lambda_1\lambda_0/\mu_2\mu_1)\pi_0, \\ \pi_3 = (\lambda_2/\mu_3)\pi_2 = (\lambda_2\lambda_1/\mu_3\mu_2)\pi_1 = (\lambda_2\lambda_1\lambda_0/\mu_3\mu_2\mu_1)\pi_0, \\ \dots \\ \pi_{n+1} = (\lambda_n/\mu_{n+1})\pi_n = \dots = (\lambda_n\lambda_{n-1}\dots\lambda_0/\mu_{n+1}\mu_n\dots\mu_1)\pi_0, \\ \dots \end{cases}$$

V³, i L³Q³ k³i n³ $\sum_{i=0}^{\infty} \pi_i = 1$, cu³ i c³ng ta c³:

$$\pi_0 = 1 / (1 + \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_k\lambda_{k-1}\dots\lambda_0/\mu_{k+1}\mu_k\dots\mu_1)).$$

η H³ bi³ t khi $\mu_n = 0, \forall n$, th³ qu³ tr³nh sinh-t³ tr³ th³nh qu³ tr³nh sinh thu³h³ khi³ (pure birth process). Qu³ tr³nh sinh thu³h³ khi³ v³, i $\lambda_n = \lambda$ l³ qu³ tr³nh Po³st-x³ng v³, i tham

s' λ .

Ví dụ: Giả sử d, ng khách hàng Lữ mua vé m, t vận hành, ng bán vé v_i i M quỳ ph, c v_i l' d, ng Pošt-x' ng v_i i tham s' $\lambda = 6$ khách hàng / 1 ph/4 (LiQ n'y c' ng c' ngha l' khách hàng Lữ ph, ng bán vé v_i i c' s' th' i LiW Lữ tu' theo lu' ph' i m' v_i i tham s' $\lambda = 6$).

Ngo' i ra, c, n bi' nguy' n t' ph, c v_i l' FCFS (*First come first serve*) v' th' i gian ph, c v_i t' m, i quỳ c' lu' ph' i m' v_i i k' v' ng 1/3 (ph/4).

C' tr' i hai c' h' i sau L':

– S' quỳ h' ng t' i thiW l' bao nhi' u L'W' ng ch' kh' ng tr' n' n' d' i v' h' ?

– Giả s' N' l' s' khách hàng Lang ch' hay Lang L' c ph, c v_i t' th' i LiW t. Ch' n M = 4 v' m, t khách hàng s' ch' L'W' c ph, c v_i n' $N_t \leq 4$, ch' v' i x' s' su' 0,5 n' $N_t = 5$ v' s' h' Li n' $N_t = 6$. H' y x' s' L' nh ph' i d' ng c, a qu' tr' n' y?

Tr' c h' , trong v' d, n' y ch' ng ta c' m, t qu' tr' n' sinh- t' v' i kh' ng gian tr' ng th' i $S = \{S_0, S_1, S_2, \dots, S_n, \dots\}$, trong L' S' n' l' tr' ng th' i trong v' ph, ng c' n khách hàng. C' c' ng L' chuy' l' $\lambda_k = 6$ v' i k = 0, 1, 2, ... c, n $\mu_k = 3k$ v' i k $\leq M$ v' $\mu_k = 3M$ v' i k > M (LiQ n'y l' do bi' c, c tiW c, a c' s' bi' ng' n' i ph' i m' L' c l' p c' ng c' ph' i m' v_i i tham s' b' ng t' ng c' s' tham s' c, a c' s' ph' i m' t' ng ng).

Do $\lambda_k / \mu_{k+1} = 6/3M < 1$ (khi k $\geq M$) n' n' v' i M ≥ 3 th' :

$$\sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_k \lambda_{k-1} \dots \lambda_0 / \mu_{k+1} \mu_k \dots \mu_1) < \infty.$$

B' i v' d' h' ng L' i s' kh' ng d' i v' h' (n' tr' i l' , khi chu' i ph' k³, th' $\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = \dots = 0$, n' n' s' khách trong h' ng L' i s' d' f' t' i m, t s' h' u h' khi t $\rightarrow \infty$ v' i x' s' su' b' ng 0).

Trong c' h' i th' hai, ta c' $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 6, \lambda_5 = 3$. Theo c' ng th' c t' nh $\pi_0 = 1 / (1 + \sum_{k=0}^5 (\lambda_k \lambda_{k-1} \dots \lambda_0 / \mu_{k+1} \mu_k \dots \mu_1))$ ta c' ngay $\pi_0 = 12/89$. T' L' t' nh ra $\pi_1 = 24/89, \pi_2 = 24/89, \pi_3 = 16/89, \pi_4 = 8/89, \pi_5 = 4/89$ v' $\pi_6 = 1/89$.

3. Mô phỏng xích Markov

3.1. Mô phỏng xích Markov thời rời rạc

Phương pháp 1

X'ch Markov r' i r' v' thu' nh' c, n c' th'W' c k² hi' u l' $X_0, X_1, X_2, \dots$ Giả s' kh' ng gian tr' ng th' i l' S g' m h' u h' tr' ng th' i: $S = \{0, 1, 2, \dots, N\}$ v' ma tr' n x' s' su' chuy' tr' ng th' i L' L' c bi' l' $P = [p_{ij}]_{N \times N}$. Ch' ng ta s' m' ph' ng x'ch Markov r' i r' v' thu' nh' th' ng qua v' d, L' tr' n' b' y' c' s' m, c 1.2 v' 2.1 c, a ch' ng n' y.

Ta c· ph^o ph' i ban L'Fu l':

X_0	1	2	3
$\Pi^{(0)}$	$\pi_1^{(0)} = 0,2$	$\pi_2^{(0)} = 0,5$	$\pi_3^{(0)} = 0,3$

n Wm¹ ph₁ ng X₀ ta sp d₁ ng ph₁ chng phsp m¹ ph₁ ng ph₁ ph₁ i₁ r₁ i₁ r₁ c₁ h₁ c₁ ch₁ chng III. Tr₁ n m₁ sy t₁ nh, ta ph₁ st sinh ra m₁ t₁ s₁ ng Xu nhi₁ o₁ n r = RANDOM[0,1) theo luật ph₁ o₁ ph₁ i₁ L₁ U[0,1) trong [0,1). N₁ Ju r ≤ 0,2 ta l₁ Ey X₀ = 1; n₁ Ju 0,2 < r ≤ 0,7 th₁ ta l₁ Ey X₀ = 2 ; c₁ n n₁ Ju r > 0,7 th₁ L₁ Ey X₀ = 3. C₁ En c₁ k₁ J₁ qu₁ m¹ ph₁ ng X₀, ta m¹ ph₁ ng X₁ d₁ a tr₁ o₁ n ma tr₁ d₁ n x₁ sc su₁ Ey chuy₁ m¹ tr₁ chng th₁ si:

$$P = \begin{bmatrix} 0,8 & 0,1 & 0,1 \\ 0,07 & 0,9 & 0,03 \\ 0,083 & 0,067 & 0,85 \end{bmatrix}.$$

Giả sử $L \ll b$, $X_0 = 2, 1/4 L$ ta có m^1 ph. ng bi. h. ng X_1 n. l. n X_1 c. l. n c. ph. n. ph' i sau:

X_1	1	2	3
X3c suÖt-Öng. ng	$p_{21} = 0,07$	$p_{22} = 0,9$	$p_{23} = 0,03$

n i Q n y c th W B c th c h i n t C n g t n h E k h i m l p h n g X 0 C F n c h 4 l r 3 n g , trong
 h n g th h a i c a b l n g t r o n t a c p h m p h i x s c s u l i c L i Q k i n c a X 1 v i L i Q k i n X 0 =
 2 C s c b c t i p t h e o m l p h n g X 2 , X 3 , ... B c c t i p h n h t C n g t (c h o t i X 5 0 0 c h n g
 h n) .

LH₀ là quy trình ngẫu nhiên X_0 cho m tại s bằng LH₀ L₀ là n (chúng ta cần 1000 lần), ta sẽ có m tại b , 1000 s là u cho X_{500} . Tuy nhiên, chúng ta cần phải có m tại b (cần g là x của s để có m tại b) và X_{500} qua hai m tại b và X_{500} . Nhấn vào, ta cần có v để có m tại b (của s để có m tại b) $\Pi^{(500)}$. Cần có v để có m tại b và X_{500} qua hai m tại b và X_{500} .

Chú ý:

– Trong v² d_h tr^on L^oy, ta thấy c^o: thWd¹ng m¹ ph^o ng LW³m ph^o ph^o i d^o ng. Tuy nhi^on, m^o c^o L²ch ch^o yJ^u c^o, a ph^ong ph^op 1 l^o nh^om m¹ ph^o ng c^osc x²ch Markov r^o i r^och^o thu^oh nh^ol^o l^o c^osc qu^os tr^onh c^o: thW^ol^o ra trong c^osc h^o th^ong ph^o c^o t^op.

– Khi kh¹ng gian tr^ũng th^ĩ S g^o m m, t s[’] l n c^šc tr^ũng th^ĩ th³ ph^ong ph^šp m¹ ph^ong tr^on y^ou c^ũfu th^ĩ i gian ch^ũy m^šy t^{nh} kh^š l n. n^o Wkh^o ph^o c Li^o n[’]y, ch^ĩng ta xem x^o ph^ong ph^šp 2 sau L^oy.

Phương pháp 2


$X @ m, t$ h' th' ng kqthudt L'c c biW di n b' i x'ch Markov r' i r'c thu'f nh'f {X_t}, t = 0, 1, 2,... v' i kh' ng gian tr'ng th'f S c' N tr'ng th'f (N kh' l' n) v' ma tr' chuy' tr'ng th'f P = [P_{ij}]_{N×N}. X @ th' i LiW n, t' th' i LiW n y gi' s' L'c m' ph' ng L'c c X_n = s. Ta s' m' ph' ng th' i gian T_n l' th' i gian t' i l'f nh'f y ti'p theo s' m nh'f m' X_{t+T_n} ≠ s. Do x'ch

Markov chuyển trạng thái $\forall r$, chúng ta có bảng phân phối xác suất sau:

Trạng thái hiện tại	1	2	...	i	...	N
Xác suất chuyển	p_{i1}	p_{i2}	...	0	...	p_{iN}

Trong bảng trên, $i = 1, 2, \dots, N$ là trạng thái hiện tại và $j = 1, 2, \dots, N$ là trạng thái tiếp theo ($p_{ii} = 0, \forall i$).
 $\sum_{j=1}^N p_{ij} = 1, p_{ii} = 0, \forall i$.

Với các hàm mật độ phân phối xác suất Markov trên gian li độ n của x thì $W(x)$ được xác định bởi v^2 của x trong m c 2.4 hay 2.5.



Phần bài tập

BÀI TẬP CHƯƠNG I

1. Với i và j trong miền C của 1.2 chương I, hãy sắp xếp đúng thứ tự các phép biến đổi LWT theo quy trình $0 \rightarrow A \rightarrow B$ như sau để đạt được $z_{\max}$.

2. Giải BTQHTT sau đây:

$$z = 6x_1 + 8x_2 \rightarrow \text{Max}$$

với các ràng buộc

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ 5x_1 + 3x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

3. Giải BTQHTT sau đây:

$$z = 40x_1 + 30x_2 \rightarrow \text{Max}$$

với các ràng buộc

$$\begin{cases} \frac{2}{5}x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq 20 \\ \frac{1}{2}x_2 \leq 5 \\ \frac{3}{5}x_1 + \frac{3}{4}x_2 \leq 28 \\ x_1 \geq 30 \\ x_2 \geq 5 \\ (x_1, x_2 \geq 0) \end{cases}$$

Hướng dẫn: Nếu ta có một vấn đề tối ưu, ta cần 5 bước để giải (3 bước để tìm kiếm và 2 bước để kiểm tra) và 2 bước để giải (số bước để tìm kiếm và số bước để kiểm tra).

$$\begin{cases} \frac{2}{5}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3 = 20 \\ \frac{1}{2}x_2 + x_4 = 5 \\ \frac{3}{5}x_1 + \frac{3}{4}x_2 + x_5 = 28 \\ x_1 - x_6 + x_7 = 30 \\ x_2 - x_8 + x_9 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, \dots, x_9 \geq 0 \end{cases}$$

Hàm mục tiêu sẽ là

$$z = 40x_1 + 30x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 - Mx_7 + 0x_8 - Mx_9.$$

4. Chúng ta xem xem tại sao thì việc kinh doanh của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những thứ gì mà chúng ta cần phải chú ý. Những điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý là: khu vực kinh doanh, khu vực kinh doanh, khu vực kinh doanh. Do vậy chúng ta cần phải chú ý đến những điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý. Các điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý là: 500, 400 và 200 nghìn đồng. Các điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý là: 500, 400 và 200 nghìn đồng. Các điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý là: 500, 400 và 200 nghìn đồng.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1900, \\ x_1 + x_2 \geq 1500, \\ x_1 + x_3 \geq 1400, \\ x_2 + x_3 \geq 900, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Hãy lập phương trình thì việc kinh doanh chi phí mua sản phẩm, nhân viên và các nhân viên, các nhân viên và các nhân viên.

$$z = 500x_1 + 400x_2 + 200x_3 \rightarrow \text{Min.}$$

5. Phức tạp mà tôi muốn nói là (tuy nhiên tôi không phải là một chuyên gia, tôi chỉ là một người học hỏi).
6. Xem xét các điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý trong quá trình nghiên cứu về các điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý. Các điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý là: 500, 400 và 200 nghìn đồng. Các điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý là: 500, 400 và 200 nghìn đồng. Các điều kiện mà chúng ta cần phải chú ý là: 500, 400 và 200 nghìn đồng.

$$Y_1 = 9,147247 \cdot 10^{-6} + 0,609964X_1 + 0,679045X_2 + 0,005767X_1X_2$$

$$+ 0,003268X_1^2 + 0,007967X_2^2 (\%) \rightarrow \text{Max}$$


$$Y_2 = 38,2168 + 1,1324X_1 + 0,9554X_2 + 0,004166X_1X_2 + 0,01097X_1^2$$

$$+ 0,03909X_2^2 \text{ (Kwh/kg)} \rightarrow \text{Min}$$

$$Y_3 = - 4,760179 + 0,110704X_1 + 0,023387X_2 + 0,0013666X_1X_2$$

$$\text{đ } 0,002884X_1^2 \text{ đ } 0,006722X_2^2 \text{ (KgH}_2\text{O/h)} \rightarrow \text{Max.}$$

Hãy giả định rằng biến độc lập phân bố đồng đều trong phạm vi cho trước. Giả sử rằng biến phụ thuộc là hàm bậc hai của biến độc lập. Giả sử rằng biến phụ thuộc là hàm bậc hai của biến độc lập.



BÀI TẬP CHƯƠNG II

1. Giả sử bài toán vận tải cho trong bảng sau:

7	11	8	13	110
21	17	12	10	100
8	18	13	16	50
50	70	60	80	$\Sigma = 260$

2. Giả sử bài toán phân bổ nguồn nhân lực và vật tư ở gian thị chính (các máy móc thiết bị và vật tư nhân lực) được ghi theo hàng cho trong bảng sau:

32	18	32	16	1
22	14	12	16	1
24	30	26	24	1
26	30	28	20	1
1	1	1	1	

Tìm cách phân bổ nguồn nhân lực và vật tư (máy móc, vật tư trong số bốn kho) để các giao hàng máy và nhân lực được tối ưu nhất ở gian thị chính.

Hướng dẫn: Bài toán trên có thể giải bằng phương pháp phân phối (các bước làm việc cùng trình tự của bài toán vận tải, và kết quả cùng bảng kết quả và bảng 4).

3. Hai máy biến áp có dung lượng 580KVA và 650KVA hoặc là nối thành các máy biến áp cho bốn nhóm máy A, B, C và C có công suất tải là lần lượt 180, 270, 420 và 320. Qua khảo sát, chúng ta có các số liệu sau:

– Chỉ phí truy cập tải máy và lần vận chuyển công suất máy biến áp thì nhất là lần các nhóm máy
 1: $C_{1A} = 250$, $C_{1B} = 300$, $C_{1C} = 320$ và $C_{1D} = 310$ đồng / lần vận chuyển công suất

– Chỉ phí truy cập tải máy và lần vận chuyển công suất máy biến áp thì hai lần các nhóm máy
 1: $C_{2A} = 350$, $C_{2B} = 380$, $C_{2C} = 330$ và $C_{2D} = 340$ đồng / lần vận chuyển công suất

Hãy tìm cách phân bổ máy và nhóm máy có thể vận chuyển các máy biến áp để tìm được kết quả chi phí truy cập tải nhỏ nhất.

4. Lập mạng PERT cho dự án và các hoạt động sau đây:

Hoạt động	Thời gian	Thời gian (tuần)
-----------	-----------	------------------

A	–	3
B	–	4
C	–	4
D	A	5
E	B	2
F	D, E	7
I	C, F	6

Hãy tìm thời gian thi công cho công trình này và xác định các công việc cần chú ý.

Hướng dẫn: Kiểm tra quy trình công nghệ $A \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I$.

5. Xem xét mặt cắt ngang và các dữ kiện như sau:

Hoạt động	Hoạt động kế tiếp	Thời gian chờ (ngày)		
		a	m	b
A	–	3	6	9
B	–	2	5	8
C	A	2	4	6
D	B	2	3	10
E	B	1	3	11
F	C, D	4	6	8
G	E	1	5	15


Hãy giải quyết các vấn đề sau đây:

– Vẽ sơ đồ mạng.

– Tính thời gian (trung bình) hoàn thành dự án.

– Tìm xác suất trễ dự án trong vòng 20 ngày.

6. Xác định cấu trúc thi công cho mạng công nghệ sau với phết bị và nhân công:



7. Cho mặt bằng phụ thuộc 15 (lưu ý tỉ lệ) của thời gian chờ các dữ kiện sau: I, II, III

o t' ng l' i nhu

- 2 v̄ 3 v̄ i ph̄ t̄
v̄ o c̄ ng sū h̄ f̄ i(p-
Gī s̄ ch̄ ng ta L̄

 $\ddot{B}(t)$.


- A L₁ LiWh B, v, i
Esc d ki n c, a b i

A diagram of a staircase with 4 steps. The horizontal segments are labeled 10, 10, 10, and 8. The vertical segments are labeled 10, 10, 10, and 10.

A ta c· thWl' nh
St gFn, theo h-ē ng

bđc hay hđc ng L¹ ng, v_i i cđc chi ph² l¹ 15 v¹ 12. T₁ m₁ t trong hai L¹ n¹y, ch¹ng ta l¹đ
ti¹p t₁ c xđc L¹ nh tuy¹đn L¹ cho L¹ đc truy¹đn t₁ L¹ n, v_i i cđc chi ph² L¹ bi¹đ,... Vđy ta c¹ b¹đ
tođn t₁m L¹ đc ng L¹ v_i i chi ph² nh¹ nhđđ.

Hướng dẫn: Chia b¹đ tođn th¹nh nhi¹đn giai Lo¹đn nh¹ v¹ đ¹ng ph¹đng phđp quy
ho¹đch L¹ ng.



BÀI TẬP CHƯƠNG III

1. Khảo sát 200 xung tần hi u qua các van Li n Lj khi W ch c h ch h nh, ng i ta th b trung bnh 2 gi c m t chu i xung. S l u L« kh o s t L c v Q th i gian xung c, a c c chu i xung nh sau:

Th i gian xung (gi c)	S l i n	T i n su
3	50	0,25
4	40	0,20
5	50	0,25
6	60	0,30

Bng ph chng ph p m ph, ng ng n nh n (n j c th W l p ch chng tr nh t nh to n tr n m s y t nh) h y x s c L n h s van Li n (t i thi W) c n m sao cho vi c Li Q h nh ch c h ch h nh L c li n t c (n i c s ch kh s c, c c chu i xung lu n L c ph c v k p th i).

2. X m h nh m t k nh ph c v tho l m n: s t n hi u Lj c ph n ph i Poat-x ng, th i gian ph c v c ph n ph i m l. Gi s $A = 3$ t n hi u Lj trung bnh trong m t ph 4, $S = 4$ t n hi u L c ph c v trung bnh trong m t ph 4. H y ki n tra l i c s c kJ qu l sau v ph n t ch i ngh c, a ch ng: $L_q = 9/4(4 - 3) = 2,25$; $L_s = 3/1 = 3$; $W_q = 3/4 = 0,75$; $W_s = 1$; $P_w = 3/4 = 0,75$.


Tuy nh n, v i $P_w = 0,75$, ta th b 75% s t n hi u ph l ch tr c khi L c ph c v. n i Q n y c ngh l c n ti p t c c l th i n h th ng h ng ch L h i u qu l ph c v L c t t h n. M t trong c s c b i n ph p L W l m l i h i u qu l ph c v L c t t h n l n ng cao t c L ph c v. H y l p b ng t nh v so s nh khi c s tham s kh s c c a h th ng c l nh, ri ng S nh n c s gi s tr kh s c nhau $S = 4, 6, 8$ v 10.

3. X m h nh nh i Q k nh ph c v v i c s gi l thi nh trong b i t p tr n ($A = 3$ v $S = 4$). H y t nh c s c h s c a m h nh khi s k nh ph c v $k = 2, 3$. T L ph n t ch i ngh c, a c s c kJ qu l L c v so s nh v i kJ qu l khi s d ng m h nh m t k nh ph c v.
4. M t tr m b Li n vi n th ng c 13 c ng. Th i gian ph c v m i kh s c h ng trung bnh l 5 ph 4. KJ qu l kh o s t th ng k cho bi s l c ng t n hi u kh s c h ng trung bnh Lj trong m t gi, c n kJ qu l thu th p phi j th m d, i ki j kh s c h ng cho bi th i gian trung b nh (s ph 4) m t kh s c h ng c th W l i tr c khi L c ph c v nh sau:

C s c giai Lo h	S t n hi u / gi	Th i gian c th W l i t i La
-----------------	-----------------	-----------------------------

Nhu cầu cao	120	5
Nhu cầu trung bình	60	5,5
Nhu cầu thấp	30	6

Số lượng mặt hàng trong danh sách, hay xấp xỉ là quy trình tính toán số lượng mặt hàng trong mỗi giai đoạn của quy trình, để có thể xác định được nhu cầu của khách hàng (những gì họ cần mua) và nhu cầu của nhà cung cấp (những gì họ cần mua).



X@ x²ch Markov th^o i gian rⁱ i r^uc thu^hn nh^hi vⁱ i khⁱng gian tr^ung th^hi S₀, S₁, S₂, S₃, S₄, S₅. Gi^l sⁱ qua kh^lo s^ht c^hc m^hu th^hng k^o L^h bi^h L^h c ma tr^hn x^hc su^hi chuy^h tr^ung th^hi (sau mⁱ i L^hn vⁱ th^h i gian, c^h th^hW^h ph^h4, tu^hn, n^hm, th^hJh^h é) nh^hEsau:

- $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

H«y trΓĬ i cȝc c@u h, i sau:

– Cśc trüŋg thši n' o l' trüŋg thši hšp th, cśc trüŋg thši n' o l' trüŋg thši truyQ... ng? Hcy t3m xśc su bĩ LWquśc tr3nh b' hšp th, v' o m, i m, t trüŋg thši hšp th, khi quśc tr3nh xu bĩ phšt t m, t trong cśc trüŋg thši truyQ... ng.

– T²nh th^o i gian trung b³nh qu⁵ tr³nh r^hi v^o m^o t tr^ung th^oi truy^Q ng L[«] ch^o n n^o E^o tr^oc khi n^o r^hi v^o tr^ung th^oi h^op th^o.

C_{Fn} ch₄I₂ r₂ng, v_hi_h L_{Qn}h₂Em₁ t₁ trong b₂i t₁đ p₂n₂y c₂ th₂Wph₂st sinh trong nhi₂Q₂l₂nh v₂ c₂ nh₂trong h₂i th₂ng k₂othu₂t Li₂n - Li₂n t₂, kinh t₂J₂n₂ng nghi₂p (chuy₂W₂đ₂ch c₂sc lo₂h₂h₂nh s₂i d₂ng L₂h₂ quy m₂i s₂i d₂ng L₂h₂ hay kinh t₂J₂h₂), sinh h₂c (chuy₂W₂đ₂ch t₂h₂s₂ gene qua c₂sc th₂J₂h₂), x₂h₂i h₂c, v₂nh₂Q₂l₂nh v₂ c₂ kh₂sc₂é

6. H<y ph&t bi Wl thu& gi&l L&Wn¹ ph, ng x²ch Markov trong c&sc v² d, L&E c tr<nh b<y t &U
- c&sc m, c 2.4 v< 2.5.

Phần Phụ lục

Phụ lục 1. Bảng tìm xác suất $P(X < t)$ cho biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối chuẩn tắc $\sim N(0,1)$

t	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.50000	.50399	.50798	.51197	.51595	.51994	.52392	.52790	.53188	.53586
0.1	.53983	.54380	.54776	.55172	.55567	.55962	.56356	.56749	.57142	.57535
0.2	.57926	.58317	.58706	.59095	.59483	.59871	.60257	.60642	.61026	.61409
0.3	.61791	.62172	.62552	.62930	.63307	.63683	.64058	.64431	.64803	.65173
0.4	.65542	.65910	.66276	.66640	.67003	.67364	.67724	.68082	.68439	.68793
0.5	.69146	.69497	.69847	.70194	.70540	.70884	.71226	.71566	.71904	.72240
0.6	.72575	.72907	.73237	.73566	.73891	.74215	.74537	.74857	.75175	.75490
0.7	.75804	.76115	.76424	.76730	.77035	.77337	.77637	.77935	.78230	.78524
0.8	.78814	.79103	.79389	.79673	.79955	.80234	.80511	.80785	.81057	.81327
0.9	.81594	.81859	.82121	.82381	.82639	.82894	.83147	.83398	.83646	.83891
1.0	.84134	.84375	.84614	.84849	.85083	.85314	.85543	.85769	.85993	.86214
1.1	.86433	.86650	.86864	.87076	.87286	.87493	.87698	.87900	.88100	.88298
1.2	.88493	.88686	.88877	.89065	.89251	.89435	.89617	.89796	.89973	.90147
1.3	.90320	.90490	.90658	.90824	.90988	.91149	.91309	.91466	.91621	.91774
1.4	.91924	.92073	.92220	.92364	.92507	.92647	.92785	.92922	.93056	.93189
1.5	.93319	.93448	.93574	.93699	.93822	.93943	.94062	.94179	.94295	.94408
1.6	.94520	.94630	.94738	.94815	.94950	.95053	.95154	.95254	.95352	.95449
1.7	.95543	.95637	.95728	.95818	.95907	.95994	.96080	.96164	.96246	.96327
1.8	.96407	.96485	.96562	.96638	.96712	.96784	.96856	.96926	.96995	.97062
1.9	.97128	.97193	.97257	.97320	.97381	.97441	.97500	.97558	.97615	.97670

[illegible]

Phụ lục 2A. Bảng 2500 chữ số ngẫu nhiên


1581922396	2068577984	8262130892	8374856049	4637567488
0928105582	7295088579	9586111652	7055508767	6472382934
4112077556	3440672486	1882412963	0684012006	0933147914
7457477468	5435810788	96708529 13	1291265730	4890031305
0099320858	3090908872	2039593181	5973470495	9776135501
7245174840	2275698645	8416549348	4676463401	2229367983
6749420382	4832630032	5670984959	5432114610	2966095680
5503161011	7413686599	1198757695	0414294470	0140121598
7164238934	7666127259	5263097712	5133648980	4011966963
3593969525	0272759769	0385998136	9999989966	7544056852
4192054466	0700014629	5469439659	8408703469	1074373131
9697426117	6488888550	4031652526	8123543276	0927534537
2007950579	9564268448	3457416988	1534027886	7016633739
4384768758	2389278610	3859431781	3643768456	4141344518
3840145867	9120831830	7228567652	1267173884	4020651657
0190453442	4800088084	1165628559	5407921254	3768932478
6766554338	5583263145	5089052204	9780623691	2195448096
6315116284	9172824179	5544814339	0016943666	3828538786
3908771938	4035554324	0840126699	4942059208	1475623997
3370024586	9324732596	1186563397	4425443189	3216653251
2999997185	0133968938	7678931194	1354034403	6002561840
7864375912	8383232768	1892857070	2323673751	3188881718
7065492027	6349104233	3382569662	4579426926	1513082455
0654683246	4765404877	8149224168	5468634609	6474393896
7830555058	5255147182	3519287786	2481673649	8907598697
7626984369	4725370390	9641916289	5049082870	7463807244
4785048453	3646121751	8436077768	2928794356	9956043516
4627791048	5765558107	876259243	6185670830	6363845920
9376470693	0441608934	8749472723	2202274078	5897002653

1227991661	7936797054	9527542791	4711871173	8300978148
5582095589	5535798279	4764439855	6279247618	4446895088
4959397698	1056981450	8416606706	8234013222	6426813469
1824779358	1333750468	9434074212	5273692238	5902177065
7041092295	5726289716	3420847871	1820481234	0318831723
3555104281	0903099063	6827824899	6383872737	5901682626
9717595534	1634107293	852105747 2	1471300754	3044151557
5571564123	7344613447	1129117244	3208461091	1699403490
4674262892	2809456764	5806554509	8224980942	5738031833
8461228715	0746980892	9285305274	6331989646	8764467686
1838538678	3049068967	6955157269	5482964330	2161984904
1834182 305	6203476893	5937802079	3445280195	3694915658
1884227732	2923727501	8044389132	4611203081	6072112445
6791857341	6696243386	2219599137	3193884236	8224729704
3007929946	4031562749	5570757297	6273785046	1455349704
6085440624	2875556938	5496629750	484181 7356	1443167141
7005051056	3496332071	5054070890	7303867953	6255181190
9846413446	8306646692	0661684251	8875127201	6251533454
0625457703	4229164694	7321363715	7051128285	1108468072
5457593922	9751489574	1799906380	1989141062	5595364247
4076486653	8950826528	4934582003	4071187742	1456207629

Phụ lục 2B. Bảng 1600 chữ số ngẫu nhiên

10	09	73	25	33	76	52	01	35	86	34	67	35	48	76	80	95	90	91	17
37	54	20	48	05	64	89	47	42	96	24	80	52	40	37	20	63	61	04	02
08	42	26	89	53	19	64	50	93	03	23	20	90	25	60	15	95	33	47	64
99	01	90	25	29	09	37	67	07	15	38	31	13	11	65	88	67	67	43	97
12	80	79	99	70	80	15	73	61	47	64	03	23	66	53	98	95	11	68	77
66	06	57	47	17	34	07	27	68	50	36	69	73	61	70	65	81	33	98	85
31	06	01	08	05	45	57	18	24	06	35	30	34	26	14	86	79	90	74	39
85	26	97	76	02	02	05	16	56	92	68	66	57	48	18	73	05	38	52	47
63	57	33	21	35	05	32	54	70	48	90	55	35	75	48	28	46	82	87	09
73	79	64	57	53	03	52	96	47	78	35	80	83	42	82	60	93	52	03	44
98	52	01	77	67	14	90	56	86	07	22	10	94	05	58	60	97	09	34	33
11	80	50	54	31	39	80	82	77	32	50	72	56	82	48	29	40	52	42	01
83	45	29	96	34	06	28	89	80	83	13	74	67	00	78	18	47	54	06	10
88	68	54	02	00	86	50	75	84	01	36	76	66	79	51	90	36	47	64	93
99	59	46	73	48	87	51	76	49	69	91	82	60	89	28	93	78	56	13	68
65	48	11	76	74	17	46	85	09	50	58	04	77	69	74	73	03	95	71	86
80	12	43	56	35	17	72	70	80	15	45	31	82	23	74	21	11	57	82	53
74	35	09	98	17	77	40	27	72	14	43	23	60	02	10	45	52	16	42	37
69	91	62	68	03	66	25	22	91	48	36	93	68	72	03	76	62	11	39	90
09	89	32	05	05	14	22	56	85	14	46	42	75	67	88	96	29	77	88	22
91	49	91	45	23	68	47	92	76	86	46	16	28	35	54	94	75	08	99	23
80	33	69	45	98	26	94	03	68	58	70	29	73	41	35	53	14	03	33	40
44	10	48	19	49	85	15	74	79	54	32	97	92	65	75	57	60	04	08	81
12	55	07	37	42	11	10	00	20	40	12	86	07	46	97	96	64	48	94	39
63	60	64	93	29	16	50	53	44	84	40	21	95	25	63	43	65	17	70	82

61	19	69	04	46	26	45	74	77	74	51	92	43	37	29	65	39	45	95	93
15	47	44	52	66	95	27	07	99	53	59	36	78	38	48	82	39	61	01	18
94	55	72	85	73	67	89	75	43	87	54	62	24	44	31	91	19	04	25	92
42	48	11	62	13	97	34	40	87	21	16	86	84	87	67	03	07	11	20	59
23	52	37	83	17	73	20	88	98	37	68	93	59	14	16	26	25	22	96	63
04	49	35	24	94	75	24	63	38	24	45	86	25	10	25	61	96	27	93	35
00	54	99	76	54	64	05	18	81	59	96	11	96	38	96	54	69	28	23	91
35	96	31	53	07	36	89	80	93	54	33	35	13	54	62	77	97	45	00	24
59	80	80	83	91	45	42	72	68	42	83	60	94	97	00	13	02	12	48	92
46	05	88	52	36	01	39	09	22	86	77	28	14	40	77	93	91	08	36	47
32	17	90	05	97	87	37	92	52	41	05	56	70	70	07	86	74	31	71	57
69	23	46	14	06	20	11	74	52	04	15	95	66	00	00	18	74	39	24	23
19	56	54	14	30	01	75	87	53	79	40	41	92	15	85	66	67	43	68	06
45	15	51	49	38	19	47	60	72	46	43	66	79	45	43	59	04	79	00	33
94	86	43	19	94	36	16	81	08	51	34	88	88	15	53	01	54	03	54	56



Phụ lục 3. Tìm giá trị của P_0 căn cứ số kênh k và tỉ số A/kS

$\frac{A}{kS}$	Số kênh k									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.02	.98000	.96078	.94176	.92312	.90484	.88692	.86936	.85214	.83527	.81873
.04	.96000	.92308	.88692	.85214	.81873	.78663	.75578	.72615	.69768	.65032
.06	.94000	.88697	.83562	.78663	.74082	.69768	.65705	.61878	.58275	.54881
.08	.92000	.85185	.78659	.72614	.67032	.61878	.57121	.52729	.48675	.44933
.10	.90000	.81818	.74074	.67031	.60653	.54881	.49659	.44933	.40657	.36788
.12	.85000	.78571	.69753	.61876	.54881	.48675	.43171	.38289	.33960	.30119
.14	.86000	.75439	.65679	.57116	.49657	.43171	.37531	.32628	.28365	.24660
.16	.84000	.72414	.61837	.52720	.44931	.38289	.32628	.27804	.23693	.20190
.18	.82000	.69492	.58214	.48660	.40653	.33959	.28365	.23693	.19790	.16530
.20	.80000	.66667	.54795	.44910	.36782	.30118	.24659	.20189	.16530	.13534
.22	.78000	.63934	.51567	.41445	.33277	.26711	.21437	.17204	.13807	.11080
.24	.76000	.61290	.48519	.38244	.30105	.23688	.18636	.14660	.11532	.09072
.26	.74000	.58730	.45640	.35284	.27233	.21007	.16200	.12492	.09632	.07427
.28	.72000	.56250	.42918	.32548	.24633	.18628	.14082	.10645	.08045	.06081
.30	.70000	.53846	.40346	.30017	.22277	.16517	.12241	.09070	.06720	.04978
.32	.68000	.51515	.37913	.27676	.20144	.14666	.10639	.07728	.05612	.04076
.34	.66000	.49254	.35610	.25510	.18211	.12981	.09247	.06584	.04687	.03337
.36	.64000	.47059	.33431	.23505	.16460	.11505	.08035	.05609	.03915	.02732
.38	.62000	.44928	.31367	.21649	.14872	.10195	.06981	.04778	.03269	.02236
.40	.60000	.42857	.29412	.19929	.13433	.09032	.06064	.04069	.02729	.01830
.42	.58000	.40854	.27559	.18336	.12128	.07998	.05267	.03465	.02279	.01498
.44	.56000	.38889	.25802	.16860	.10944	.07080	.04573	.02950	.01902	.01226
.46	.54000	.36986	.24135	.15491	.09870	.06265	.03968	.02511	.01587	.01003
.48	.52000	.35135	.22554	.14221	.08895	.05540	.03442	.02136	.01324	.00820
.50	.50000	.33333	.21053	.13043	.08010	.04896	.02984	.01816	.01104	.00671
.52	.48000	.31579	.19627	.11951	.07207	.04323	.02586	.01544	.00920	.00548
.54	.46000	.29870	.18273	.10936	.06477	.03814	.02239	.01311	.00767	.00448
.56	.44000	.28205	.16986	.09994	.05814	.03362	.01936	.01113	.00638	.00366
.58	.42000	.26582	.15762	.09119	.05212	.02959	.01673	.00943	.00531	.00298

$\frac{A}{kS}$	S' k°nh k									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.60	.40000	.25000	.14599	.08306	.04665	.02601	.01443	.00799	.00441	.00243
.62	.38000	.23457	.13491	.07750	.04167	.02282	.01243	.00675	.00366	.00198
.64	.36000	.21951	.12438	.06847	.03715	.01999	.01069	.00570	.00303	.00161
.66	.34000	.20482	.11435	.06194	.03304	.01746	.00918	.00480	.00251	.00131
.68	.32000	.19048	.10479	.05587	.02930	.01522	.00786	.00404	.00207	.00106
.70	.30000	.17647	.09569	.05021	.02590	.01322	.00670	.00338	.00170	.00085
.72	.28000	.16279	.08702	.04495	.02280	.01144	.00570	.00283	.00140	.00069
.74	.26000	.14943	.07875	.04006	.01999	.00986	.00483	.00235	.00114	.00055
.76	.24000	.13636	.07087	.03550	.01743	.00846	.00407	.00195	.00093	.00044
.78	.22000	.12360	.06335	.03125	.01510	.00721	.00341	.00160	.00075	.00035
.80	.20000	.11111	.05618	.02730	.01299	.00610	.00284	.00131	.00060	.00028
.82	.18000	.09890	.04933	.02362	.01106	.00511	.00234	.00106	.00048	.00022
.84	.16000	.08696	.04280	.02019	.00931	.00423	.00190	.00085	.00038	.00017
.86	.14000	.07527	.03656	.01700	.00772	.00345	.00153	.00067	.00029	.00013
.88	.12000	.06383	.03060	.01403	.00627	.00276	.00120	.00052	.00022	.00010
.90	.10000	.05263	.02491	.01126	.00496	.00215	.00092	.00039	.00017	.00007
.92	.08000	.04167	.01947	.00867	.00377	.00161	.00068	.00028	.00012	.00005
.94	.06000	.03093	.01427	.00627	.00268	.00113	.00047	.00019	.00008	.00003
.96	.04000	.02041	.00930	.00403	.00170	.00070	.00029	.00012	.00005	.00002
.98	.02000	.01010	.00454	.00194	.00081	.00033	.00013	.00005	.00002	.00001

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

1. C_{1/2} Nguyễn B_đ, *Nghiên cứu một số thông số cơ bản khi sấy quả hồi trong phòng thí nghiệm*, Luận văn th_đ s: Khoa h_đ c K_đth_đ, Tr_đng n_đ HNN I H_đ N_đ i, 2002.
2. Nguyễn Văn C_đng, *Tối ưu hoá kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi cá nông hộ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên*, Luận văn th_đ s: Kinh t_đ N_đng nghi_đ p, Tr_đng n_đ HNN I H_đ N_đ i, 2003.
3. Trần Thị Nh_đ H_đng, n_đ H_đg Th_đJ Huy, *Một số phương pháp toán học trong cơ học nông nghiệp*, Nxb N_đng nghi_đ p, 1987.
4. Trần Quang Kh_đnh, *Toán ứng dụng cho chuyên ngành điện*, B_đi gi_đng cho cao h_đ c Li_đ n, Khoa Ch_đLi_đ n, Tr_đng n_đ HNN I H_đ N_đ i, 1998.
5. Nguyễn n_đ c Ngh_đa, *Tối ưu hoá*, Nxb Gi_đso đ_đ c, 2001.
6. Nguyễn H_đl_đ Thanh, *Quy hoạch tuyến tính và một số ứng dụng trong kinh tế*, T_đi lí u tham kh_đo, Tr_đng n_đ HNN I H_đ N_đ i, 1997.
7. Nguyễn H_đl_đ Thanh, n_đM_đ t s_đ m_đ h_đnh t_đ i - Ch_đđ_đng trong n_đng nghi_đ p_đ, *Kết quả nghiên cứu khoa học Tr_đng n_đ HNN I H_đ N_đ i*, Quy_đm 3, trang 228–236, Nxb N_đng nghi_đ p, 1997.
8. Nguyễn H_đl_đ Thanh, n_đM_đ t ph_đng ph_đp t_đng t_đc ng_đ - m_đşy t_đnh gi_đ b_đi to_đşn v_đ đ_đ t_đl_đ c_đ b_đng thu ph_đş t_đ nh_đ Q_đ m_đ c t_đi_đu trong m_đi tr_đng m_đ ò, *Hệ m_đ và ứng dụng*, trang 64–72, Nxb Khoa h_đ c v_đ K_đth_đ, 1998.
9. Nguyễn H_đl_đ Thanh n_đM_đ t s_đ ph_đng ph_đp gi_đ b_đi to_đşn t_đ i - Ch_đ La m_đ c t_đi_đu_đ, *Kết quả nghiên cứu khoa học Tr_đng n_đ HNN I H_đ N_đ i*, Quy_đm 4, trang 192–196, Nxb N_đng nghi_đ p, 2000.
10. Nguyễn H_đl_đ Thanh, n_đM_đ h_đnh to_đşn t_đ i - Ch_đ x_đđ_đ ng ch_đ c_đ b_đi c_đ t_đtr_đ ngò, *Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ m_đ s_đ B99–32–54 L_đ« nghi_đ m_đ thu*, 1999–2001.
11. Nguyễn H_đl_đ Thanh, n_đX_đđ_đ ng h_đ ph_đh_đ m_đQ_đ m_đşy t_đnh ph_đ c v_đ gi_đng đ_đşy v_đ nghi_đo_đ c_đ u khoa h_đ c n_đng nghi_đ p_đ, *Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ m_đ s_đ B2001–32–23 L_đ« nghi_đ m_đ thu*, 2001–2003.
12. Nguyễn H_đl_đ Thanh, *Mô phỏng ngẫu nhiên*, B_đi gi_đng cho cao h_đ c kho_đş 1 v_đ 2, ng_đnh To_đşn – Tin_đ ng đ_đ ng, Tr_đng n_đ ũ_đ h_đ c B_đşch khoa H_đ N_đ i, 2004.
13. Nguyễn H_đl_đ Thanh (ch_đ bi_đo_đ) v_đ c_đşc t_đşc gi_đ kh_đşc, *Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp*, Nxb Khoa h_đ c v_đ K_đth_đ, 2005.
14. Nguyễn Duy Ti_đh, *Các mô hình xác suất và ứng dụng, phần I: Xích Markov và ứng dụng*, Nxb n_đ ũ_đ h_đ c Q_đ c gia H_đ N_đ i, 2001.
15. *Tạp chí ứng dụng Toán học*, H_đ i_đ ng đ_đ ng To_đşn h_đ c Vi_đ t Nam, 2003 i 2005.

Tiếng Nga

16. Asmanov C. A., *Quy hoạch tuyến tính*, Nxb Nauka, 1981.
17. Vasiliev F. I., *Các phương pháp số giải các bài toán cực trị*, Nxb Nauka, 1980.
18. Gnedenko B.V., *Giáo trình lý thuyết xác suất*, Nxb Nauka, 1969.
19. Gnedenko B.V., Beliaev I.U. K. và Xoloviev A. D. *Những phương pháp toán học trong lý thuyết độ tin cậy*, Nxb Nauka, 1969.
20. Smarkov X. M., *Phương pháp Monte-Carlo và các vấn đề liên quan*, Nxb Nauka, 1975.
21. Smarkov X. M., *Giáo trình mô hình ngẫu nhiên* (dành cho ngành Toán ứng dụng và các trình độ từ Cử nhân đến Tiến sĩ), Nxb Nauka, 1976.

Tiếng Anh

22. Bazarra M. S. and Shetti C. M., *Nonlinear programming: Theory and Algorithms*, John Wiley & Sons, New York, 1984.
23. Gillet B. E., *Introduction to Operations Research*, McGraw Hill, New York, 1990.
24. Isaacson D.L. and Madsen R.W., *Markov Chains Theory and Applications*, John Wiley & Sons, New York, 1975.
25. Kemeny J. G. and Snell J. L., *Finite Markov Chains*, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, 1967.
26. Levin R. I., Rubin D. S. and Stinson J. P., *Quantitative approaches to management*, McGraw Hill, New York, 1986.
27. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, "RDIM - An interactive computer package for solving real life optimization problems in fuzzy environment", pp. 85-93, in "Mathematics and its applications in engineering and industry" (Editors Banir Singh et al.), Narosa Publishing House, London - New Delhi, 1997.
28. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, "A fuzzifying approach to stochastic programming", *Opsearch*, Vol. 34, No. 2, pp. 73-96, 1997.
29. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, "Reference direction method for solving multiobjective fuzzy programming", *European Journal of Operational Research*, Vol. 107, pp. 599-613, 1998.
30. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, "Preference level interactive method for solving multiobjective fuzzy programming problems", *Asia-Pacific Journal of Operational Research*, Vol. 16, pp. 63-86, 1999.
31. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, "A controlled random search technique incorporating the simulated annealing concept for solving integer and mixed integer global optimization problems", *Computational Optimization and Applications*, Vol. 14, pp. 103-132, 1999.
32. Mohan C. and Nguyen Hai Thanh, "An interactive satisficing method for solving

multiobjective mixed fuzzy–stochastic programming problems, *International Journal for Fuzzy Sets and Systems*, Vol. 117, No.1, pp. 61–79, 2001.

33. Nguyen Hai Thanh, "Optimization in fuzzy–stochastic environment and its applications in industry and economics", *Proceedings of VJFUZZY'98: Vietnam–Japan bilateral symposium on fuzzy systems and applications*, pp. 342–349, 30/9 – 2/10/1998.
34. Nguyen Hai Thanh, "PRELIM – An interactive computer package for solving realistic optimization problems in fuzzy environment", *Proceedings of VJFUZZY'98: Vietnam–Japan bilateral symposium on fuzzy systems and applications*, pp. 652–659, 30/9 – 2/10/1998.
35. Osyczka A., *Multicriterion Optimization in Engineering with Fortran Programs*, Ellis Horwood Limited, New York, 1984.
36. Ripley B. D., *Stochastic Simulation*, John Wiley & Sons, New York, 1987
37. Ross S. M., *Introduction to Probability Models*, Academic Press, Inc., Boston, 1995.
38. Sakawa M., *Fuzzy sets and multiobjective optimization*, Plenum Press, New York, 1993.
39. Steuer R. S., *Multiple criterion optimization: Theory, computation and application*, John Wiley & Sons, New York, 1986.
40. Taha H. A., *Operations Research*, MacMillan Publishing Company, New York, 1989.

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc Nhà in
Trưởng biên tập

Biên tập nội dung:

NGUYỄN TIẾN TRUNG

Kỹ thuật vẽ hình:

TRẦN CAO KHUÊ

Trình bày bìa:

PHẠM VIỆT QUANG

TOÁN ỨNG DỤNG

In 2.000 cuốn, khổ 19 × 27cm, tờ
Giấy phép xuất bản số: 1-953/XB-ĐT QLXB, ký ngày 20/6/2005.
In xong và nộp chi phí tháng 8 năm 2005.

